

- 31/17 :

<

számrendszerben, hogy a felírás nem tartalmaz egyest.

>

számrendszerben, hogy a felírás nem tartalmaz egyest.

1.40.3. Feladat [7]. Adjuk meg a Cantor-halmaz egy monoton növekedő és folytonos leképezését $[0, 1]$ -re, majd ezt terjesszük ki $[0, 1]$ -re a monotonitás megtartásával. Mutassuk meg, hogy a kapott leképezés majdnem mindenütt differenciálható és a deriváltja majdnem mindenütt nulla.

1.40.6. Feladat [7]. Adjuk meg a Cantor-halmaz, majd a $[0, 1]$ egy folytonos leképezését $[0, 1]^2$ -re illetve $[0, 1]^n$ -re.

- 94/8 :

<

jelöléseket.

>

jelöléseket.

Az \mathbb{R}^n -beli $U_1(0)$, $B_1(0)$ és $S_1(0)$ gömböket olyan gyakran használjuk, hogy ezekre külön jelölést vezetünk be: U^n , B^n és S^{n-1} .

- 96/−14 :

<

minden nyílt halmaz előáll \mathcal{B} -beli halmazok egyesítéseként.

>

minden nyílt halmaz előáll \mathcal{B} -beli halmazok egyesítéseként. Az X nyílt halmazainak egy \mathcal{S} rendszerét *szubbázisnak* nevezzük, ha az \mathcal{S} -beli halmazok véges metszetei bázist alkotnak. Például \mathbb{R} -ben az összes $]a, b[$ nyílt intervallum, ahol $a, b \in \mathbb{R}$, vagy akár csak $a, b \in \mathbb{Q}$, egy bázis, az összes $] - \infty, b[$ és $]a, +\infty[$ nyílt intervallum, ahol $a, b \in \mathbb{R}$, vagy akár csak $a, b \in \mathbb{Q}$, egy szubbázis.

- 107/−16 :

<

A kompakt halmazok jelentősége az, hogy a legtöbb átvihető kompakt

>

A kompakt halmazok jelentősége az, hogy a legtöbb lokális tulajdonság átvihető kompakt

- 108/4 :

<

→* **3.85. Feladat: Uriszon-lemma.** Legyen X metrikus tér, $K \subset V \subset X$, ahol K

>

→* **3.85. Feladat: Uriszon-lemma metrikus terekre.** Legyen X metrikus tér, $K \subset V \subset X$, ahol K

- 109/5 :

<

* **3.87. Feladat [14]: Tietze kiterjesztési tétele.** Legyen X metrikus tér, F nem üres zárt részhalmaza X -nek, és legyen $f : F \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény. Mutassuk meg, hogy létezik olyan $g : X \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos függvény, amelyre $g|_F = f$ és $\inf f(F) = \inf g(X)$, $\sup f(F) = \sup g(X)$.

→ **3.88. Feladat [11].** Mutassuk meg, hogy metrikus terek szorzata pon-

>

→ **3.88. Feladat [11].** Mutassuk meg, hogy véges sok metrikus tér szorzata pon-

- 109/14 :

<

→* **3.89. Feladat: Tyihonov tétele [10].** Legyenek (X_i, d_i) , $i = 1, 2, \dots$ metrikus

>

→* **3.89. Feladat: Tyihonov tétele metrikus terekre [10].** Legyenek (X_i, d_i) , $i = 1, 2, \dots$ metrikus

- 111/-5 :

<

metrikák egyenletesen, és így topologikusan is ekvivalensek.

* **3.103. Általános topológia.** A topológiával kapcsolatos észrevételek szerint nagyon sok fogalom a nyílt halmazok segítségével definiálható és vizsgálható. Ez az észrevétel vezet a topologikus tér fogalmához: Az (X, \mathcal{O}) párt *topologikus térnek*, \mathcal{O} -t *topológiának* nevezzük, ha X egy halmaz, \mathcal{O} az X részhalmazainak egy rendszere, amely tartalmazza X -et, és nem vezet ki belőle a véges metszet és a tetszőleges unió képzése. Az \mathcal{O} elemei a tér *nyílt halmazai*. Minden (X, d) metrikus tér topologikus tér is, ha a nyílt halmazokat a szokásos módon definiáljuk. A topologikus terek izomorfizmusai a homeomorfizmusok.

Metrikus terek esetén néhány fogalomnál (teljesség, egyenletes folytonosság, stb.) az játszik szerepet, hogy az x és y pontok „ ε -közel” vannak ($\varepsilon > 0$), azaz fennáll az $xR_\varepsilon y$ reláció, ahol

$$R_\varepsilon = \{(u, v) : d(u, v) < \varepsilon\}.$$

Ez az észrevétel az uniform tér fogalmához vezet. Az (X, \mathcal{U}) párt *uniform térnek*, \mathcal{U} -t *uniformitásnak* nevezzük, ha X nem üres halmaz, \mathcal{U} pedig X reflexív szimmetrikus relációinak egy rendszere úgy, hogy bármely reláció tartalmazza valamely másik reláció önmagával vett kompozícióját, és bármely két reláció metszete tartalmaz egy harmadik relációt. Ha $R \in \mathcal{U}$ és $(x, y) \in R$, azaz xRy , akkor azt szokás mondani, hogy x és y *R -közel* vannak. Egy metrikus tér a fenti R_ε , $\varepsilon > 0$ relációkkal példa uniform térre. Ha egy uniform térben az

$$\mathcal{O} = \{V : V \subset X, \text{ minden } x \in V\text{-hez van olyan } R \in \mathcal{U}, \text{ hogy } R(x) \subset V\}$$

halmazrendszert tekintjük, akkor X topologikus térré válik, így az uniform tér fogalma a metrikus térnél általánosabb, a topologikus térnél speciálisabb.

A topologikus, illetve az uniform terek fogalma sok szempontból természetesebb és kényelmesebben használható, mint a metrikus terek fogalma. Például akárhány X_γ , $\gamma \in \Gamma$ topologikus tér szorzata definiálható, mint a

$$\prod_{\gamma \in \Gamma} X_\gamma = \{f : f : \Gamma \rightarrow \cup_{\gamma \in \Gamma} X_\gamma, f(\gamma) \in X_\gamma\}$$

szorzathalmaz, az összes olyan topológiák metszetével topologizálva, amelyekre az összes $p_\gamma : f \mapsto f(\gamma)$, $\gamma \in \Gamma$ projekciók folytonosak. Az X^Γ szorzattopológiájából az $f : \Gamma \rightarrow X$ függvények pontonkénti konvergenciája származik. (Még ha X metrikus tér is, általában akkor sem származtatható ez a konvergencia metrikából vagy eltérésből.)

A topologikus és uniform terek fogalma sok célra túl általános. Például nem feltétlenül léteznek bármely két különböző ponthoz őket tartalmazó, diszjunkt, nyílt halmazok. (Legyen $\mathcal{O} = \{\emptyset, X\}$; az így kapott tér az *indiszkkrét tér*.) A leggyengébb feltétel, amit használni szokás, hogy két különböző ponthoz mindig létezik olyan nyílt halmaz, amely valamelyiket tartalmazza, a másikat meg nem. Az ennek a feltételnek eleget tévő tereket T_0 -tereknek nevezzük; a jelölés a német „trennen” szóból ered. (Például $\{0, 1\}$ a $\mathcal{O} = \{\emptyset, \{0\}, \{0, 1\}\}$ topológiával T_0 -tér; ezt a teret *összefüggő pontpárnak* hívják.) Erősebb feltétel, hogy két különböző ponthoz mindig létezik olyan nyílt halmaz, amely az elsőt tartalmazza, a másodikat nem. Az ilyen tereket T_1 -térnek hívják, és a feltétel azzal ekvivalens, hogy az egyelemű halmazok zártak. (Az összefüggő pontpár nem T_1 -tér.) Ha azt követeljük meg, hogy különböző pontok nyílt halmazzal szétválaszthatók legyenek, azaz létezzenek diszjunkt nyílt halmazok, amelyek közül az egyik az egyik, a másik a másik pontot tartalmazza, akkor a T_2 -tér vagy *Hausdorff-tér* fogalmához jutunk. A T_3 feltétel azt köti ki, hogy zárt halmaz és rajta kívül fekvő pont nyílt halmazokkal szétválaszthatók, azaz léteznek olyan diszjunkt nyílt halmazok, hogy az egyik a pontot, a másik a zárt halmazt tartalmazza, a T_4 feltétel pedig azt, hogy diszjunkt zárt halmazok nyílt halmazokkal szétválaszthatók, azaz léteznek olyan diszjunkt nyílt halmazok, hogy az egyik az egyik, a másik a másik zárt halmazt tartalmazza. A T_π feltétel bizonyos értelemben a T_3 és T_4 feltétel között fekszik, és azt köti ki, hogy zárt halmaz és rajta kívül fekvő pont folytonos függvénnyel szétválasztható, azaz van olyan, az egész téren értelmezett folytonos függvény, amely $[0, 1]$ -be képez, és a zárt halmazon 0, a pontban pedig 1. Leggyakrabban ezen feltételek kombinációja használatos: a T_3 és T_1 feltételeknek eleget tévő tereket *regulárisnak*, a T_π és T_1 feltételnek eleget tévő tereket *teljesen regulárisnak*, a T_4 és T_1 feltételeknek eleget tévő tereket pedig *normálisnak* nevezzük; ezek mind Hausdorff-terek, és a teljesen reguláris terek nyilván regulárisak is. Nevezetes tény az *Uriszon-lemma*, mely szerint normális térben bármely két diszjunkt zárt halmaz folytonos függvénnyel szétválasztható, azaz van olyan, az egész téren értelmezett folytonos függvény, amely $[0, 1]$ -be képez, és az egyik zárt halmazon 0, a másikon pedig 1, így normális tér mindig teljesen reguláris. Egy másik nevezetes tétel *Tyihonov tétele*: kompakt terek szorzata kompakt.

Mint látjuk, a topologikus terek vizsgálatánál számos új fogalmat kell bevezetni, és az ezek közötti finom kapcsolatok vizsgálata időigényes. A fokozatosság elve mellett ez az oka, hogy ebben a jegyzetben metrikus terekre szorítkozunk. Általános topológiával kapcsolatban Hewitt–Stromberg [55] könyvének megfelelő fejezeteit, és Bourbaki [12] művének II. könyvét ajánljuk.

>

metrikák egyenletesen, és így topologikusan is ekvivalensek.

- 116/13 :

<

rakció, de a négyzete már kontrakció.

>

rakció, de a négyzete már kontrakció.

3.117.5. Feladat [7]. Adjunk példát olyan $T : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ leképezésre, amelyre $|T(x) - T(y)| < |x - y|$, ha $x \neq y$, de nincs fixpontja.

- 116/-16 :

<

ra, a $T_i(x) = x$ fixpont problémával. Melyik T_i alkalmas iterációra?

>

a $T_i(x) = x$ fixpont problémával. Melyik T_i alkalmas iterációra?

3.118.1. Feladat [9]. Tekintsük az $F(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2^2 - 1, 2x_1 + x_2 - 1)$ függvényt. Legyen

$$T_1(x_1, x_2) = \left((1 - x_2)/2, \sqrt{1 - x_1^2} \right), \quad T_2(x_1, x_2) = \left((1 - x_2)/2, -\sqrt{1 - x_1^2} \right).$$

Mutassuk meg, hogy a $(-0,9, 0,9)$ pontból indítva T_1 az $F(x) = 0$ egyenlet egyik, a $(0,9, 0,9)$ pontból indítva T_2 a másik megoldásához konvergál. Magyarázzuk meg a konvergenciák sebessége közötti különbséget.

- 116/-1 :

<

a legkisebb Lipschitz-konstans?

>

a legkisebb Lipschitz-konstans?

* **3.121.1. Fixpont tulajdonság.** Az X metrikus teret *fixpont tulajdonságúnak* nevezzük, ha X bármely önmagába való folytonos leképezésének van fixpontja. A fixpont-tulajdonság nyilván topológiai tulajdonság.

* **3.121.2. Retraktum.** Egy X metrikus tér egy Y részhalmazára azt mondjuk, hogy az X *retraktuma*, ha van olyan folytonos leképezése X -nek Y -ra, amely Y -on az identitás. Az hogy Y retraktuma X -nek, nyilván topológiai tulajdonság. Például egy Hilbert-tér bármely nem üres zárt konvex részhalmaza bármely nála bővebb halmaznak retraktuma: a retrakciót úgy kapjuk, hogy minden ponthoz a hozzá legközelebbi Y -beli pontot rendeljük.

* **3.121.3. Tétel.** *Ha az X metrikus tér fixpont tulajdonságú és Y retraktuma X -nek, akkor Y is fixpont-tulajdonságú.*

Bizonyítás. Legyen $r : X \rightarrow Y$ egy retrakció. Ha T folytonos leképezése Y -nak önmagába, akkor $T \circ r$ folytonos leképezése X -nek Y -ba. Mivel X fixpont tulajdonságú, és $Y \subset X$, van x fixpont, amelyre $T(r(x)) = x$. Nyilván $x \in Y$, és így $r(x) = x$, amiből $T(x) = x$.

* **3.121.4. Homotópia, összehúzhatóság.** Az X metrikus teret az Y metrikus térbe képező f_0, f_1 folytonos leképezéseket egymásba folytonosan átdeformálhatóknak, idegen szóval homotópoknak nevezzük, ha van olyan $h : X \times [0, 1] \rightarrow Y$ folytonos leképezés, a homotópia, amelyre $h(x, 0) = f_0(x)$ és $h(x, 1) = f_1(x)$ minden $x \in X$ -re. (A vektoranalízisben és a komplex függvénytanban használni fogjuk zárt görbék homotópiáját; ez a homotópia általános fogalmának speciális esete, mivel egy zárt görbe \mathbb{T} folytonos leképezésének tekinthető.) Általánosabban, definiálhatjuk a relatív homotópiát: legyen $A \subset X$; az X metrikus teret az Y metrikus térbe képező f_0, f_1 folytonos leképezéseket A -homotópoknak nevezzük, ha van olyan homotópia, amely A -n a leképezést fixen hagyja, azaz van olyan $h : X \times [0, 1] \rightarrow Y$ homotópia, amelyre $h(x, t) = f_0(x) = f_1(x)$ minden $x \in A$ -ra és $0 \leq t \leq 1$ -re. Az X -et Y -ba képező folytonos függvények A -homotópiája (így homotópiája is, amely az $A = \emptyset$ speciális eset) nyilván ekvivalencia-reláció, így beszélhetünk a függvények homotópia-osztályairól. Azt is könnyű látni, hogy ha f_0 és f_1 A -homotópok, Z is metrikus tér, $B \subset Y$, $g_0, g_1 : Y \rightarrow Z$ B -homotópok, $f_0(A) = f_1(A) \subset B$, akkor $g_0 \circ f_0$ és $g_1 \circ f_1$ A -homotópok. Függvények homotópiája nyilván topologikus fogalom.

Az X metrikus teret (az X egy x_0 pontjára) összehúzhatónak nevezzük, ha az identikus leképezése homotóp a konstans $f(x) \equiv x_0$ függvénnyel. Az összehúzhatóság nyilván topológiai tulajdonság.

* **3.121.5. Borsuk tétele.** *Legyen C zárt részhalmaza az X metrikus térnek, f_0 és f_1 homotóp leképezései F -nek \mathbb{S}^n -be. Ha f_0 kiterjeszthető az X egy folytonos F_0 leképezésévé \mathbb{S}^n -be, akkor f_1 is kiterjeszthető az X egy F_1 folytonos leképezésévé \mathbb{S}^n -be úgy hogy F_0, F_1 homotópok.*

Bizonyítás. Legyen h egy homotópiája f_0 -nak f_1 -be, és legyen

$$C' = \{(x, t) \in X \times [0, 1] : t = 0 \text{ vagy } x \in C\}.$$

A C' halmaz zárt, és a $H'(x, t) = F(x)$, ha $t = 0$ és $H'(x, t) = h(x, t)$, ha $x \in C$ leképezése C' -nek \mathbb{S}^n -be folytonos. Megmutatjuk, hogy ez a leképezés kiterjeszthető C' egy nyílt U környezetére; a kiterjesztést jelölje H'' . Valóban, \mathbb{S}^n helyettesíthető a $[-1, 1]^{n+1}$ tér vele homeomorf határával, és Tietze kiterjesztési tétele szerint ez a leképezés (koordinátáinként) kiterjeszthető az egész tér egy $[-1, 1]^{n+1}$ -be való folytonos leképezésévé. A C' valamely környezetén ez a leképezés nem veszi fel értéként az origót, és $[-1, 1]^{n+1}$ határa retraktuma $[-1, 1]^{n+1}$ origótól különböző pontjai halmazának. Megmutatjuk, hogy U tartalmaz egy $V \times [0, 1]$ alakú halmazzal, ahol V egy, a C -t tartalmazó nyílt halmaz. Valóban, minden $x \in C$ -re a

$\{x\} \times [0, 1]$ kompakt halmaz távolsága U komplementerétől pozitív, így van olyan V_x nyílt környezete x -nek, amelyre $V_x \times [0, 1] \subset U$; legyen $V = \cup\{V_x : x \in C\}$. Végül az Uriszon-lemma (vagy a metrikus terekre vonatkozó változata) szerint van olyan $p : X \rightarrow [0, 1]$ folytonos függvény, amely a C -n 1, a V komplementerén pedig nulla. Legyen $H(x, t) = H''(x, tp(x))$ a keresett homotópia és $F_1(x) = H(x, 1)$ a keresett kiterjesztése f_1 -nek.

* **3.121.6. Tétel.** *Ha $n \in \mathbb{N}^+$, akkor a következő állítások ekvivalensek:*

- (1) \mathbb{S}^{n-1} nem összehúzható;
- (2) \mathbb{S}^{n-1} nem reaktuma \mathbb{B}^n -nek;
- (3) az \mathbb{R}^n bármely nem üres X kompakt konvex részhalmaza fixpont tulajdonságú (Brouwer-féle fixponttétel);
- (4) ha $a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$, $r_j > 0$ ($j = 1, \dots, n$) és a

$$T = \{(x_1, \dots, x_n) : |x_j - a_j| \leq r_j\}$$

tégla

$$T_j^\pm = \{(x_1, \dots, x_n) \in T : x_j - a_j = \pm r_j\}$$

lapjain valamely $f = (f_1, \dots, f_n) : T \rightarrow \mathbb{R}^n$ folytonos függvényre $\pm f_j \geq 0$, akkor a függvény a T téglán felveszi az origót értékként (Miranda közbenső érték tétele).

Mindegyik állítás igaz, és egyiket sem könnyű bebizonyítani. Mi a variációszámítás segítségével fogjuk majd (2)-t bizonyítani. Egy elemi, de nem egyszerű bizonyítás található (1)-re Hurewicz és Wallman [58] könyvében. A (4) állítás egyenletrendszer megoldására használható.

Bizonyítás. Vegyük észre, hogy ha X összehúzható, akkor X bármely Y reaktuma is összehúzható: valóban, ha r a retrakciója X -nek Y -ra, és h összehúzza X -et x_0 -ra, akkor $r \circ h$ összehúzza Y -t $r(x_0)$ -ra. Mivel \mathbb{B}^n nyilván összehúzható, de (1) szerint \mathbb{S}^{n-1} nem, \mathbb{S}^{n-1} nem lehet \mathbb{B}^n reaktuma, azaz (1)-ből következik (2). A megfordítás Borsuk tételéből adódik: ha \mathbb{S}^{n-1} összehúzható lenne, akkor \mathbb{S}^{n-1} identikus leképezését kiterjeszthetnénk \mathbb{B}^n -nek egy folytonos leképezésévé \mathbb{S}^n -be, azaz (2) nem teljesülne.

A Brouwer-féle fixponttételt (2)-ből először \mathbb{B}^n -re bizonyítjuk. Ha létezne olyan $T : \mathbb{B}^n \rightarrow \mathbb{B}^n$ leképezés, amelynek nincs fixpontja, akkor tudnánk konstruálni \mathbb{B}^n -nek egy retrakcióját \mathbb{S}^{n-1} -re: minden $x \in \mathbb{B}^n$ -re hosszabbítsuk meg a $T(x)$ -ből x -be vezető szakaszt amíg metszi \mathbb{S}^{n-1} -et. Jelöljük ezt a pontot $r(x)$ -el. Az r egy retrakciója \mathbb{B}^n -nek \mathbb{S}^{n-1} -re. Ha most R elég nagy, akkor az R sugarú, origó középpontú gömb tartalmazza X -et. Mivel X reaktuma $R \cdot \mathbb{B}^n$ -nek, X is fixpont tulajdonságú. A megfordítás abból következik, hogy ha \mathbb{S}^{n-1} reaktuma lenne \mathbb{B}^n -nek, akkor fixpont tulajdonságú lenne, de nem az: az $x \mapsto -x$ leképezésnek nincs fixpontja.

A Brouwer-féle fixponttételből következik (4): Először tegyük fel, hogy $\pm f_j > 0$ a T_j^\pm lapokon ($j = 1, \dots, n$), és legyen $F_j(x) = x_j - \varepsilon_j f_j(x)$. Ha az $\varepsilon_j > 0$ számok elég kicsik, az F leképezés T -t T -be képezi, így van fixpontja, amely zérushelye f -nek. Egyébként térjünk át az $f_\varepsilon(x) = f(x) + \varepsilon(x - a)$ leképezésre. Ennek van egy x_ε zérushelye T -ben, és a zérushelyekből kiválasztható egy konvergens sorozat. A megfordításhoz legyen $F : T \rightarrow T$ egy folytonos leképezés, és $f(x) = x - F(x)$; (4) alkalmazható f -re, és f zérushelye F egy fixpontja.

* **Megjegyzés.** A Brouwer-féle fixponttételnek számos alkalmazása van: egyrészt más fixponttételek bizonyíthatók belőle, másrészt olyan egyenlőtlenségek, amelyeknek fontos játékelméleti (például a *Nash-féle egyensúlypont* létezése, *Neumann minimax tétele*) és közgazdasági alkalmazásai vannak (a matematikai közgazdaságtan fő tétele), de az is belátható segítségével, hogy \mathbb{R}^m és \mathbb{R}^n nem homeomorfak, ha $m \neq n$. Ezeket a tételeket illetően lásd [147], 77. fejezet. Az alábbi tételt később használjuk majd.

* **3.121.7. Megoldás létezése nemlineáris egyenletrendszerre.** Legyen $g : \mathbb{B}_R(0) \rightarrow \mathbb{R}^n$ folytonos függvény, ahol \mathbb{R}^n -et egy tetszőleges normával és a szokásos belső szorzattal tekintjük, $\mathbb{B}_R(0) \subset \mathbb{R}^n$, $R > 0$. Ha minden $x \in \mathbb{S}_R(0)$ -ra $\langle g(x), x \rangle \geq 0$, akkor a $g(x) = 0$ egyenletnek van megoldása $\mathbb{B}_R(0)$ -ban.

Bizonyítás. Indirekt: Egyébként $f(x) = -Rg(x)/\|g(x)\|$ folytonos leképezése lenne $\mathbb{B}_R(0)$ -nak önmagába, amelynek van egy x fixpontja. Erre $\|x\| = R$, de

$$\langle g(x), x \rangle = -\frac{\|g(x)\|}{R} \langle f(x), x \rangle = -\frac{\|g(x)\|}{R} \langle x, x \rangle < 0.$$

* **3.121.8. Dimenzióelmélet.** Ha be akarjuk bizonyítani, hogy két metrikus tér nem homeomorf, akkor nagyon hasznos lehet egy *topológiai invariáns*, valamilyen szám (vagy bármi más) ami homeomorf terekre megegyezik (és lehetőleg könnyen számítható). Egyike a legkorábban bevezetett topológiai invariánsoknak a *dimenzió*.

Egy X halmaz egy \mathcal{A} lefedése a \mathcal{B} lefedés *finomítása*, ha minden $A \in \mathcal{A}$ -hez van olyan $B \in \mathcal{B}$, hogy $A \subset B$. Egy *lefedés rendje* eggyel kisebb, mint az egy x pontot lefedő halmazok számának a szuprénuma az összes $x \in X$ pontra (-1 , ha nincs pont). Egy X metrikus tér $\text{cdim}(X)$ *lefedési dimenziója* a legkisebb olyan n egész szám amelyre X minden nyílt lefedésének van olyan finomítása, amelynek a rendje n . Az üres tér dimenziója -1 . Két másik dimenziófogalom — az üres tér dimenzióját -1 -nek véve — indukcióval definiálható: egy nem üres térre $\text{idim}(X)$ az a legkisebb n természetes szám, amire minden x ponthoz és azt tartalmazó U nyílt halmazhoz van olyan $V \subset U$ nyílt halmaz, amelyre $\text{idim}(\partial V) < n$ (kis induktív dimenzió), $\text{Idim}(X)$ pedig az a legkisebb n természetes szám, amire minden F zárt halmazhoz és azt tartalmazó U nyílt halmazhoz van olyan $F \subset V \subset U$ nyílt halmaz, amelyre $\text{Idim}(\partial V) < n$ (nagy induktív dimenzió). Az elmélet fő eredménye, hogy ezek a (nyilván topologikus) fogalmak szeparábilis metrikus terekben egybeesnek. Csak a szeparábilis metrikus terekben teljesülő fontosabb eredményeket soroljuk fel:

Altér dimenziója legfeljebb annyi, mint a tér dimenziója. Összeg tétel: ha a tér megszámlálható sok legfeljebb n dimenziós zárt altér összege, akkor maga is legfeljebb n dimenziós, ha pedig egy m és egy n dimenziós altér egyesítése, akkor legfeljebb $n + m + 1$ dimenziós. Felbontási tétel: egy nem üres, legfeljebb n dimenziós tér felbontható egy legfeljebb 0 és egy legfeljebb $n - 1$ dimenziós altérre. Szorzat tétel: két tér szorzatának a dimenziója legfeljebb a dimenziók összege (de lehet kisebb: van két olyan kétdimenziós tér, amelyeknek a szorzata csak három dimenziós). Kiterjesztési tétel: nem üres tér pontosan akkor legfeljebb n dimenziós, ha bármely zárt részhalmazának folytonos leképezése \mathbb{S}^n -be kiterjeszthető az egész tér folytonos leképezésévé \mathbb{S}^n -be. Legnehezebb annak bizonyítása, hogy \mathbb{R}^n dimenziója n , ez használja a Brouwer-féle fixponttételt. (Egyébként \mathbb{R}^n -ben pontosan a nem üres belsejű halmazok dimenziója n). Az \mathbb{R}^{2n+1} térben létezik univerzális n -dimenziós kompakt halmaz: minden legfeljebb n dimenziós tér homeomorf ennek egy részhalmazával. További nevezetes, \mathbb{R}^n -re vonatkozó tételek: legfeljebb $n - 2$ dimenziós részhalmaz komplementere összefüggő; \mathbb{R}^n két homeomorf kompakt részhalmazának a komplementere ugyanannyi diszjunkt tartomány egyesítése (ez tartalmazza a Jordan-tételt speciális esetként); \mathbb{R}^n két részhalmazának egy homeomorfizmusa \mathbb{R}^n -beli belső pontot \mathbb{R}^n -beli belső pontba visz (ez Brouwer nevezetes tartomány-invariancia tétele). Végül két állítás, amely a Hausdorff-dimenzióval való kapcsolatot írja le: ha X topológiai dimenziója n , akkor $\chi^n(X) > 0$, és minden $m > n$ valós számra van olyan X -szel homeomorf Y részhalmaza $[0, 1]^{2n+1}$ -nek, amelyre $\chi^m(Y) = 0$. A dimenzióelmélettel kapcsolatban bevezetésként Hurewicz és Wallman [58] könyvét ajánljuk, amely ma is jól olvasható, bár első kiadása 1941-ben jelent meg!

- 117/3 :

<

oldására. Az alábbiakban vázoljuk az alapgondolatot. A különböző fixpont-

>

olhatóságának bizonyítására, és elsősorban a Banach-féle fixponttétel az egyenletek megoldására is. Az alábbiakban vázoljuk az alapgondolatot. A különböző fixpont-

- 117/14 :

<

ra, akkor a *módosított Newton-módszert* kapjuk. Ha előbb az $x = x$ azonos-

>

ra, akkor a *módosított Newton-módszert* kapjuk. Ha G az x -től is függ, $G(x)(y) = F'(x)^{-1}(y)$, akkor a *Newton-módszert* kapjuk. Ha előbb az $x = x$ azonos-

- 117/-6 :

<

közelítésekből a $\Delta = \Delta_1$ differenciaoperátorral

$$\Delta x_n \approx cq^n(q-1), \quad \Delta^2 x_n \approx cq^n(q-1)^2,$$

így $(\Delta x_n)^2/\Delta^2 x_n \approx cq^n$, amiből

$$x \approx x_n - \frac{(\Delta x_n)^2}{\Delta^2 x_n},$$

>

közelítésekéből a $\Delta = \Delta_1$ differenciaoperátorral

$$\Delta x_n \approx cq^n(q-1), \quad \Delta x_{n+1} \approx cq^{n+1}(q-1), \quad \Delta^2 x_n \approx cq^n(q-1)^2,$$

így $\Delta x_{n+1}/\Delta x_n \approx q$, továbbá $(\Delta x_n)^2/\Delta^2 x_n \approx cq^n$, amiből

$$x \approx x_n - \frac{(\Delta x_n)^2}{\Delta^2 x_n},$$

- 120/1 :

<

** **3.139. Feladat: topologikus tér faktortere [10].** Legyen X topologikus tér és \sim egy ekvivalenciareláció X -en. A *topologikus faktortér* alatt az ekvivalenciaosztályok \tilde{X} halmazát értjük, azokat a $\tilde{U} \subset \tilde{X}$ halmazokat tekintve nyíltak, amelyekre $\cup \tilde{U}$ nyílt X -ben. Mutassuk meg, hogy ha (X, d) metrikus tér, és \tilde{d} metrika, továbbá $\tilde{U} \subset \tilde{X}$ nyílt a metrikus faktortérben, akkor $\cup \tilde{U}$ is nyílt X -ben. Mutassuk meg, hogy ha X kompakt és \tilde{d} metrika, akkor a \tilde{X} metrikus faktortérben egy $\tilde{U} \subset \tilde{X}$ halmaz pontosan akkor nyílt, ha $\cup \tilde{U}$ is nyílt X -ben, azaz a metrikus faktortér topológiája megegyezik topologikus faktortér topológiájával. Mutassuk meg, hogy egy pályatér faktormetrikájának (ha létezik faktormetrika) a topológiája mindig a topologikus faktortér topológiája.

>

* **3.138.1. Általános topológia.** A topológiával kapcsolatos észrevételek szerint nagyon sok fogalom a nyílt halmazok segítségével definiálható és vizsgálható. Ez az észrevétel vezet a topologikus tér fogalmához: Az (X, \mathcal{O}) párt *topologikus térnek*, \mathcal{O} -t *topológiának* nevezzük, ha X egy halmaz, \mathcal{O} az X részhalmazainak egy rendszere, amely tartalmazza X -et, és nem vezet ki belőle a véges metszet és a tetszőleges unió képzése. Az \mathcal{O} elemei a tér *nyílt halmazai*. Például ha \mathcal{O} az X összes részhalmazából áll, akkor X *diszkrét topológiájáról* beszélünk. A topologikus fogalmak minden topologikus térben definiálva vannak. Minden (X, d) metrikus tér topologikus tér is, ha a nyílt halmazokat a szokásos módon definiáljuk. A topologikus terek izomorfizmusai a homeomorfizmusok.

Ha \mathcal{O}_1 és \mathcal{O}_2 topológiák az X halmazon, akkor $\mathcal{O}_1 \subset \mathcal{O}_2$ esetén azt mondjuk, hogy \mathcal{O}_1 *gyengébb*, mint \mathcal{O}_2 , illetve, hogy \mathcal{O}_2 *erősebb*, mint \mathcal{O}_1 . Mivel az X -en vett topológiák tetszőleges rendszerének a metszete is topológia, az X részhalmazainak akármilyen \mathcal{H} rendszeréhez a \mathcal{H} -t tartalmazó topológiák metszete topológia, amelyet a \mathcal{H} által *generált topológiának* nevezünk; ez a leggyengébb topológia, amelyre \mathcal{H} elemei nyíltak. Például egy bázis vagy egy szubbázis generálja a topológiát. Persze,

nem akármilyen \mathcal{H} halmazrendszer bázisa, illetve szubbázisa az általa generált topológiának: könnyű látni, hogy egy halmazrendszer pontosan akkor szubbázisa az általa generált topológiának, ha lefedés, és pontosan akkor bázisa az általa generált topológiának, ha lefedés és $U, V \in \mathcal{H}$, $x \in U \cap V$ esetén van olyan $W \in \mathcal{H}$, hogy $x \in W \subset U \cap V$. Legyen Y_i , $i \in I$ topologikus terek egy családja, \mathcal{B}_i a bázisa, \mathcal{S}_i pedig a szubbázisa az Y_i topológiájának. Ha $f_i : X \rightarrow Y_i$, $i \in I$ függvények egy családja, akkor könnyű látni, hogy a leggyengébb topológiának X -en, amelyre minden f_i folytonos, az $f_i^{-1}(S)$, $i \in I$, $S \in \mathcal{S}_i$ halmazok egy szubbázisát, a $\bigcap_{k=1}^n f_{i_k}^{-1}(B_i)$, $n \in \mathbb{N}$, $i_1, \dots, i_n \in I$, $B_i \in \mathcal{B}_i$ halmazok pedig bázisát alkotják.

Topológiát megadhatunk a zárt halmazokkal is, hiszen a nyílt halmazok ezek komplementerei; természetesen a zárt halmazok rendszeréből nem vezethet ki a tetszőleges metszet és a véges unióképzés, valamint tartalmaznia kell az üres halmazt. Az X összes részhalmazainak rendszerét önmagába képező $A \mapsto A^\circ$ „belsejésképzéssel” is megadhatjuk a topológiát, amelyre $X^\circ = X$ és $A^\circ \subset A$, $(A^\circ)^\circ = A^\circ$ és $(A \cap B)^\circ = A^\circ \cap B^\circ$, ha $A, B \subset X$; nem nehéz megmutatni, hogy ez a négy tulajdonság elegendő ahhoz, hogy a leképezés fixpontjai egy topológia nyílt halmazait alkossák. Hasonlóan, az X összes részhalmazainak rendszerét önmagába képező $A \mapsto \bar{A}$ „lezárási operátorral” is megadhatjuk a topológiát, amelyre $\bar{\emptyset} = \emptyset$ és $A \subset \bar{A}$, $\overline{\bar{A}} = \bar{A}$ és $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$, ha $A, B \subset X$; nem nehéz megmutatni, hogy ez a négy tulajdonság elegendő ahhoz, hogy a leképezés fixpontjai egy topologikus tér zárt halmazait alkossák.

A topologikus terek fogalma sok szempontból természetesebb és kényelmesebben használható, mint a metrikus terek fogalma. Az (X, \mathcal{O}) topologikus tér bármely Y részhalmaza is topologikus tér, az eredeti tér *altere* az $\mathcal{O}_Y = \{U \cap Y : U \in \mathcal{O}\}$ *altér-topológiával*. Páronként diszjunkt (X_i, \mathcal{O}_i) , $i \in I$ topologikus terek összege definiálható az $X = \bigcup_{i \in I} X_i$ halmazt ellátva az $\bigcup_{i \in I} \mathcal{O}_i$ (bázis) által generált \mathcal{O} topológiával. Akárhány X_i , $i \in I$ topologikus tér szorzata definiálható, mint a $\prod_{i \in I} X_i$ szorzathalmaz, az összes olyan topológiák metszetével topologizálva, amelyekre az összes $p_i : x \mapsto x_i$, $i \in I$ projekciók folytonosak. Ha X topologikus tér, az X^I szorzattopológiájából az $x : I \rightarrow X$ függvények pontonkénti konvergenciája származik. (Még ha X metrikus tér is, általában akkor sem származtatható ez a konvergencia metrikából vagy eltérésből.) Különösen fontosak a $[0, 1]^I$ *Tyihonov-téglák*. Legyen X topologikus tér és \sim egy ekvivalenciareláció X -en. Az X/\sim *topologikus faktortér* alatt az ekvivalenciaosztályok \tilde{X} halmazát értjük, azokat az $\tilde{U} \subset \tilde{X}$ halmazokat tekintve nyíltak, amelyekre $\bigcup \tilde{U}$ nyílt X -ben. Nyilván az $x \mapsto \tilde{x}$ természetes leképezés folytonos. A kompaktság nyilván „öröklődik” a zárt alterekre, a véges összegekre és a faktorterekre (mert kompakt tér folytonos képe kompakt). Nevezetes tény, hogy a szorzatra is: *Tyihonov tétele* szerint kompakt terek szorzata kompakt; ezt külön bizonyítjuk. A lokális kompaktság nyilván „öröklődik” a nyílt és a zárt alterekre, így a nyílt és zárt halmaz metszeteként előálló alterekre is, a tetszőleges összegre és a véges szorzatra.

A topologikus terek fogalma sok célra túl általános. Például nem feltétlenül léteznek bármely két különböző ponthoz őket tartalmazó, diszjunkt, nyílt halmazok.

(Legyen $\mathcal{O} = \{\emptyset, X\}$; az így kapott tér az *indiszkkrét tér*.) A leggyengébb feltétel, amit használni szokás, hogy két különböző ponthoz mindig létezik olyan nyílt halmaz, amely valamelyiket tartalmazza, a másikat meg nem. Az ennek a feltételnek eleget tevő tereket T_0 -tereknek nevezzük; a jelölés a német „trennen” szóból ered. (Például $\{0, 1\}$ a $\mathcal{O} = \{\emptyset, \{0\}, \{0, 1\}\}$ topológiával T_0 -tér; ezt a teret *összefüggő pontpárnak* hívják.) Erősebb feltétel, hogy két különböző ponthoz mindig létezik olyan nyílt halmaz, amely az elsőt tartalmazza, a másodikat nem. Az ilyen tereket T_1 -térnek hívják, és a feltétel könnyen láthatóan azzal ekvivalens, hogy az egyelemű halmazok zártak. (Az összefüggő pontpár nem T_1 -tér.) Ha azt követeljük meg, hogy különböző pontok nyílt halmazzal szétválaszthatók legyenek, azaz létezzenek diszjunkt nyílt halmazok, amelyek közül az egyik az egyik, a másik a másik pontot tartalmazza, akkor a T_2 -tér vagy *Hausdorff-tér* fogalmához jutunk. (Bármely végtelen halmaz a véges részhalmazokkal, mint zárt halmazokkal T_1 -tér, de nem T_2 -tér.) Könnyen látható, hogy Hausdorff-tér kompakt részhalmaza zárt. Ezt felhasználva bármilyen (X, \mathcal{O}) Hausdorff-térről beláthatjuk, hogy homeomorf egy kompakt Hausdorff-tér egy alterével: feltehetjük, hogy $\infty \notin X$, legyen $X_\infty = X \cup \{\infty\}$ az X egy pont *kompaktifikáltja* az X -beli nyílt halmazok és az X -beli kompakt halmazok X_∞ -beli komplementereinek rendszerével topologizálva. Könnyű látni, hogy az egy pont kompaktifikált pontosan akkor lesz Hausdorff-tér, ha X lokálisan kompakt.

A T_3 feltétel azt köti ki, hogy zárt halmaz és rajta kívül fekvő pont nyílt halmazokkal szétválaszthatók, azaz léteznek olyan diszjunkt nyílt halmazok, hogy az egyik a pontot, a másik a zárt halmazzal tartalmazza (ami nyilván ekvivalens azzal, hogy ha U nyílt, $x \in U$, akkor van olyan V nyílt halmaz, amelyre $x \in V \subset \overline{V} \subset U$), a T_4 feltétel pedig azt, hogy diszjunkt zárt E, F halmazok nyílt halmazokkal szétválaszthatók, azaz léteznek olyan diszjunkt nyílt halmazok, hogy az egyik az egyik, a másik a másik zárt halmazzal tartalmazza (ami nyilván ekvivalens azzal, hogy ha F zárt, U nyílt, $F \subset U$, akkor van olyan V nyílt halmaz, amelyre $F \subset V \subset \overline{V} \subset U$). Például metrikus tér T_4 , mert a $\{x : d(x, E) < d(x, F)\}$ és $\{x : d(x, E) > d(x, F)\}$ nyílt halmazok szétválasztják E -t és F -et. A T_π feltétel bizonyos értelemben a T_3 és T_4 feltétel között fekszik, és azt köti ki, hogy zárt halmaz és rajta kívül fekvő pont folytonos függvénnyel szétválasztható, azaz van olyan, az egész téren értelmezett folytonos f függvény, amely $[0, 1]$ -be képez, és a zárt halmazon 0 , a pontban pedig 1 . Nevezetes tény az *Uriszon-lemma*, (külön bizonyítjuk), mely szerint T_4 térben bármely két diszjunkt zárt halmaz folytonos függvénnyel szétválasztható, azaz van olyan, az egész téren értelmezett folytonos függvény, amely $[0, 1]$ -be képez, és az egyik zárt halmazon 0 , a másikon pedig 1 , így további axiómaként ezt nem érdemes felvenni. A T_π feltételből következik T_3 mert az $f^{-1}[0, 1/2[$ és $f^{-1}]1/2, 1]$ nyílt halmazok szétválasztják a zárt halmazzal és a pontot, de a kételemű indiszkkrét tér mutatja, hogy sem T_4 -ből, sem T_π -ből nem következik még T_0 sem, az összefüggő pontpár pedig, hogy T_4 -ből nem következik T_3 . Ezért leggyakrabban ezen feltételek kombinációja használatos: a T_3 és T_1 feltételeknek eleget tevő tereket *regulárisnak*, a T_π és T_1 feltételnek eleget tevő tereket *teljesen regulárisnak* vagy *Tyihonov-térnek*, a T_4 és T_1 feltételeknek eleget tevő tereket pedig *normálisnak* nevezzük. A fentiek

szerint normális tér teljesen reguláris, teljesen reguláris tér reguláris, és reguláris tér nyilván Hausdorff-tér. Azt sem nehéz belátni, hogy kompakt Hausdorff-tér normális, és ezt felhasználva adódik hogy lokálisan kompakt Hausdorff-tér teljesen reguláris, sőt, bármely kompakt halmaz elválasztható folytonos függvénnyel egy tőle diszjunkt zárt halmaztól. Megjegyezzük, hogy ha $Z = \{1/n : 0 \neq n \in \mathbb{Z}\}$, és \mathbb{R} -en azt a topológiát tekintjük, amelynek a $]a, b[$, $a, b \in \mathbb{Q}$ és vagy $a < b \leq 0$ vagy $0 \leq a < b$ valamint a $]a, b[\setminus Z$, $a, b \in \mathbb{Q}$ és $a < 0 < b$ halmazok alkotják egy bázisát, akkor Hausdorff-teret kapunk, de ebben a térben a Z zárt halmaz és a 0 pont nem választható el nyílt halmazokkal. Az is megmutatható, hogy van olyan reguláris tér, amely nem teljesen reguláris, de a konstrukció bonyolult (lásd R. Engelking: Outline of general topology, North-Holland, Amsterdam, 1968] Ch. 2, Example 4.4). Végül az egyik feladatból következni fog, hogy van olyan teljesen reguláris tér, amely nem normális.

Nem nehéz belátni, hogy a T_i , $i \leq \pi$ tulajdonságok „öröklődnek” alterekre, a T_4 tulajdonság zárt alterekre; terek összege pontosan akkor rendelkezik egy T_i , $i \leq 4$ tulajdonsággal, ha mindegyik összeadandó rendelkezik az adott tulajdonsággal; T_i , $i \leq \pi$ tulajdonságú terek szorzata is rendelkezik az adott tulajdonsággal, és ha nem üres terek szorzata rendelkezik egy T_i , $i \leq 4$ tulajdonsággal, akkor minden tényezője is.

A sorozatok nem megfelelőek tetszőleges topologikus terek vizsgálatához. Lehet a sorozat fogalmát általánosítani, vagy szűrőket használni: Egy tetszőleges halmazban egy *szűrő* a halmaz részhalmazainak egy olyan rendszere, amely nem tartalmazza az üres halmazt, zárt a halmazbővítésre és a véges metszetképzésre. Például egy topologikus térben egy adott pont környezetei szűrőt alkotnak. (A pontok környezetszűrőinek megadása meghatározza a topológiát; persze a környezetszűrőket nem adhatjuk meg tetszőlegesen.) Egy szűrőt meghatároz egy olyan részrendszere, amely bármely két eleméhez tartalmaz olyan elemet, amely azok metszetében benne van. Egy szűrőnek egy ilyen részrendszerét *szűrőbázisnak* nevezzük. Egy pont környezetei szűrőjének egy szűrőbázisát a pont *környezetbázisának* nevezzük. Például a pont összes nyílt környezetei, vagy a tér egy bázisának azok az elemei, amelyek tartalmazzák az adott pontot, környezetbázist alkotnak. Míg metrikus térben az adott középpontú $1/n$, $n \in \mathbb{N}^+$ sugarú nyílt (vagy zárt) gömbök az adott pont egy megszámlálható környezetbázisát alkotják, tetszőleges topologikus térben nincs feltétlenül megszámlálható környezetbázis: elsősorban ez okozza a sorozatkonvergencia elégtelenségét. Helyette szűrők konvergenciáját használhatjuk: egy szűrő konvergál egy adott ponthoz, ha annak minden környezete benne van a szűrőben.

Mint látjuk, a topologikus terek vizsgálatánál számos új fogalmat kell bevezetni, és az ezek közötti finom kapcsolatok vizsgálata időigényes. A fokozatosság elve mellett ez az oka, hogy ebben a könyvben metrikus terekre szorítkozunk. Általános topológiával kapcsolatban magyarul a kitűnő [122] könyvet, egyébként Hewitt–Stromberg [55] könyvének megfelelő fejezeteit, és Bourbaki [12] művének II. könyvét ajánljuk.

* **3.138.2. Alexander tétele.** Legyen \mathcal{S} egy szubbázisa az X tér topológiájának.

Az X tér pontosan akkor kompakt, ha minden \mathcal{S} -beli halmazokból álló lefedéséből kiválasztható véges lefedés.

Bizonyítás. A szükségesség nyilvánvaló. Az elégségesség bizonyításához tegyük fel, hogy van olyan nyílt halmazokból álló lefedés, amelyből nem választható ki véges lefedés. Tekintsük az ilyen lefedések rendszerét. Ez féligrendezett a tartalmazásra nézve, és benne minden lánc felülről korlátos, így a Zorn-lemma szerint tartalmaz egy \mathcal{V} maximális lefedést. Legyen $\mathcal{W} = \mathcal{V} \cap \mathcal{S}$. Ekkor \mathcal{W} egyetlen véges részrendszere sem fedi le X -et, így \mathcal{W} nem lehet lefedése X -nek. Legyen $x \in X \setminus (\cup \mathcal{W})$ és válasszunk egy $V \in \mathcal{V}$ halmazt, amely lefedi x -et. Mivel \mathcal{S} szubbázis, léteznek S_1, \dots, S_n halmazok \mathcal{S} -ből, amelyekre $x \in \cap_{j=1}^n S_j \subset V$. Mivel $x \notin \cup \mathcal{W}$, egyetlen S_j sincs a \mathcal{V} -ben. Mivel \mathcal{V} maximális, minden j -re van egy olyan A_j halmaz, amely véges sok \mathcal{V} -beli halmaz egyesítése, és amelyre $S_j \cup A_j = X$. Innen

$$V \cup (\cup_{j=1}^n A_j) \supset (\cap_{j=1}^n S_j) \cup (\cup_{j=1}^n A_j) = X,$$

és így X előáll véges sok \mathcal{V} -beli halmaz egyesítéseként. Ez ellentmond \mathcal{V} kiválasztásának.

* **3.138.3. Tyihonov tétele.** *Kompakt terek szorzata kompakt.*

Bizonyítás. Legyen $X = \prod_{i \in I} X_i$ a szóban forgó szorzattér és legyen \mathcal{S} ennek a szorzattopológia definíciójánál leírt szubbázisa. Alexander tételét felhasználva, elég egy $\mathcal{U} \subset \mathcal{S}$ lefedést vizsgálni. Legyen minden $i \in I$ -re \mathcal{U}_i az összes olyan $U_i \subset X_i$ nyílt halmazok osztálya, amelyekre $p_i^{-1}(U_i) \in \mathcal{U}$, ahol p_i az i -edik projekció. Megmutatjuk, hogy van olyan $i \in I$, amelyre $\cup \mathcal{U}_i = X_j$. Valóban, ha nem ez lenne a helyzet, akkor létezne olyan $x \in X$ pont, amely nem lenne $\cup \mathcal{U}$ -ban. Mivel X_j kompakt, létezik véges sok $U_{j,1}, \dots, U_{j,n}$ halmaz \mathcal{U}_i -ben, amelyre $X_j = \cup_{k=1}^n U_{j,k}$. Nyilván $p_j^{-1}(U_{j,k}), k = 1, 2, \dots, n$ egy véges lefedése X -nek.

* **3.138.4. Tétel.** *Megszámlálható bázisú T_3 -tér T_4 -tér is.*

Bizonyítás. Legyenek E és F diszjunkt zárt halmazok X -ben. Minden $x \in E$ -hez létezik a megszámlálható bázisnak olyan U_x eleme, amelyre $x \in U_x \subset \overline{U_x} \subset X \setminus F$ és minden $y \in F$ -hez létezik a megszámlálható bázisnak olyan V_y eleme, amelyre $y \in V_y \subset \overline{V_y} \subset X \setminus E$. Legyen $\cup_{x \in E} U_x = \cup_{n=1}^{\infty} U_{x_n}$ és $\cup_{y \in F} V_y = \cup_{n=1}^{\infty} V_{y_n}$. Legyen $G_n = U_{x_n} \setminus \cup_{k \leq n} \overline{V_{y_k}}$ és $H_n = V_{y_n} \setminus \cup_{k \leq n} \overline{U_{x_k}}$, és legyen $G = \cup_{n=1}^{\infty} G_n$, $H = \cup_{n=1}^{\infty} H_n$. Mivel $G_i \cap V_{y_j} = \emptyset$, ha $j \leq i$, azt kapjuk, hogy $G_i \cap H_j = \emptyset$, ha $j \leq i$. Hasonlóan adódik, hogy $H_j \cap G_i = \emptyset$, ha $i \leq j$. Innen $G \cap H = \emptyset$ és $E \subset G$, $F \subset H$.

* **3.138.5. Feladat: Urison-lemma [14]:** Legyen X egy T_4 tér, E és F diszjunkt zárt részhalmazai X -nek.

(1) Teljes indukcióval mutassuk meg, hogy minden $n \in \mathbb{N}$ -re az $r \in R = \{k/2^n : n = 0, 1, \dots ; k = 0, 1, \dots, 2^n\}$ diadikusan racionális számokhoz léteznek olyan $V(r)$ nyílt halmazok, amelyekre $E \subset V(0) \subset \overline{V(0)} \subset V(1) = X \setminus F$ és

$$\overline{V(k/2^n)} \subset V((2k+1)/2^{n+1}) \subset \overline{V((2k+1)/2^{n+1})} \subset V((k+1)/2^n),$$

ha $k = 0, 1, \dots, 2^n - 1$.

- (2) Legyen $f(x) = \inf\{1, r \in \mathbb{R} : x \in V(r)\}$ és mutassuk meg, hogy $f : X \rightarrow [0, 1]$ folytonos függvény, amely szétválasztja az E és F halmazokat.

* **3.138.6. Feladat: Tietze kiterjesztési tétele [14]:** Legyen X egy T_4 tér, F zárt részhalmaza X -nek, $I = [-1, 1]$ és legyen $f : F \rightarrow [-1, 1]$ folytonos függvény.

- (1) Teljes indukcióval adjunk meg olyan g_0, g_1, \dots és h_1, h_2, \dots folytonos függvényeket, amelyekre

$$g_n : X \rightarrow [-1 + (2/3)^n, 1 - (2/3)^n],$$

$$h_n : X \rightarrow [-2^{(n-1)}/3^n, 2^{(n-1)}/3^n],$$

$$g_n = g_{n-1} + h_n \text{ és } |f(x) - g_n(x)| \leq (2/3)^n.$$

- (2) Mutassuk meg, hogy létezik olyan $g : X \rightarrow I$ folytonos függvény, amelyre $g|_F = f$.
- (3) Mutassuk meg, hogy az állítás akkor is érvényben marad, ha I nem üres félig zárt, illetve nyílt intervallum.

* **3.138.7. Feladat: az egység felbontása [8].** Általánosítsuk az egység felbontását T_4 -térre, illetve lokálisan kompakt Hausdorff-térre.

** **3.138.8. Feladat [12].** Legyen \mathbb{R} -en \mathcal{O}_{\llbracket} az a szokásosnál erősebb topológia, amelynek az $[a, b[$, $a, b \in \mathbb{R}$ alakú halmazok alkotják egy bázisát. Mutassuk meg, hogy

- (1) \mathbb{Q} sűrű ebben a térben, így a tér szeparábilis;
- (2) a megadott bázisnak nincs megszámlálható $[a_n, b_n[$ részrendszere, amely bázis lenne, mert ezen halmazok közül az x pontot tartalmazók csak akkor alkotják egy környezetbázisát x -nek, ha $x = a_n$ valamely n -re;
- (3) a topológiának nincs megszámlálható bázisa;
- (4) ha E zárt halmaz, akkor azon E -beli pontok F halmaza, amely belső pontja a komplementernek a szokásos topológiában, megszámlálható;
- (5) ha F megszámlálható halmaz, akkor választva minden racionális végpontú nyílt intervallumból egy $\mathbb{R} \setminus F$ -beli pontot, egy, a szokásos topológiában sűrű halmazt kapunk;
- (6) az $]a, b[$, $a, b \in D$ és $[a, b[$, $a \in F$, $b \in D$ halmazok egy, a szokásosnál erősebb, de \mathcal{O}_{\llbracket} -nél gyengébb \mathcal{O} topológia megszámlálható bázisát alkotják;
- (7) az $(\mathbb{R}, \mathcal{O})$ tér reguláris, és így normális;
- (8) ha E_1 és E_2 diszjunkt zárt halmazok $(\mathbb{R}, \mathcal{O}_{\llbracket})$ -ben, akkor a (4) szerint hozzájuk tartozó F_1, F_2 megszámlálható halmazok F uniójához tartozó \mathcal{O} topológiában is zártak, így szétválaszthatók \mathcal{O} -beli nyílt halmazokkal;
- (9) az $(\mathbb{R}, \mathcal{O}_{\llbracket})$ tér normális;
- (10) az $(\mathbb{R}, \mathcal{O}_{\llbracket})$ tér önmagával vett szorzata szeparábilis, így kontinuum sok folytonos leképezése létezik $[0, 1]$ -be;
- (11) a szorzattérben a $\{(x, -x) : x \in \mathbb{R}\}$ halmaz minden részhalmaza zárt;

(11) a $\{(x, -x) : x \in \mathbb{R}\}$ halmaz egy adott részhalmazán 0-nak, az erre a halmazra vonatkozó komplementerén 1-nek definiált függvények folytonosak, de „túl sokan vannak” ahhoz, hogy mindegyik folytonosan kiterjeszthető legyen a szorzattér egy $[0, 1]$ -be való folytonos leképezésévé, így a szorzattér nem lehet normális.

** **3.139. Feladat: faktorterek [10].** Mutassuk meg, hogy ha (X, d) metrikus tér, és \tilde{d} metrika, továbbá $\tilde{U} \subset \tilde{X}$ nyílt a metrikus faktortérben, akkor $\cup \tilde{U}$ is nyílt X -ben. Mutassuk meg, hogy ha X kompakt és \tilde{d} metrika, akkor az \tilde{X} metrikus faktortérben egy $\tilde{U} \subset \tilde{X}$ halmaz pontosan akkor nyílt, ha $\cup \tilde{U}$ nyílt X -ben, azaz a metrikus faktortér topológiája megegyezik topologikus faktortér topológiájával. Mutassuk meg, hogy egy pályatér faktormetrikájának (ha létezik faktormetrika) a topológiája mindig a topologikus faktortér topológiája.

** **3.140. Feladat: öröklődés faktorterekre [14].** Mutassuk meg, hogy ha \sim egy ekvivalencia-reláció az X topologikus téren, amelyhez tartozó természetes leképezés zárt, azaz minden zárt halmazt zártba visz, akkor

- (1) ha X normális, akkor $\tilde{X} = X/\sim$ is normális;
- (2) ha X kompakt Hausdorff-tér, akkor \tilde{X} is az;
- (3) ha az ekvivalencia-osztályok kompaktak és X lokálisan kompakt Hausdorff-tér, akkor \tilde{X} is az.

* **3.141. Uniform terek.** Metrikus terek esetén néhány fogalomnál (teljesség, egyenletes folytonosság, stb.) az játszik szerepet, hogy az x és y pontok „ ε -közel” vannak ($\varepsilon > 0$), azaz fennáll az $xR_\varepsilon^d y$ reláció, ahol

$$R_\varepsilon^d = \{(u, v) : d(u, v) < \varepsilon\}.$$

Ez az észrevétel az uniform tér fogalmához vezet. Az (X, \mathcal{U}) párt *uniform térnek*, \mathcal{U} -t *uniformitásnak* nevezzük, ha X nem üres halmaz, \mathcal{U} pedig X reflexív relációiból álló szűrő úgy, hogy bármely reláció tartalmazza valamely reláció önmagával vett kompozícióját, és bármely reláció tartalmazza valamely relációt inverzét. Persze, az \mathcal{U} szűrő egy bázisával is megadható. Például könnyű látni, hogy az \mathcal{U} -beli szimmetrikus relációk \mathcal{U} egy bázisát adják. Ha $R \in \mathcal{U}$ és $(x, y) \in R$, azaz xRy , akkor azt szokás mondani, hogy x és y *R -közel* vannak. Egy metrikus tér a fenti R_ε^d , $\varepsilon > 0$ relációkkal példa uniform térre. Sokkal általánosabban, ha d_i , $i \in I$ eltérések egy tetszőleges családja X -en, akkor az $R_\varepsilon^{d_i}$, $\varepsilon > 0$, $i \in I$ relációk véges metszetei egy uniformitás egy bázisát alkotják; ez a d_i , $i \in I$ *eltéréscsaládból származó uniformitás*. Ha egy uniform térben az

$$\mathcal{O} = \{V : V \subset X, \text{ minden } x \in V\text{-hez van olyan } R \in \mathcal{U}, \text{ hogy } R(x) \subset V\}$$

halmazrendszer tekintjük, akkor X topologikus térré válik, így az uniform tér fogalma a topologikus térnél speciálisabb. Ha az uniformitásból származó topológia T_0 , akkor T_2 is, ugyanis mint könnyen látható, mindkettő azzal ekvivalens, hogy

$\bigcap_{R \in \mathcal{U}} R = \mathbb{I}_X$. Megmutatható, hogy már az $X \times X$ topologikus térben nyílt, illetve zárt szimmetrikus relációk is bázisát alkotják az uniformitásnak. Egy X uniform tér egy Y részhalmaza is uniform tér az $R \cap Y \times Y$, $R \in \mathcal{U}$ relációkkal, ez az uniform tér *uniform altere*. Könnyű látni, hogy az altér-uniformitásból az altér-topológia származik.

Legyenek (X, \mathcal{U}) és (Y, \mathcal{V}) uniform terek. Egy $f : X \rightarrow Y$ leképezést *egyenletesen folytonosnak* nevezünk, ha minden $S \in \mathcal{V}$ relációhoz van olyan $R \in \mathcal{U}$ reláció, hogy ha x és y R -közel vannak X -ben, akkor $f(x)$ és $f(y)$ S -közel vannak Y -ban. Az uniform terek izomorfiái a kölcsönösen egyértelmű és inverzükkel együtt egyenletesen folytonos leképezések. Legyen X tetszőleges halmaz, (Y_i, \mathcal{V}_i) , $i \in I$ uniform terek, $f_i : X \rightarrow Y_i$, $i \in I$ pedig leképezések indexelt családja. Az összes olyan X feletti uniform struktúrák metszete, amelyekre minden f_i , $i \in I$ egyenletesen folytonos, egy uniform struktúra X -en. Ha \mathcal{B}_i az \mathcal{U}_i egy bázisa, akkor ennek egy bázisa az összes $\left\{ (x, y) \in X \times X : (f_i(x), f_i(y)) \in S_i \in \mathcal{B}_i \right\}$ alakú relációk véges metszeteiből áll. Akárhány X_i , $i \in I$ uniform tér szorzata definiálható, mint a $\prod_{i \in I} X_i$ szorzathalmaz, az összes olyan uniformítások metszetével ellátva, amelyekre az összes $p_i : x \mapsto x_i$, $i \in I$ projekciók egyenletesen folytonosak. Könnyű látni, hogy a szorzat-uniformitásból a szorzat-topológia származik.

* **3.142. Feladat [13].** Tegyük fel, hogy V az X uniform tér egy relációja. Mutassuk meg, hogy

- (1) létezik szimmetrikus környékeknek egy V_1, V_2, \dots sorozata, hogy $V_1 \subset V$ és $V_{n+1}^3 \subset V_n$ minden n -re;
- (2) ha $h(x, y) = \inf \{1, 2^{-n} : (x, y) \in V_n\}$ és

$$d(x, y) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^n h(z_{i-1}, z_i) : n \in \mathbb{N}, z_0, z_1, \dots, z_n \in X, x = z_0, y = z_n \right\},$$

akkor d eltérés;

- (3) $\frac{1}{2}h(x, y) \leq d(x, y) \leq h(x, y)$, így $y \notin V(x)$ -re $d(x, y) \geq \frac{1}{2}$;
- (4) uniform tér T_π -tér;
- (5) bármely uniform struktúra származtatható eltéréscsaládból;
- (6) egy uniform struktúra pontosan akkor származtatható egyetlen eltérésből, ha megszámlálható bázisú;
- (7) egy Hausdorff uniform struktúra pontosan akkor származtatható metrikából, ha megszámlálható bázisú.

* **3.144. Feladat: Tyihonov beágyazási tétele [13].** Legyen X topologikus tér, és legyen Φ az X -et $[0, 1]$ -be képező folytonos leképezések egy halmaza.. Mutassuk meg, hogy

- (1) az $x \in X$ -hez a $\varphi \mapsto \varphi(x)$, ha $\varphi \in \Phi$ kiválasztási függvényt rendelő J leképezés egy $J : X \rightarrow [0, 1]^\Phi$ folytonos leképezés, amelyre $\varphi = p_\varphi \circ J$;

- (2) ha X egy T_π -tér, és Φ az összes, X -et $[0, 1]$ -be képező folytonos függvények halmaza, akkor az összes $W_\varphi = \varphi^{-1}[0, 1[$ halmazok X egy bázisát alkotják;
- (3) ha Φ az összes, X -et $[0, 1]$ -be képező folytonos függvények halmaza, akkor az a leggyengébb \mathcal{U} uniformitás $[0, 1]^\Phi$ -n, amelyre minden $\varphi \in \Phi$ egyenletesen folytonos, akkor \mathcal{U} -ból $[0, 1]^\Phi$ szorzattopológiája származik;
- (4) minden T_π -tér uniformizálható;
- (5) ha X teljesen reguláris, és Φ az X -et $[0, 1]$ -be képező folytonos függvények egy olyan halmaza, amelyre a $W_\varphi = \varphi^{-1}[0, 1[$ halmazok X egy bázisát alkotják, akkor a J leképezés homeomorfizmusa X -nek $J(X) \subset [0, 1]^\Phi$ -re;
- (6) egy topologikus tér pontosan akkor teljesen reguláris, ha homeomorf egy kompakt Hausdorff-tér egy alterével;
- (7) egy teljesen reguláris tér pontosan akkor megszámlálható bázisú, ha homeomorf $[0, 1]^\mathbb{N}$ egy alterével;
- (8) a $[0, 1]^\mathbb{N}$ tér homeomorf a Hilbert-kockával;
- (9) megszámlálható bázisú reguláris tér metrizálható;
- (10) kompakt Hausdorff-tér pontosan akkor megszámlálható bázisú, ha metrizálható.

- 122/−17 :

<

és abszolútérték-homogén.

>

és abszolútérték-homogén.

* **4.4.5. Feladat [7].** Mutassuk meg, hogy egy normált tér pontosan akkor nem szeparábilis, ha található benne nemmegszámlálható sok páronként diszjunkt 1 sugarú gömb.

- 127/1 :

<

* **4.21. Feladat [6].** Legyenek a *Bernoulli-polinomok* a $B_0 \equiv 1$, $B_1(x) = x - 1/2$, $B'_n = B_{n-1}$, $\int_0^1 B_n = 0$, ha $n > 1$ összefüggések által definiálva. Bizonyítsuk be, hogy

$$B_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} b_k x^{n-k},$$

ahol a b_k számok a *Bernoulli-szám* *Bernoulli-számok*. lenyelMegoldas Kiszámoljuk.

* **4.22. Feladat: Euler összegzési formulája [12].** Bizonyítsuk be, hogy ha az f függvény $2m + 1$ -szer differenciálható az $[1, n]$ intervallumon, $f^{(2m+1)}$ integrálható,

akkor

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f(k) &= \int_1^n f(x) dx + \frac{1}{2}(f(1) + f(n)) \\ &+ \sum_{j=1}^m B_{2j}(0) \left(f^{(2j-1)}(n) - f^{(2j-1)}(1) \right) \\ &+ \int_1^n B_{2m+1}(x - [x]) f^{(2m+1)}(x) dx, \end{aligned}$$

ahol a B_i függvények a Bernoulli-polinomok. (Ez a formula jól alkalmazható véges vagy végtelen összegek közelítésére.)

>

* **4.21. Feladat [8].** Legyenek a Bernoulli-polinomok a $B_0 \equiv 1$, $B'_n = B_{n-1}$, $\int_0^1 B_n = 0$, ha $n > 0$ összefüggések által definiálva. Bizonyítsuk be, hogy

$$n! B_n(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} b_k x^{n-k},$$

ahol az (n -től független) b_k számok a Bernoulli-számok. Mutassuk meg, hogy $b_0 = 1$ és

$$\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} b_k = 0,$$

ha $n > 1$.

* **4.22. Feladat: Euler összegzési formulája [12].** Bizonyítsuk be, hogy ha $m > 0$, az f függvény m -szer differenciálható az $[1, n]$ intervallumon, $f^{(m)}$ integrálható, akkor

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^n f(k) &= \int_1^n f(x) dx + \frac{1}{2}(f(1) - f(n)) \\ &+ \sum_{j=1}^m (-1)^j B_j(0) \left(f^{(j-1)}(n) - f^{(j-1)}(1) \right) \\ &+ (-1)^{m+1} \int_1^n B_m(x - [x]) f^{(m)}(x) dx, \end{aligned}$$

ahol a B_j függvények a Bernoulli-polinomok. (Ez a formula jól alkalmazható véges vagy végtelen összegek közelítésére.)

• 127/–13 :

<

* **4.24. Feladat: Stirling-formula [12].** Bizonyítsuk be a *Stirling-formulát*:

$$n! = \sqrt{2\pi} \frac{n^{n+1/2}}{e^n} e^{\frac{1}{12n} + c_n}, \quad \text{ahol} \quad |c_n| \leq \frac{1}{2n^2}.$$

>
* **4.24. Feladat: Stirling-formula [12].** Bizonyítsuk be a *Stirling-formulát*:

$$n! = \sqrt{2\pi} \frac{n^{n+1/2}}{e^n} e^{\frac{1}{12n} - c_n}, \quad \text{ahol } 0 \leq c_n \leq \frac{1}{180n^3}.$$

• 127/-6 :

<
fogalommal. Végtelen dimenziós térben egy másik, tisztán algebrai bázis
>
fogalommal. Végtelen dimenziós térben egy másik, tisztán algebrai bázis

• 132/4 :

<
nyilván $\mathcal{C}(X; Y) = \mathcal{B}(X; Y) = \mathcal{K}(X; Y)$.
>
nyilván $\mathcal{C}(X; Y) = \mathcal{B}(X; Y) = \mathcal{K}(X; Y)$.

* **4.45.5. Feladat [7].** Mutassuk meg, hogy

$$K = \{f \in \mathcal{C}[0, 1] : f(0) = 0, \text{Lip}(f) \leq 1\}$$

kompakt.

• 136/13 :

<
(2) $x_n = (1, 1, \dots, 1, 0, 0, \dots)$;
>
(2) $x_n = (1, 1, \dots, 1, 0, 0, \dots)$;
(2.5) $x_n = (1/n, 2/n, \dots, n/n, 0, 0, \dots)$;

• 136/-11 :

<
altereként fogjuk tekinteni. Ezen terek szokásos jelölése c_0 illetve c .
>
altereként fogjuk tekinteni. Ezen terek szokásos jelölése \mathbf{c}_0 illetve \mathbf{c} .
→ **4.66.5. Feladat [7].** Mutassuk meg, hogy a

$$H = \{(x_1, x_2, \dots) \in \mathbf{I}^2 : x_i \in \mathbb{R}, |x_i| \leq 1/i\}$$

Hilbert-kocka kompakt részhalmaza \mathbf{I}^2 -nek.

→ **4.66.7. Feladat [7].** Adjuk meg $[0, 1]$ egy folytonos leképezését a Hilbert-kockára.

- 141/8 :

<

mes kommutatív Banach-algebrára.

>

mes kommutatív Banach-algebrára. Egységelemes algebrában definiálható egy x elem $\sigma(x)$ spektruma, mint azon $\lambda \in \mathbb{K}$ skalárok halmaza, amelyekre $x - \lambda e$ -nek nem létezik multiplikatív inverze, valamint az $r(x)$ spektrálsugara, mint a spektrum elemei abszolút értékeinek szuprémuma. Csak a \mathbb{C} feletti egységelemes Banach-algebrák fontosak.

- 141/-10 :

<

$$(6) f(x) = \int_0^1 x^2(t) dt.$$

>

$$(6) f(x) = \int_0^1 x(t) dt - 2x(1/2);$$

$$(7) f(x) = \int_0^1 x^2(t) dt.$$

- 142/12 :

<

veszi fel.

>

veszi fel.

5.16.5. Feladat [6]. Mutassuk meg, hogy a

$$(Tx)(s) = \int_{-1}^1 x(t) \operatorname{sgn}(s-t) dt$$

összefüggés $\mathcal{C}[-1, 1]$ -et önmagába képező folytonos lineáris operátort definiál és határozzuk meg a normáját.

- 142/15 :

<

 $p = 1, 2, \infty$ esetén.

>

 $p = 1, 2, \infty$ esetén.

5.17.5. Feladat [12]. Általánosítsuk az előző feladatot $\mathbb{L}^p(\mu) \rightarrow \mathbb{L}^{p'}(\mu)$ típusú lineáris leképezésekre, ahol $p, p' \in \{1, 2, \infty\}$.

- $142/-11$:

<

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

>

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

5.18.5. Feladat [7]. Határozzuk meg a

$$T : (x_1, x_2, x_3, x_4, \dots) \mapsto (x_1 + x_2, x_3, x_4, \dots)$$

összefüggéssel definiált $T : \mathbb{I}^2 \rightarrow \mathbb{I}^2$ operátor normáját, ahol $x_j \in \mathbb{R}$.

- $142/-4$:

<

(4) ha $e - xy$ -nak van multiplikatív inverze, akkor $e - yx$ -nek is.

>

(4) ha $e - xy$ -nak van multiplikatív inverze, akkor $e - yx$ -nek is.

5.20.2. Feladat [10]. Legyen X a $[0, 1]$ intervallumon definált k -szor folytonosan differenciálható komplex értékű függvények \mathbb{C} feletti algebrája. Mutassuk meg, hogy

$$\|x\| = \sum_{j=0}^k \frac{1}{j!} \sup_{0 \leq t \leq 1} |x^{(j)}(t)|$$

norma, amellyel X egységelemes komplex Banach-algebra.

5.20.4. Feladat [12]. Legyen X egységelemes normált algebra. Mutassuk meg, hogy ha $x, y \in X$, akkor $xy - yx \neq e$.

** **5.20.6. Feladat [17].** Legyen X egységelemes komplex Banach-algebra. Mutassuk meg, hogy bármely $\alpha \in \mathbb{C}$, $x \in X$ -re

- (1) $\sigma(\alpha x) = \alpha \sigma(x)$;
- (2) $r(\alpha x) = |\alpha| r(x)$;
- (3) $r(x) \leq \|x\|$;
- (4) $\sigma(x)$ zárt halmaz;
- (5) $\sigma(x)$ nem üres;
- (6) $r(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x^n\|^{1/n} = \inf_n \|x^n\|^{1/n}$;
- (7) $r(x^n) = r(x)^n$;
- (8) $r(x) < 1$ pontosan akkor, ha $x^n \rightarrow 0$;

- (9) ha x invertálható, $\|x\| = \|x^{-1}\| = 1$, akkor $\sigma(x) \subset \{c \in \mathbb{C} : |c| = 1\}$;
 (10) ha p polinom, akkor $\sigma(p(x)) = p(\sigma(x))$; ha $0 \notin p(\sigma(x))$ és q egy másik polinom, akkor $p(x)^{-1}q(x) = q(x)p(x)^{-1}$ létezik és $t(x)$ -szel jelölve $t(\sigma(x)) = \sigma(t(x))$.

Mutassuk meg, hogy bármely $x, y \in X$ -re

- (11) ha x -nek van multiplikatív inverze, akkor $\sigma(xy) = \sigma(yx)$;
 (12) $\sigma(xy)$ és $\sigma(yx)$ egybeesnek $\{0\}$ komplementerén;
 (13) $r(xy) = r(yx)$;
 (14) ha $xy = yx$, akkor $r(x + y) = r(x) + r(y)$ és $r(xy) = r(x)r(y)$.

Mutassuk meg, hogy ha X kommutatív, akkor $x \mapsto r(x)$ folytonos.

5.20.7. Feladat [8]. Legyen X egységelemes komplex Banach-algebra és

$$b = \inf_{x \neq 0} \frac{\|x^2\|}{\|x\|^2}.$$

Mutassuk meg, hogy bármely $\alpha \in \mathbb{C}$, $x \in X$ -re

$$b \leq \inf_{x \neq 0} \frac{r(x)}{\|x\|} \leq \sqrt{b}.$$

5.20.8. Feladat [8]. Legyen X egységelemes komplex Banach-algebra. Mutassuk meg, hogy

- (1) ha $x \in X$ -nek van y jobbinverze, akkor minden $x' \in X$ -nek, amelyre $\|x' - x\| < 1/\|y\|$, szintén van jobbinverze;
 (2) ha $x_n \in X$ -nek van y_n jobbinverze, $x_n \rightarrow x$ és y_n korlátos, akkor x -nek is van jobbinverze.

5.20.9. Feladat [8]. Legyen Y az X egységelemes komplex Banach-algebra egy zárt részalgebrája ugyanazzal az egységelemmel. Mutassuk meg, hogy ha $x \in Y$, akkor $\sigma_X(x) \subset \sigma_Y(x)$ és $\sigma_X(x)$ tartalmazza $\sigma_Y(x)$ minden határpontját.

- 148/15 :

<

$i\mathcal{C}(X; \mathbb{C})$ -ben.

>

$i\mathcal{C}(X; \mathbb{C})$ -ben.

** **5.32.1. Feladat [8]:** Általánosítsuk az előző három tételt kompakt Hausdorff-térre.

- 151/−19 :

<

Bizonyítás. Legyen $f(\alpha x) = \alpha\|x\|$, ha $\alpha \in \mathbb{K}$, és alkalmazzuk a tételt.

* **5.42. Második konjugált tér.** Bármely X normált térre X^* Banach-tér. Képezhetjük a további konjugált tereket is: $X^{**} = (X^*)^*$, $X^{***} = (X^{**})^*$, stb. Az X és X^{**} között fontos kapcsolat van: ha $x \in X$ rögzített, legyen $F_x(f) = f(x)$, ha $f \in X^*$. A definícióból azonnal adódik, hogy F_x lineáris funkcionál X^* -on. F_x korlátos is, mert $|F_x(f)| = |f(x)| \leq \|f\| \|x\|$, amiből következik, hogy $\|F_x\| \leq \|x\|$. Továbbá a Hahn–Banach-tétel következménye miatt van olyan $f \in X^*$, amelyre $\|f\| = 1$, és $f(x) = \|x\|$. Erre az f -re $|F_x(f)| = \|x\|$, így $\|F_x\| = \|x\|$. Így az $x \mapsto F_x$ leképezése X -nek X^{**} -ba normatartó, tehát izometria. Ezt a leképezést az X normált tér X^{**} -ba való *természetes leképezésének* nevezzük. A definíció alapján azonnal következik, hogy a természetes leképezés lineáris. Ha a természetes leképezés X^{**} -ra képez, akkor X -et *reflexívnek* nevezzük. Természetesen ekkor X Banach-tér kell legyen.

* **5.43. Gyenge konvergencia:** Ha X tetszőleges halmaz, Y metrikus tér, (vagy általánosabban, ha topologikus tér), az Y^X függvénytérben és ennek altereiben értelmezve van a függvénysorozatok pontonkénti konvergenciája. (Ez a konvergencia származik a szorzattopológiából.) Ha $Y = \mathbb{K}$ és X normált tér \mathbb{K} felett (általánosabban, ha topologikus vektortér), akkor a folytonos lineáris funkcionálok terén ezt a konvergenciát *gyenge* konvergenciának* (egyek szerzők gyenge konvergenciának) szokták nevezni, a topológiát, amiből származik, pedig *gyenge* topológiának*. Jelentőségét az adja, hogy egy X normált tér X^* konjugált terének egységsgömbjét ebben a topológiában tekintve az kompakt, és ha X szeparábilis volt, akkor metrizableható is. Ezt a konvergenciát használva a normából származó konvergencia helyett, elkerülhető azoknak a nehézségeknek egy része, amelyek a variációszámításban és a parciális differenciálegyenleteknél az egységsgömb kompaktságának hiánya okoz. Ezért vezette be Hilbert ezt a konvergenciát.

Ha X Hilbert-tér, akkor a Riesz-féle reprezentációs tétel alapján X^* elemeit X elemeivel azonosíthatjuk, és így a gyenge* topológiát átmásolhatjuk X -re. Általánosabban, ha X normált tér, a következőképpen járhatunk el. Minden $x \in X$ -hez hozzárendelünk egy $F_x \in X^{**}$ lineáris funkcionált az $F_x(f) = f(x)$, ha $f \in X^*$ összefüggéssel. A Hahn–Banach-tétel következménye szerint az $x \mapsto F_x$ leképezés lineáris izometrikus beágyazása X -nek X^{**} -ba. Így X minden eleme egy X^* -on értelmezett funkcionálnak tekinthető, és X^{**} elemeinek pontonkénti konvergenciája (és a topológia, amiből származik) átmásolható X -re. Ezt a konvergenciát *gyenge konvergenciának*, a topológiát, amiből származik, *gyenge topológiának* szokás nevezni. Ha az $x \mapsto F_x$ leképezés az X^{**} -ra képez le, akkor X -et reflexívnek nevezzük, és X -et X^{**} -gal azonosíthatjuk. Reflexív terek esetén (speciálisan Hilbert-tereknél) a gyenge és gyenge* topológia megegyezik.

A gyenge és gyenge* topológiák vizsgálatával a topologikus vektorterek elmélete foglalkozik. A legegyszerűbb tényeket illetően lásd Losonczi [83] jegyzetét. Részletes hivatkozások találhatóak Zeidler [147] könyvében. Megjegyezzük, hogy a lineáris operátorok terében is fontos a pontonkénti konvergencia, amelyet néha erős konvergenciának szokás nevezni.

>

Bizonyítás. Legyen $f(\alpha x) = \alpha \|x\|$, ha $\alpha \in \mathbb{K}$, és alkalmazzuk a tételt.

- 153/−9 :

<

hogy $x = tx_0 + a$ -ra $t > 0$ esetén $f(x) > d$, holott $|t| < \varepsilon$ esetén $x \in A + \mathbb{U}_\varepsilon(0)$.

>

hogy $x = tx_0 + a$ -ra $t > 0$ esetén $f(x) > d$, holott $|t| < \varepsilon$ esetén $x \in A + \mathbb{U}_\varepsilon(0)$.

- * **5.44.1. Definíció:** Ha X normált tér, akkor $Y \subset X$ *annullátora* az

$${}^\perp Y = \{f \in X^* : f(y) = 0 \text{ minden } y \in Y\text{-ra}\}$$

halmaz, ami nyilván zárt lineáris altér. Ha $Y \subset X^*$, akkor Y *annulláltja* az

$$Y^\perp = \{x \in X : f(x) = 0 \text{ minden } f \in Y\text{-ra}\}$$

halmaz, ami nyilván zárt lineáris altér.

- * **Tétel:** Ha X normált tér, $Y \subset X$, akkor ${}^\perp({}^\perp Y)$ az Y lineáris burkának a lezártja.

Bizonyítás. Minden $f \in X^\perp$ nulltere zárt és tartalmazza Y -t, tehát Y lineáris burkának a lezártja része a metszetüknek. Így csak azt kell észrevennünk, hogy ha x nincs az Y lineáris burkának Z lezártjában, akkor a Hahn–Banach-tétel elválasztási alakja szerint van olyan $c \in \mathbb{R}$ és f valós lineáris folytonos funkcionál, hogy $f(Z) \leq c < f(x)$; mivel $f(Z)$ az \mathbb{R} altere, $f(Z) = \{0\}$ és $0 < f(x) \neq 0$, így $x \notin {}^\perp(Y^\perp)$. Ha X komplex tér, tekintsük az $f(x) - if(ix)$ funkcionált.

- * **5.44.2. Tétel:** Ha X normált tér és X^* szeparábilis, akkor X is.

Bizonyítás. Legyen $f_n \in X^*$ egy megszámlálható sűrű halmaz, és válasszunk minden n -re egy $x_n \in X$, $\|x_n\| = 1$ elemet, amelyre $|f_n(x_n)| > \|f_n\|/2$. Megmutatjuk, hogy az x_n -ek lineáris burka sűrű X -ben. Az előző tétel szerint elég azt megmutatnunk, hogy ha egy $f \in X^*$ lineáris funkcionál nulla minden x_n -en, akkor nulla mindenütt. Tegyük fel, hogy nem, és van olyan $f \in X^*$, amelyre $f(x_n) = 0$ minden n -re, de $\|f\| = 1$. Mivel az f_n -ek sűrű halmazt alkotnak, van olyan f_n , amelyre $\|f - f_n\| < 1/3$. De ekkor $1/3 > |(f - f_n)(x_n)| = |f_n(x_n)| > 1/2$.

- * **5.44.3. Második konjugált tér.** Bármely X normált térre X^* Banach-tér. Képezhetjük a további konjugált tereket is: $X^{**} = (X^*)^*$, $X^{***} = (X^{**})^*$, stb. Az X és X^{**} között fontos kapcsolat van: ha $x \in X$ rögzített, legyen $F_x(f) = f(x)$, ha $f \in X^*$. A definícióból azonnal adódik, hogy F_x lineáris funkcionál X^* -on. F_x korlátos is, mert $|F_x(f)| = |f(x)| \leq \|f\| \|x\|$, amiből következik, hogy $\|F_x\| \leq \|x\|$. Továbbá a Hahn–Banach-tétel következménye miatt van olyan $f \in X^*$, amelyre $\|f\| = 1$, és $f(x) = \|x\|$. Erre az f -re $|F_x(f)| = \|x\|$, így $\|F_x\| = \|x\|$. Így az $F : x \mapsto F_x$ leképezése X -nek X^{**} -ba normatartó, tehát izometria. Ezt az F leképezést

az X normált tér X^{**} -ba való természetes leképezésének nevezzük. A definíció alapján azonnal következik, hogy a természetes leképezés lineáris. Ha a természetes leképezés X^{**} -ra képez, akkor X -et reflexívnek nevezzük. Természetesen ekkor X Banach-tér kell legyen. Egy reflexív tér konjugált tere is reflexív: ha $G : f \mapsto G_f$ az X^* természetes leképezése X^{***} -ba, akkor tetszőleges $g \in X^{***}$ az értékkészletben van, mert az $f(x) = g(F_x)$ funkcionálra $G_f(F_x) = F_x(f) = f(x)$. Nyilvánvaló példák reflexív terekre a Hilbert-terek. Feladatként szerepelt az is, hogy az \mathbb{L}^p -terek reflexívek $1 < p < \infty$ esetén, konjugált terük \mathbb{L}^q , ahol $1/p + 1/q = 1$. Példa nem reflexív térre $\mathcal{C}[0, 1]$: minden $x \in [0, 1]$ -re az $f \mapsto f(x)$ funkcionálok a konjugált térben vannak, és távolságuk páronként 2, így a konjugált tér nem szeparábilis, tehát az előző tétel szerint a tér nem lehet reflexív. Az \mathbf{I}^1 tér sem reflexív, mert konjugált tere \mathbf{I}^∞ , ami nem szeparábilis. Ugyancsak nem reflexívek a \mathbf{c}_0 és \mathbf{c} terek, mert konjugált terük \mathbf{I}^1 , amint az nemsokára belátjuk.

* **5.44.4. Tétel:** *Ha Y az X reflexív Banach-tér zárt lineáris altere, akkor Y is reflexív.*

Bizonyítás. Az $f \mapsto f|_Y$ leképezés a Hahn–Banach-tétel szerint X^* -ot Y^* -ra képezi. Tetszőleges $\alpha \in Y^{**}$ -ra legyen $\beta(f) = \alpha(f|_Y)$. Mivel X reflexív, ez az eleme X^{**} -nak előáll F_x alakban valamely $x \in X$ -re, ahol F a természetes leképezése X -nek X^{**} -ra, azaz $\beta(f) = f(x)$. Megmutatjuk, hogy $x \in Y$. Mivel minden $f \in Y^\perp$ -re $f(x) = 0$, azt kapjuk, hogy x az Y lineáris burkának a lezártjában van.

* **5.44.5. Következmény:** *Ha X Banach-tér és X^* reflexív, akkor X is.*

Bizonyítás. Mivel X^* reflexív, X^{**} is. A $J : X \rightarrow X^{**}$ természetes beágyazás izometria, így $J(X)$ zárt altere a reflexív X^{**} térnek, így reflexív, azaz X is reflexív.

• 155/5 :

<

amiből következik az állítás.

* **5.50. Tétel.** *Ha az $y = (y_1, y_2, \dots)$ számsorozatra bármely $x = (x_1, x_2, \dots)$ konvergens sorozat esetén a $\sum_{k=1}^\infty x_k y_k$ sor konvergens, akkor $y \in \mathbf{I}^1$, azaz $\sum_{k=1}^\infty |y_k| < \infty$, és $f(x) = \sum_{k=1}^\infty x_k y_k$ korlátos lineáris funkcionál a konvergens sorozatok terén, amelynek normája $\|f\| = \|y\|_1$.*

>

amiből következik az állítás.

* **5.49.1. Gyenge és gyenge* topológia.** Ha X tetszőleges halmaz, Y metrikus tér, (vagy általánosabban, ha topologikus tér), az Y^X függvénytérben és ennek altereiben értelmezve van a függvénytér pontonkénti konvergenciája. (Ez a konvergencia származik a szorzattopológiából.) Ha $Y = \mathbb{K}$ és X normált tér \mathbb{K} felett (általánosabban, ha topologikus vektortér), akkor a folytonos lineáris funkcionálok terén ezt a konvergenciát — tehát a pontonkénti konvergenciát — gyenge* konvergenciának (egyes szerzők gyenge konvergenciának) szokták nevezni. A szorzattopológia megszorítása X^* -ra úgy is megadható, mint az összes olyan topológiák

metszete, amelyekre minden $f \mapsto f(x)$, $x \in X$ függvény folytonos; ezt *gyenge* topológiának* nevezzük. Ebből a topológiából a gyenge* konvergencia származik. Jelentőségét a *Banach–Alaoglu-tétel* adja: egy X Banach-tér X^* konjugált terének egységgömbjét ebben a topológiában tekintve az kompakt (megmutatható, hogy ha X szeparábilis volt, akkor metrizálható is). Ezt a konvergenciát használva a normából származó konvergencia helyett, elkerülhető azoknak a nehézségeknek egy része, amelyek a variációs számításban és a parciális differenciálegyenleteknél az egységgömb kompaktságának hiánya okoz. Ezért vezette be Hilbert ezt a konvergenciát.

Ha X Hilbert-tér, akkor a Riesz-féle reprezentációs tétel alapján X^* elemeit X elemeivel azonosíthatjuk, és így a gyenge* topológiát átmásolhatjuk X -re. Általánosabban, ha X normált tér, akkor X -nek X^{**} -ba való F természetes leképezése izometria, amely minden $x \in X$ -hez hozzárendel egy $F_x \in X^{**}$ lineáris funkcionált az $F_x(f) = f(x)$, ha $f \in X^*$ összefüggéssel. Így X minden eleme egy X^* -on értelmezett funkcionálnak tekinthető, és X^{**} elemeinek pontonkénti konvergenciája (és a topológia, amiből származik) átmásolható X -re. Ezt a konvergenciát *gyenge konvergenciának*, a topológiát, amiből származik, *gyenge topológiának* szokás nevezni. Nyilván reflexív terek esetén (speciálisan Hilbert-tereknél) a gyenge és gyenge* topológia megegyezik.

A gyenge és gyenge* topológiák vizsgálatával a topologikus vektorterek elmélete foglalkozik. A legegyszerűbb tényeket illetően lásd Losonczi [83] jegyzetét. Részletes hivatkozások találhatóak Zeidler [147] könyvében. Megjegyezzük, hogy a lineáris operátorok terében is fontos a pontonkénti konvergencia, amelyet néha erős konvergenciának szokás nevezni.

* **5.49.2. Feladat [9]:** Bizonyítsuk be a *Banach–Alaoglu-tételt*: egy X normált tér X^* konjugált terének egységgömbje a gyenge* topológiában kompakt.

* **5.49.3. Feladat [9]:** Mutassuk meg, hogy egy X szeparábilis normált térre X^* egységgömbjén a gyenge* topológia metrizálható.

* **5.49.4. Gyenge és gyenge* konvergencia.** Ha X normált tér \mathbb{K} felett, akkor a gyenge és gyenge* topológiáról mondottak szerint egy $x_n \in X$ sorozat *gyengén konvergál* $x \in X$ -hez, jelölésben $x_n \rightharpoonup x$ ($n \rightarrow \infty$), ha $f(x_n) \rightarrow f(x)$ minden $f \in X^*$ -ra, és egy $f_n \in X^*$ sorozat *gyenge* konvergál* $f \in X^*$ -hoz, jelölésben $f_n \xrightarrow{*} f$, ha $f_n(x) \rightarrow f(x)$ minden $x \in X$ -re. Egy példa: Hilbert-térben egy végtelen ortonormált sorozat gyengén konvergál nullához. A gyenge és gyenge* konvergencia jelentőségét a kiválasztási tételek adják.

* **5.49.5. Feladat: kiválasztási tétel gyenge* konvergenciára [9]:** Bizonyítsuk be, hogy ha X szeparábilis normált tér, akkor minden korlátos $f_n \in X^*$ sorozatnak van gyenge* konvergens részsorozata.

* **5.49.6. Kiválasztási tétel gyenge konvergenciára:** Ha x_n egy korlátos sorozat egy X reflexív Banach-térben, akkor van olyan részsorozata, amely gyengén konvergál.

Ez a tulajdonság jellemzi is a reflexív Banach-tereket, ez Eberlein (1947) és Šmuljam (1940) tétele; lásd Yosida [144], V. fejezet.

Bizonyítás. Legyen Y az x_n -ek lineáris burkának a lezártja. Mivel X reflexív, Y is, és mivel Y szeptarabilis, Y^* is. Legyen f_n az Y^* egy megszámlálható sűrű részhalmaza. A diagonális eljárással kiválasztható olyan $z_n = x_{j_n}$ részsorozata az x_n sorozatnak, amelyre minden k -ra $f_k(z_n)$ konvergál valamely $\alpha_k \in \mathbb{K}$ -hoz, ha $n \rightarrow \infty$. Innen bármely $f \in Y^*$ -ra $f(z_n) - f(z_m)$ kicsi, ha n, m elég nagyok, azaz $f(z_n)$ Cauchy-sorozat, tehát konvergál valamely $\alpha(f) \in \mathbb{K}$ -hoz. Az α funkcionál nyilván lineáris és $|\alpha(f)| \leq \|f\| \sup_n \|x_n\|$. Mivel Y reflexív, van olyan $x \in Y$, hogy $\alpha(f) = f(x)$ minden $f \in Y^*$ -ra, azaz $f(x_n) \rightarrow f(x)$. Mivel minden $f \in X^*$ megszorítása Y -ra az Y^* egy eleme, ez minden $f \in X^*$ -ra is teljesül.

* **5.49.7. Egyenletes konvexség:** Az X normált teret *lokálisan egyenletesen konvexnek* nevezzük, ha minden $x \in X$, $\|x\| \leq 1$ eleméhez és minden $\varepsilon > 0$ -hoz létezik olyan $\delta > 0$, hogy bármely $y \in X$ -re, amelyre $\|y\| \leq 1$ és $\|x + y\| \geq 2 - \delta$, teljesül, hogy $\|x - y\| \leq \varepsilon$. Ha δ az x -től függetlennek választható, akkor azt mondjuk, hogy a tér *egyenletesen konvex*. A Hilbert-terek nyilván egyenletesen konvexek a paralelogramma-azonosság miatt. Megmutatható, hogy $1 < p < \infty$ esetén az \mathbb{L}^p tér is egyenletesen konvex. A lokálisan egyenletes konvexségből következik a szigorú konvexség. Megmutatható, hogy egy reflexív Banach-térben mindig bevezethető egy, az eredeti normával ekvivalens norma, amelyre X és X^* már lokálisan egyenletesen konvexek. (Kadec (1959) és Troyanski (1971) tétele.)

* **5.49.8. A gyenge konvergencia alaptulajdonságai:** Legyen X Banach-tér, $x_n \in X$. Ekkor

- (1) ha $x_n \rightarrow x$, akkor $x_n \rightharpoonup x$;
- (2) ha X véges dimenziós és $x_n \rightharpoonup x$, akkor $x_n \rightarrow x$;
- (3) ha $x_n \rightharpoonup x$, akkor x_n korlátos és $\|x\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|$;
- (4) ha X lokálisan egyenletesen konvex, $x_n \rightharpoonup x$ és $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$, akkor $x_n \rightarrow x$ (Radon–Riesz-tulajdonság);
- (5) ha $x_n \rightharpoonup x$, akkor a $\{x_n\}$ halmaz zárt konvex burkában van olyan y_n sorozat, hogy $y_n \rightarrow x$ (Mazur tétele);
- (6) ha $x_n \rightharpoonup x$, akkor x a $\{x_n\}$ halmaz zárt konvex burkában van;
- (7) ha x_n korlátos és van olyan $D \subset X^*$ sűrű halmaz, hogy $f(x_n) \rightarrow f(x)$ minden $f \in D$ -re, akkor $x_n \rightharpoonup x$;
- (8) ha X reflexív és $f(x_n)$ konvergál minden $f \in X^*$ -ra, akkor van olyan x , hogy $x_n \rightharpoonup x$;
- (9) ha x_n minden részsorozatából kiválasztható olyan részsorozat, amely egy adott x -hez konvergál gyengén, akkor $x_n \rightharpoonup x$;
- (10) ha $x_n \rightharpoonup x$ és $f_n \rightarrow f$ az X^* -ban, akkor $f_n(x_n) \rightarrow f(x)$;
- (11) ha X reflexív, $x_n \rightarrow x$ és $f_n \rightharpoonup f$ az X^* -ban, akkor $f_n(x_n) \rightarrow f(x)$.

Bizonyítás. (1) és (2) triviálisak, (3) az egyenletes korlátosság tétele következményének speciális esete. (4) Nyilvánvaló, ha $x = 0$. Ha $x \neq 0$, akkor legyen $y = x/\|x\|$ és $y_n = y_n/\|y_n\|$ valahonnan kezdve. Ekkor $\|y\| = \|y_n\| = 1$, $y_n \rightarrow y$, és (3) szerint, mivel $y_n + y \rightarrow 2y$,

$$2 = \|2y\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|y_n + y\| \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \|y_n + y\| \leq 2,$$

így $\|y_n + y\| \rightarrow 2$, ahonnan következik az állítás. (5)-höz legyen C az x_n -ek zárt konvex burka. Tegyük fel indirekt, hogy $d(x, C) > 0$. Ekkor a Hahn–Banach-tétel elválasztási alakja szerint van olyan f valós folytonos lineáris funkcionál és $c \in \mathbb{R}$, hogy $f(C) \leq c < f(x)$, ami ellentmondás; a komplex esetben használjuk az $f(x) - if(ix)$ funkcionált. (6) nyilván következik (5)-ből. (7) következik a Banach–Steinhaus-tételből. (8)-hoz legyen $\alpha(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$, ha $f \in X^*$; α nyilván lineáris és az egyenletes korlátosság tételének következménye szerint korlátos is, azaz $\alpha \in X^{**}$. Mivel X reflexív, $\alpha(f) = f(x)$ valamely $x \in X$ -re, és $x_n \rightarrow x$. (9)-et indirekt bizonyítjuk: ha nem lenne igaz, akkor létezne olyan $f \in X^*$ és $\varepsilon > 0$, amelyre $|f(x_{n_k}) - f(x)| \geq \varepsilon$ teljesülne valamely részsorozatra. (10) és (11) nyilvánvalóak, mivel a gyenge konvergenciából következik a korlátosság.

* **5.49.9. Feladat [6]:** Bizonyítsuk be, hogy reflexív Banach-téren zárt konvex halmaztól való távolság felvétetik.

* **5.49.10. A gyenge* konvergencia alaptulajdonságai:** Legyen X Banach-tér, $f_n \in X^*$. Ekkor

- (1) ha $f_n \rightarrow f$, akkor $f_n \overset{*}{\rightharpoonup} f$;
- (2) ha $f_n \overset{*}{\rightharpoonup} f$, akkor f_n korlátos és $\|f\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|$;
- (3) ha f_n korlátos és van olyan $D \subset X$ sűrű halmaz, hogy $f_n(x) \rightarrow f(x)$ minden $x \in D$ -re, akkor $f_n \overset{*}{\rightharpoonup} f$;
- (4) ha minden $x \in X$ -re $f_n(x)$ konvergál minden, akkor van olyan f , hogy $f_n \overset{*}{\rightharpoonup} f$;
- (5) ha $x_n \rightarrow x$ az X -ben és $f_n \overset{*}{\rightharpoonup} f$, akkor $f_n(x_n) \rightarrow f(x)$.

Bizonyítás. Minden úgy bizonyítható, mint a gyenge konvergencia esetében.

* **5.50. Tétel.** Ha az $y = (y_1, y_2, \dots)$ számsorozatra bármely $x = (x_1, x_2, \dots)$ nullsorozat esetén a $\sum_{k=1}^{\infty} x_k y_k$ sor konvergens, akkor $y \in \mathbf{l}^1$, azaz $\sum_{k=1}^{\infty} |y_k| < \infty$, és $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k y_k$ korlátos lineáris funkcionál a \mathbf{c}_0 , \mathbf{c} és \mathbf{l}^{∞} tereken, amelynek normája $\|f\| = \|y\|_1$.

• 155/–14 :

<

nevezzük. Például az $1, 0, 1, 0, 1, \dots$ sorozat Cesaro-limesze $1/2$.

>

nevezzük. Például az $1, 0, 1, 0, 1, \dots$ sorozat Cesaro-limesze $1/2$. Ez az $r = 1$ speciális esete az r -ed rendű Cesaro-limesznek ($r > -1$), ahol

$$a_{j,k} = \frac{\binom{j-k+r-1}{j-k}}{\binom{r}{j}}.$$

Az r -ed rendű Hölder-limesz mátrixa a Cesaro-limesz mátrixának r -edik hatványa ($r \in \mathbb{N}$).

- 155/−9 :

<

5.52. Toeplitz tétele. Az előző definíció jelöléseivel, az A mátrixszal

>

5.52. Töplitz tétele. Az előző definíció jelöléseivel, az A mátrixszal

- 156/15 :

<

éppen (3)-at adják.

>

éppen (3)-at adják.

Feladat [9]. Alkalmazzunk Cesaro- és Hölder-féle limitálási eljárásokat az alábbi sorok részletösszegeire. Hasonlítsuk össze az eredményeket az Abel folytonossági tétele segítségével kapott határértékekkel.

- (1) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$;
- (2) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (2n + 1)$;
- (3) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n$;
- (4) $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n^2$.

Feladat: Tauber tétele [11]. Bizonyítsuk be, hogy ha a $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ sor részletösszegei Cesaro-limitálhatók és $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$, akkor a sor konvergens.

- 164/−0 :

<

>

5.73. Feladat [7]. Mutassuk meg, hogy a

$$(Tx)(t) = \int_0^t x(t) dt$$

összefüggés zárt lineáris operátort definiál $\mathcal{C}[0, 1]$ -en.

5.74. Feladat [2]. Adjunk meg \mathbb{I}^2 -n olyan normát, amely nem ekvivalens az eredetivel.

- 166/−3 :
<

tosan akkor Hilbert-tér, ha minden H_j Hilbert-tér.

>

tosan akkor Hilbert-tér, ha minden H_j Hilbert-tér.

6.5.5. Feladat [6]. Legyenek $(H_j, \langle \cdot \rangle_j)$, $j \in J$ belső szorzat terek,

$$H = \left\{ x \in \times_{j \in J} H_j : \sum_{j \in J} \|x_j\|^2 < \infty \right\}$$

és legyen $\langle x, y \rangle = \sum_{j \in J} \langle x_j, y_j \rangle_j$. Mutassuk meg, hogy H belső szorzat tér, a *belső szorzat terek szorzata*, és H pontosan akkor Hilbert-tér, ha minden H_j Hilbert-tér.

- 173/−8 :
<

rendszer.

>

rendszer.

6.32.2. Feladat [8]. Ortonormáljuk $\mathbb{L}^2[-1, 1]$ -ben az $1, x, x^2$ függvényrendszert.

6.32.4. Feladat [9]. Ortonormáljuk a megadott függvényrendszert a megadott súlyfüggvényre a megadott intervallumon:

- (1) $1, x, x^2$, $\varrho(x) = e^{-x}$, $x \in [0, \infty[$;
- (2) $1, x, x^2$, $\varrho(x) = x^2$, $x \in [0, 1]$;
- (3) $1, x, x^2$, $\varrho(x) = \sin \pi x$, $x \in [0, 1]$.

6.32.6. Feladat [9]. Határozzuk meg az alábbi távolságokat:

- (1) x távolsága x^2, x^3 lineáris burkától $\mathbb{L}^2[0, 1]$ -ben;
- (2) 1 távolsága $\sin x, \cos x$ lineáris burkától $\mathbb{L}^2[-\pi, \pi]$ -ben;
- (3) x^3 távolsága $1, x, x^2$ lineáris burkától $\mathbb{L}^2[0, 1]$ -ben;
- (4) x^3 távolsága x, x^2 lineáris burkától $\mathbb{L}^2[0, 1]$ -ben.

6.32.8. Feladat [9]. Fejtsük sorba a Legendre-polinomok szerint a $\sin \pi x$ függvényt $\mathbb{L}^2[-1, 1]$ -ben.

* **6.32.9. Feladat [17].** Legyen φ_n , $n = 1, 2, \dots$ egy teljes ortonormált rendszer egy H Hilbert-térben, és ψ_n egy ortonormált rendszer H -ban. Tegyük fel, hogy $\sum_{n=1}^{\infty} \|\psi_n - \varphi_n\|^2 < \infty$. Mutassuk meg, ψ_n is teljes.

- 174/2 :
<

ortogonális alterei, akkor $M + N$ is zárt altér.

→ **6.36. Feladat [7]**. Igazoljuk, hogy az alábbi függvények korlátos lineáris funkcionálok $\mathbb{L}^2[0, 1]$ -en, és határozzuk meg a normájukat:

- (1) $f(x) = \int_0^1 x(t) \sin t \, dt$;
- (2) $f(x) = \int_0^{1/2} tx(t^2) \, dt$;
- (3) $f(x) = \int_0^1 x(t)(t - 1/2) \, dt$.

→ **6.37. Feladat [9]**. Vizsgáljuk meg, hogy az alábbi funkcionálok az egész \mathbb{I}^2 -n értelmezhetőek-e, folytonosak-e, lineárisak-e, és határozzuk meg a normájukat ($x = (\xi_1, \xi_2, \dots) \in \mathbb{I}^2$):

- (1) $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k \sin k$;
- (2) $f(x) = \sup_k |\xi_k|$;
- (3) $f(x) = \xi_n$;
- (4) $f(x) = \xi_{n+1} - \xi_n$;
- (5) $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k^2$;
- (6) $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^2$.

>

ortogonális alterei, akkor $M + N$ is zárt altér.

6.35.3. Feladat [7]. Mutassuk meg, hogy az $M = \{x = (\xi_1, 0, \xi_2, 0, \dots) \in \mathbb{I}^2\}$ és $N = \{y = (\eta_1, \eta_1, \eta_3, \eta_3/3, \dots) \in \mathbb{I}^2\}$ alterek összege nem \mathbb{I}^2 , de sűrű \mathbb{I}^2 -ben.

6.35.6. Feladat [7]. Mutassuk meg, hogy ha M_γ , $\gamma \in \Gamma$ zárt alterek egy rendszere egy H Hilbert-térben, akkor

$$\left(\bigcap_{\gamma \in \Gamma} M_\gamma\right)^\perp = \overline{\bigcup_{\gamma \in \Gamma} M_\gamma^\perp}$$

és

$$\left(\bigcup_{\gamma \in \Gamma} M_\gamma\right)^\perp = \bigcap_{\gamma \in \Gamma} M_\gamma^\perp$$

→ **6.36. Feladat [7]**. Vizsgáljuk meg, hogy az alábbi funkcionálok az egész $\mathbb{L}^2[0, 1]$ -en értelmezhetőek-e, folytonosak-e, lineárisak-e, és határozzuk meg a normájukat:

- (1) $f(x) = \int_0^1 x(t) \sin t \, dt$;
- (2) $f(x) = \int_0^{1/2} tx(t^2) \, dt$;
- (3) $f(x) = |x(1/2)|$;
- (4) $f(x) = x'(1/2)$;
- (5) $f(x) = \int_0^1 x(t)(t - 1/2) \, dt$;
- (6) $f(x) = \int_0^\infty \sqrt{t} e^{-t} x(e^{-t}) \, dt$.

→ **6.37. Feladat [9]**. Vizsgáljuk meg, hogy az alábbi funkcionálok az egész \mathbb{I}^2 -n értelmezhetőek-e, folytonosak-e, lineárisak-e, és határozzuk meg a normájukat ($x = (\xi_1, \xi_2, \dots) \in \mathbb{I}^2$):

- (1) $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k \sin k$;
- (2) $f(x) = \sup_k |\xi_k|$;
- (3) $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|$;
- (4) $f_n(x) = \xi_n$;
- (5) $f_n(x) = \xi_{n+1} - \xi_n$;
- (6) $f_n(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_k \operatorname{sgn}(k - n)$;
- (7) $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \xi_{k^2}$;
- (8) $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} |\xi_k|^2$.

6.37.3. Feladat [8]. Igazoljuk, hogy ha φ_n , $n = 1, 2, \dots$ zárt rendszer $\mathbb{L}^2[0, 1]$ -ben, akkor

$$\Phi_0 \equiv 1, \quad \Phi_n(x) = \int_0^x \varphi_n(t) dt$$

lineáris burka sűrű $\mathcal{C}[0, 1]$ -ben.

6.37.6. Feladat [8]. Igazoljuk, hogy ha $f : [0, \infty[\rightarrow \mathbb{R}$ mérhető, $f(t+1) = f(t)$, ha $t \geq 0$, $f(t) = -f(t+1/2)$, ha $0 < t < 1/2$, és $\int_0^1 f^2(t) dt < \infty$, akkor $\varphi_n(t) = f(2^n t)$, $n = 0, 1, 2, \dots$ ortogonális rendszer $\mathbb{L}^2[0, 1]$ -ben.

- 191/−13 :

<

Ha T nem feltétlenül korlátos, de sűrű halmazon van definiálva, akkor azon

>

Ha $T \in X \rightarrow Y$ lineáris, nem feltétlenül korlátos, de sűrű halmazon van definiálva, akkor azon

- 191/−9 :

<

(A kiterjesztés egyértelműségéhez szükséges, hogy $\operatorname{dmn}(T)$ sűrű legyen H -ban.) Köny-
nyű kiszámolni, hogy $T^* \in Y \rightarrow X$ lineáris operátor; T^* a T adjungáltja. Nyilván-
való, hogy ha T korlátos, akkor T^* mindenütt értelmezve van. Az is nyilvánvaló,
hogy ha $T \subset S$, akkor $S^* \subset T^*$. Ha $TT^* = \mathbb{I}$ és $T^*T = \mathbb{I}$, akkor T -t unitérnek
nevezzük.

>

(A kiterjesztés egyértelműségéhez szükséges, hogy $\operatorname{dmn}(T)$ sűrű legyen X -ben.) Köny-
nyű kiszámolni, hogy $T^* \in Y \rightarrow X$ lineáris operátor; T^* a T adjungáltja. Nyilván-
való, hogy ha T korlátos, akkor T^* mindenütt értelmezve van. Az is nyilvánvaló,
hogy ha $T \subset S$, akkor $S^* \subset T^*$. Ha $T^*T = \mathbb{I}_X$ és $TT^* = \mathbb{I}_Y$, akkor T -t unitérnek
nevezzük.

- 193/19 :

<
 $\mathcal{L}(H; H)$, ahol H egy komplex Hilbert-tér, az adjungáltképzéssel.

>
 $\mathcal{L}(H; H)$, ahol H egy komplex Hilbert-tér, az adjungáltképzéssel. Ha egy *-algebra egy x elemére $x = x^*$ illetve $xx^* = x^*x$, akkor x -et *önadjungált*nak illetve *normális*nak nevezzük. Ha egy egységelemes *-algebra egy x elemére $xx^* = x^*x = e$, akkor azt mondjuk, hogy x *unitér*. Csak az egységelemes B^* -algebrák fontosak.

- 193/−17 :

<
 zetének utolsó fejezetét.

>
 zetének utolsó fejezetét.

* **7.33.5. Feladat [7].** Legyen X egy egységelemes B^* -algebra. Mutassuk meg, hogy

- (1) $e^* = e$;
- (2) tetszőleges $x \in X$ -re $\|x^*\| = \|x\|$;
- (3) tetszőleges $x \in X$ -re $x_r = (x + x^*)/2$ és $x_i = (x - x^*)/(2i)$ önadjungáltak és $x = x_r + ix_i$;
- (4) ha x invertálható, akkor x^* is és $(x^*)^{-1} = (x^{-1})^*$;
- (5) ha x normális, akkor $r(x) = \|x\|$.

- 193/−5 :

<
 perátor.

>
 perátor.

* **7.34.5. Feladat [8].** Legyen H Hilbert-tér és $P, Q \in \mathcal{L}(H; H)$ önadjungált projekció. Mutassuk meg, hogy

- (1) PQ pontosan akkor önadjungált projekció, ha $PQ = QP$;
- (2) $P + Q$ pontosan akkor önadjungált projekció, ha $PQ = 0$;
- (3) az előző feltétel azzal ekvivalens, hogy $\text{rng}(P) \perp \text{rng}(Q)$;
- (4) $P - Q$ pontosan akkor önadjungált projekció, ha $PQ = Q$;
- (3) az előző feltétel azzal ekvivalens, hogy $\text{rng}(Q) \subset \text{rng}(P)$.

- 194/8 :

- <
- (2) $\text{dmn}(U) = X$, $\text{rng}(U) = Y$ és $\langle Ux, Uy \rangle = \langle x, y \rangle$ bármely $x, y \in H$ -ra;
 - (3) $\text{dmn}(U) = X$, $\text{rng}(U) = Y$ és $\|Ux\| = \|x\|$ bármely $x \in H$ -ra.

>

(2) $\text{dmn}(U) = X$, $\text{rng}(U) = Y$, U lineáris és $\langle Ux, Uy \rangle = \langle x, y \rangle$ bármely $x, y \in H$ -ra;(3) $\text{dmn}(U) = X$, $\text{rng}(U) = Y$, U lineáris és $\|Ux\| = \|x\|$ bármely $x \in H$ -ra.

- 194/8 :

<

7.37. Tétel. Legyen X komplex Hilbert-tér. Ha a $T \in \mathcal{L}(H; H)$ operátor önadjungált, akkor a spektruma valós. Ha T nemnegatív operátor, akkor

>

* **7.36.5. Feladat [14].** Mutassuk meg, hogy az előző tétel feltételei akkor is ekvivalensek, ha X, Y valós Hilbert-terek, valamint ekkor (és csak ekkor) ekvivalensek az alábbi feltétellel:

(4) $\text{dmn}(U) = X$, $\text{rng}(U) = Y$, $U(0) = 0$ és U távolságtartó.

7.37. Tétel. Legyen H komplex Hilbert-tér. Ha a $T \in \mathcal{L}(H; H)$ operátor önadjungált, akkor a spektruma valós. Ha $T \in \mathcal{L}(H; H)$ nemnegatív operátor, akkor

- 195/15 :

<

becslésből pedig, hogy inverze mindenütt értelmezett korlátos operátor.

>

becslésből pedig, hogy inverze mindenütt értelmezett korlátos operátor.

→ **7.37.5. Feladat [5].** Mutassuk meg, hogy ha H komplex Hilbert-tér, akkor $T \in \mathcal{L}(H; H)$ pontosan akkor önadjungált, ha $\langle Tx, x \rangle \in \mathbb{R}$ minden $x \in H$ -ra.

- 197/-8 :

<

$x(0) = x(1)$, vagy az $x(0) = x(1) = 0$ peremfeltételt kielégítő függvényei. Mindhárom esetben vizsgáljuk meg, hogy az operátor szimmetrikus-e, határozzuk meg a lezártját, az adjungáltját, és annak az adjungáltját.

>

$x(0) = x(1)$, vagy az $x(0) = x(1) = 0$, végül az $|x(0)| = |x(1)| \neq 0$ peremfeltételt kielégítő függvényei. Mindhárom esetben vizsgáljuk meg, hogy az operátor szimmetrikus-e, határozzuk meg a lezártját, az adjungáltját, és annak az adjungáltját. Ugyanezt az operátort vizsgáljuk az $L^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ tér $\mathcal{K}(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ alterén értelmezve, illetve az $L^2([0, \infty[; \mathbb{C})$ tér $\mathcal{K}([0, \infty[; \mathbb{C})$ alterén értelmezve, illetve ezen alternél $x(0) = 0$ feltételnek eleget tevő függvényein értelmezve.

→ **7.54.5. Feladat [8].** Egy H Hilbert-tér egy M zárt altere invariáns egy $T \in \mathcal{L}(H; H)$ -ra, ha $T(M) \subset M$. Az M redukálja T -t, ha M és M^\perp is invariáns T -re. Bizonyítsuk be, hogy

- (1) M pontosan akkor invariáns T -re, ha $M \perp$ invariáns T^* -ra;
- (2) M pontosan akkor redukálja T -t, ha invariáns T -re és T^* -ra is;

- (3) ha zárt alterek egy M_γ , $\gamma \in \Gamma$ rendszere invariáns T -re illetve redukálja T -t, akkor

$$\bigcap_{\gamma \in \Gamma} M_\gamma \quad \text{és} \quad \overline{\bigcup_{\gamma \in \Gamma} M_\gamma}$$

is invariáns T -re illetve redukálja T -t.

- 216/12 :

<
 $[0, \infty)$.

>
 $[0, \infty[$.

7.82.3. Feladat [5]. Mutassuk meg, hogy ha H komplex Hilbert-tér, $T \in \mathcal{L}(H; H)$ normális és $T^2 = T$, akkor T önadjungált.

7.82.6. Feladat [5]. Mutassuk meg, hogy ha H komplex Hilbert-tér, $T \in \mathcal{L}(H; H)$ normális, akkor T pontosan akkor invertálható, ha van olyan $c > 0$, hogy $\|Tx\| \geq c\|x\|$ minden $x \in H$ -ra.

- 217/-4 :

<
 T önadjungált.

>
 T önadjungált.

7.101.5. Feladat [5]. Mutassuk meg, hogy ha H komplex Hilbert-tér, $U \in \mathcal{L}(H; H)$ unitér és $U - \mathbb{I}$ invertálható, akkor a $T = i(U + \mathbb{I})(U - \mathbb{I})^{-1}$ operátor önadjungált.

- 220/-11 :

<
tömege, $\approx 9,10939 \cdot 10^{-28}$ g. (Ha a mag mozgását is figyelembe akarjuk venni,

>
tömege, $\approx 9,10939 \cdot 10^{-28}$ g. (Ha a mag mozgását is figyelembe akarjuk venni,

- 223/-6 :

<
Úgy is tekinthető, mint a relaxáció egy esete. A részleteket illetően lásd

>
Úgy is tekinthető, mint a relaxáció egy esete. A részleteket illetően lásd a

- 227/-0 :

<

>

8.7.2. Feladat [6]. Legyen $T \in \mathcal{L}(X; X)$ az X végtelen dimenziós Banach-tér egy kompakt operátora. Mutassuk meg, hogy nem reguláris.

8.7.4. Feladat [6]. Mutassuk meg, hogy a $(Tx)(t) = tx(t)$ összefüggéssel definiált operátor nem kompakt $\mathcal{C}[0, 1]$ -en.

8.7.6. Feladat [10]. Legyen $T \in \mathcal{L}(X; Y)$ az X végtelen dimenziós Banach-tér egy kompakt leképezése az Y normált térbe. Mutassuk meg, hogy van olyan normált x_n sorozat X -ben, amelyre $Tx_n \rightarrow 0$.

8.7.8. Feladat [10]. Legyen X szeparábilis Hilbert-tér az x_n teljes ortonormált rendszerrel, $T \in \mathcal{L}(X; Y)$ az X egy kompakt leképezése az Y normált térbe. Mutassuk meg, hogy $Tx_n \rightarrow 0$.

• 236/−1 :

<
teleinek?

>
teleinek?

* **8.36. Lemma.** Legyen X egy metrikus tér, T pedig X egy zárt részhalmazának folytonos leképezése X egy kompakt részhalmazába. Tegyük fel, hogy minden $\varepsilon > 0$ -hoz van olyan x_ε , hogy

$$(1) \quad d(T(x_\varepsilon), x_\varepsilon) < \varepsilon.$$

Ekkor T -nek van fixpontja.

Az (1) feltételnek eleget tévő x_ε pontokat a T leképezés ε -fixpontjainak nevezük.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy T az F zárt részhalmazt a K kompakt halmazba képezi le. Mivel $T(x_\varepsilon) \in K$, feltehetjük, hogy valamely $\varepsilon_n \rightarrow 0$ sorozatra $T(x_{\varepsilon_n}) \rightarrow x \in K$. Az (1) feltétel szerint $x_{\varepsilon_n} \rightarrow x$, így $x \in F$. Tehát $T(x)$ definiálva van, és $T(x) = T(\lim_{n \rightarrow \infty} x_{\varepsilon_n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} T(x_{\varepsilon_n}) = x$.

* **8.37. Lemma: Schauder-projekció.** Ha K az X normált tér kompakt részhalmaza és $\varepsilon > 0$, akkor van olyan Y véges részhalmaza K -nak és P folytonos leképezése K -nak Y konvex burkába, hogy $\|P(x) - x\| < \varepsilon$ minden $x \in K$ -ra.

Bizonyítás. Válasszunk egy $\{y_1, \dots, y_n\} = Y$ véges ε -hálót K -ban. Legyen

$$f_i(x) = \max\{0, \varepsilon - \|x - y_i\|\}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

Nyilván $f_i(x) \neq 0$ pontosan akkor, ha $\|x - y_i\| < \varepsilon$. Így minden $x \in K$ -ra valamelyik $f_i(x)$ nem nulla. Legyen

$$P(x) = \sum_{i=1}^n \frac{f_i(x)y_i}{\sum_{j=1}^n f_j(x)}, \quad \text{ha } x \in K.$$

Nyilván P folytonos, és mivel $P(x)$ az x -hez ε -nál közelebb lévő pontok konvex kombinációja, $\|P(x) - x\| < \varepsilon$.

* **8.38. Schauder második fixponttétele.** Legyen C az X normált tér egy nem üres konvex részhalmaza. Legyen T a C egy folytonos leképezése egy $K \subset C$ kompakt halmazba. Ekkor T -nek van fixpontja.

Bizonyítás. Tekintsük $n = 1, 2, \dots$ -re a $P_n \circ T$ leképezést, ahol P_n az előző lemma szerint $\varepsilon = 1/n$ -hez tartozó leképezés. Mivel $Y \subset K \subset C$, az Y halmaz konvex burka is része C -nek. Mivel Y konvex burka véges dimenziós kompakt konvex halmaz és $P_n \circ T$ ezt folytonosan képezi le önmagába, a Brouwer-féle fixponttétel szerint létezik egy x_n fixpontja. A $P_n(T(x_n)) = x_n$ összefüggésből $\|T(x_n) - x_n\| < 1/n$. Így T -nek van fixpontja.

* **8.39. Következmény: Schauder első fixponttétele.** Egy normált tér bármely nem üres kompakt konvex részhalmaza fixpont-tulajdonságú.

* **8.40. Feladat [9].** Bizonyítsuk be Peano tételét Schauder második fixponttétele segítségével.

• 243/–9 :

<

általános eset bizonyítása megtalálható Zeidler [149] könyvében, 4.14. Egy jóval általánosabb változat bizonyítása található Páles [100] jegyzetében.

>

általánosabb változatot később bizonyítjuk.

• 255/–16 :

<

nem sikerült, akkor t_1 és t_2 abszolút értékét csökkenteni kell. t_1 értékének jó

>

nem sikerült, akkor t_1 és t_2 abszolút értékét csökkenteni kell; t_1 értékének jó

• 257/16 :

<

Időnként újra számolva a deriváltat, a konvergencia gyorsítható.

>

Időnként újra számolva a deriváltat, a konvergencia gyorsítható.

A fékezett Newton-módszernél az $f'(x_n)\Delta x_n = -f(x_n)$ egyenletből meghatározzuk Δx_n -et, de $x_{n+1} = x_n + \alpha_n \Delta x_n$, ahol az $0 < \alpha_n \leq 1$ relaxációs paramétert úgy választjuk, hogy $\|f(x_{n+1})\|^2 < \|f(x_n)\|^2$ legyen. Ez mindig lehetséges, ha az egyenlet megoldható és a norma belső szorzatból származik: Az $\|f\|^2$ -nek a Δx_n irány menti deriváltja az x_n helyen

$$2\langle f(x_n), f'(x_n)\Delta x_n \rangle = -2\|f(x_n)\|^2,$$

így

$$\frac{\|f(x_n + \alpha \Delta x_n)\|^2 - \|f(x_n)\|^2}{\alpha \|f(x_n)\|^2} \rightarrow -2,$$

ha $\alpha \rightarrow 0$. Általában azt követeljük meg, hogy a hányados kisebb legyen, mint $1 - \sigma$ valamely $0 < \sigma < 1/2$ értékre. (Rendszerint $10^{-5} \leq \sigma \leq 10^{-1}$.) Ezt úgy érjük el, hogy $\alpha_n = 1$ választással próbálkozunk, és ha a feltétel nem teljesül, akkor csökkentjük α_n -et, rendszerint szorozzuk ϱ -val, ahol $0 < \varrho < 1$, általában $0,3 \leq \varrho \leq 0,8$.

A módosított Newton-módszerből is képezhető fékezett változat, de itt már nem biztos, hogy a feltétel teljesíthető, esetleg újra kell számolni a deriváltat.

- 259/−16 :

<

nem sikerült, akkor t_1 és t_2 abszolút értékét csökkenteni kell. t_1 értékének jó

>

nem sikerült, akkor t_1 és t_2 abszolút értékét csökkenteni kell; t_1 értékének jó

- 259/−1 :

<

* **9.53. Algebrai egyenletek megoldása.** A Newton-módszer minden további nélkül alkalmazható komplex változós, komplex értékű f függvényre is. Hogy a konvergenciát biztosabbá tegyük, kezdetben alkalmazhatjuk a gradiens módszert az $|f|$ függvényre. Ennek gradiense $f(x)/f'(x)$ irányú, ha $f(x) \neq 0$ és $f'(x) \neq 0$. Így az $x_{n+1} = x_n - tf(x_n)/f'(x_n)$ alakban kell keresnünk a következő közelítést, ahol t pozitív valós szám. Eljárhatunk úgy, hogy először $t = 1$ -el próbálkozunk, ami a Newton-módszernek felel meg. Ha az így kapott x_{n+1} -re $|f(x_{n+1})| < |f(x_n)|$, akkor ezt választjuk következő közelítésnek, egyébként t -t csökkentjük. Az iteráció csak akkor szakad meg, ha valamelyik lépésben $f'(x_n) = 0$.

>

* **9.53. Algebrai egyenletek megoldása.** A fékezett Newton-módszer minden további nélkül alkalmazható komplex változós, komplex értékű f függvényre is. Az iteráció csak akkor szakad meg, ha valamelyik lépésben $f'(x_n) = 0$.

- 269/−3 :

<

$g_{ij} = \langle \partial_i r, \partial_j r \rangle$, $1 \leq i, j \leq 2$. A $g_{i,j}$ számokat első alaplmenyiségeknek

>

$g_{ij} = \langle \partial_i r, \partial_j r \rangle$, $1 \leq i, j \leq 2$. A g_{ij} számokat első alaplmenyiségeknek

- 276/−1 :

<

összegörbülete nulla.

>

összegörbülete nulla.

* **10.31. Térkép, atlasz, sokaság.** Egy m -dimenziós térkép vagy koordinátarendszer egy X metrikus tér egy nyílt részhalmazát \mathbb{R}^m egy nyílt részhalmazára képező φ homeomorfizmus. A φ és ψ m -dimenziós térképek C^r -összeférhetőek ($0 \leq r \leq \infty$), ha $\varphi \circ \psi^{-1}$ és $\psi \circ \varphi^{-1}$ is C^r -leképezések (ezek a φ és ψ értelmezési tartománya metszetének φ és ψ általi képeit képezik le egymásra). Egy m -dimenziós C^r -atlasz az X m -dimenziós térképeinek egy C^r -összeférhető $\varphi_i, i \in I$ családja úgy, hogy a φ_i térképek értelmezési tartományai lefedik X -et. Egy m -dimenziós C^r -sokaság egy M szeparábilis metrikus tér amelyen meg van adva egy m -dimenziós C^r -atlasz. A C^r -atlaszhoz M akárhány további m -dimenziós térképét hozzávehetjük, ha azok C^r -összeférhetőek az eredeti atlasz térképeivel, mert ekkor egymással is C^r -összeférhetőek lesznek. Gyakran érdemes technikai okokból egy atlaszhoz hozzávenni az összes vele C^r -összeférhető térképet; az így kapott atlaszt az adott atlaszhoz tartozó *telített atlasznak* nevezzük. A C^∞ -sokaságokat *sima sokaságoknak* is nevezzük.

* **10.32. Példa.** Bármely nyílt részhalmaza \mathbb{R}^m -nek az identikus leképezés által megadott egyetlen térképből álló atlaszsal egy sima sokaság. Ha mást nem mondunk, \mathbb{R}^m nyílt részhalmazain mindig erre a sokaság-struktúrára gondolunk.

* **10.33. Példa.** Az identikus leképezés által megadott térkép valamint a $\varphi(x) = \sin(x)$ leképezés által megadott térkép C^∞ -összeférhetőek $]-\pi/2, \pi/2[$ -n.

* **10.34. Példa.** Az identikus leképezés \mathbb{R} -en, az $\varphi(x) = x$, ha $x \leq 0$ és $\varphi(x) = 2x$, ha $x > 0$, valamint a $\psi(x) = x^3$, ha $x \in \mathbb{R}$ leképezések által megadott térképek páronként nem összeférhetőek, bár külön-külön mindegyik egy-egy sima sokaság struktúrárt definiál \mathbb{R} -en.

* **10.35. Feladat [7].** Tekintsük az $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ halmazba képező

$$(r, \varphi) \mapsto (r \cos \varphi, r \sin \varphi), \quad 0 < r < \infty, \quad -\pi < \varphi < \pi$$

és

$$(r, \varphi) \mapsto (r \cos \varphi, r \sin \varphi), \quad 0 < r < \infty, \quad 0 < \varphi < 2\pi$$

függvények (polár koordináták) inverzeit. Mutassuk meg, hogy az eredeti atlaszsal C^∞ -összeférhető atlaszt alkotnak.

* **10.36. Feladat [7].** Milyen térképeket kapunk \mathbb{R}^3 -ban a henger, illetve gömbi koordinátákból?

* **10.37. Példa.** Legyen \mathbb{R}^{m+1} szokásos ortonormált bázisa e_0, e_1, \dots, e_m . Tekintsük az $\mathbb{S}_m = \{x \in \mathbb{R}^{m+1} : \|x\| = 1\}$ gömbfelületet. Az e_1, \dots, e_m által kifeszített alteret \mathbb{R}^m -mel azonosítva, ha $x \in \mathbb{S}_m$ koordinátái $\xi^0, \xi^1, \dots, \xi^m$, legyen $y = \varphi_1(x) = (x - \xi^0 e_0) / (1 - \xi^0)$, ha $x \neq e_0$ (sztereografikus projekció e_0 -ból). A leképezés inverze

$$x = \frac{\|y\|^2 - 1}{\|y\|^2 + 1} e_0 + \frac{2y}{\|y\|^2 + 1}.$$

Hasonlóan, legyen $\varphi_2(x) = (x + \xi^0 e_0)/(1 + \xi^0)$, ha $x \neq -e_0$ (sztereografikus projekció $-e_0$ -ból). Ekkor $(\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1})(y) = y/\|y\|^2$ egy C^∞ -leképezés, és az inverze is, így φ_1, φ_2 egy sima sokaság struktúráját definiál \mathbb{S}_m -en.

* **10.38. Példák.** Henger, tórusz, Möbius-szalag, Klein-féle kancsó, projektív sík, gömb fogantyúkkal és Möbius-szalagokkal, stb.

* **10.39. Feladat [5].** Mutassuk meg, hogy \mathbb{S}_m nem homeomorf \mathbb{R}^n egy nyílt részhalmazával semmilyen n -re sem.

* **10.40. Feladat [10].** Mutassuk meg, hogy \mathbb{R}^{m+1} és

$$\{x = (x_0, x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^{m+1} : x_0 \geq 0\}$$

nem homeomorfak.

* **10.41. Feladat [8].** Adjunk meg két térképből álló atlaszt a

$$(\varphi, z) \mapsto (\cos(2\pi\varphi), \sin(2\pi\varphi), z),$$

$0 \leq \varphi \leq 1, 0 < z < 1$ leképezés értékkészletén, egy hengerfelületen.

* **10.42. Feladat [9].** Adjunk meg két térképből álló atlaszt a

$$(\varphi, r) \mapsto \left((1 + r \cos(\pi\varphi)) \cos(2\pi\varphi), (1 + r \cos(\pi\varphi)) \sin(2\pi\varphi), r \sin(\pi\varphi) \right),$$

$0 \leq \varphi \leq 1, -1/2 \leq r \leq 1/2$ leképezés értékkészletén, egy Möbius-szalagon.

* **10.43. Feladat [10].** Adjunk meg három térképből álló atlaszt a

$$(\varphi, \vartheta) \mapsto \left((2 + \cos(2\pi\vartheta)) \cos(2\pi\varphi), (2 + \cos(2\pi\vartheta)) \sin(2\pi\varphi), \sin(2\pi\vartheta) \right),$$

$0 \leq \varphi \leq 1, 0 < \vartheta < 1$ leképezés értékkészletén, egy tóruszon.

* **10.44. Feladat [11].** Adjunk meg három térképből álló atlaszt a Klein-féle kancsón.

* **10.45. Feladat [11].** Adjunk meg atlaszt a projektív síkon.

* **10.46. Sima leképezések.** Legyenek M és N sima sokaságok. Egy $f : M \rightarrow N$ leképezést C^r -leképezésnek ($0 \leq r \leq \infty$) nevezünk, ha az M atlaszának bármely φ és az N atlaszának bármely ψ térképére $\psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ egy C^r -leképezés. Az ilyen leképezések osztályát $C^r(M; N)$ jelöli. A C^∞ -leképezéseket *sima leképezéseknek* is nevezzük. Ha más nem mondunk, C^r -függvény, illetve *sima függvény* alatt $C^r(M; \mathbb{R})$ illetve $C^\infty(M; \mathbb{R})$ elemeit értjük. Az M és N sima sokaságok *diffeomorfak*, ha létezik olyan $f : M \rightarrow N$ kölcsönösen egyértelmű leképezése M -nek N -re, amelyre f és f^{-1} is sima; egy ilyen f -et *diffeomorfizmusnak* nevezünk.

* **10.47. Tétel.** Ha K, M, N sima sokaságok és $f : K \rightarrow M$ valamint $g : M \rightarrow N$ is C^r -leképezések, akkor $g \circ f : K \rightarrow N$ is C^r -leképezés.

* **Bizonyítás.** Bármely φ, ψ térképekre K -ban illetve N -ben, ha x a $\psi \circ g \circ f \circ \varphi^{-1}$ leképezés értelmezési tartományának tetszőleges pontja és χ az M atlaszának egy olyan térképe, amelynek értelmezési tartománya tartalmazza $y = f(x)$ -et, a $\psi \circ g \circ f \circ \varphi^{-1}$ leképezés a $\varphi(x)$ pont valamely környezetében megegyezik a $\psi \circ g \circ \chi^{-1} \circ \chi \circ f \circ \varphi^{-1}$ leképezéssel, így C^r -leképezés. Mivel ez $\psi \circ g \circ f \circ \varphi^{-1}$ értelmezési tartományának bármely pontjára teljesül, $\psi \circ g \circ f \circ \varphi^{-1}$ egy C^r -leképezés.

* **10.48. Példák.** (1) Az $f : x \mapsto 2x/(1 - \|x\|^2)$ leképezés sima diffeomorfizmusa \mathbb{R}^m nyílt $K_1(0)$ egységgömbjének \mathbb{R}^m -re, az inverze $y \mapsto y/(1 + \sqrt{1 + \|y\|^2})$.

(2) A $g : x \mapsto x/\|x\|^2$ leképezés sima diffeomorfizmusa $K_1(0) \setminus \{0\}$ -nak $K_1(0)$ külsejére, inverze saját maga.

(3) A $g \circ f$ leképezés sima diffeomorfizmusa $K_1(0)$ külsejének $\mathbb{R}^m \setminus \{0\}$ -ra.

* **10.49. Feladat [5].** Mutassuk meg, hogy a 10.34 példában megadott sokaságok diffeomorfak.

* **10.50. Görbék érintkezése.** Legyen M egy sima sokaság. A $\gamma_1, \gamma_2 : \mathbb{R} \rightarrow M$ C^1 -görbékre azt mondjuk, hogy a $t_0 \in \mathbb{R}$ pontban *érintkeznek*, ha $\gamma_1(t_0) = \gamma_2(t_0)$ és van olyan φ térkép, amelynek értelmezési tartományában benne van $x = \gamma_1(t_0) = \gamma_2(t_0)$ és

$$\frac{d(\varphi \circ \gamma_1)}{dt}(t_0) = \frac{d(\varphi \circ \gamma_2)}{dt}(t_0).$$

Legyen N egy másik sima sokaság, és $f : M \rightarrow N$ egy C^1 -leképezés. Ekkor az $f \circ \gamma_1$ és $f \circ \gamma_2$ görbék C^1 -görbék és érintkeznek t_0 -ban: az $y = f(x)$ jelöléssel $f \circ \gamma_1(t_0) = y = f \circ \gamma_2(t_0)$ és az y -t tartalmazó értelmezési tartományú bármely ψ térképre

$$\frac{d(\psi \circ f \circ \gamma_i)}{dt}(t_0) = \frac{d(\psi \circ f \circ \varphi^{-1} \circ \varphi \circ \gamma_i)}{dt}(t_0) = (\psi \circ f \circ \varphi^{-1})'(\varphi(x)) \frac{d(\varphi \circ \gamma_i)}{dt}(t_0),$$

ha $i = 1, 2$, így megegyeznek.

Speciálisan, $N = M$ -et, f -nek pedig az identikus leképezést választva, kapjuk, hogy a görbék érintkezése t_0 -ban nem függ a térkép választásától: ha van olyan térkép, amelyre érintkeznek, akkor minden x -et tartalmazó térképre érintkeznek, és így az is teljesül, hogy ha t_0 -ban γ_1 érintkezik γ_2 -vel, továbbá γ_2 érintkezik γ_3 -mal, akkor γ_1 is érintkezik γ_3 -mal.

* **10.51. Érintővektorok.** Egy M sima sokaság egy *érintővektora* az $x \in M$ pontban azon C^1 -beli $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow M$ görbék osztálya, amelyekre $\gamma(0) = x$ és érintkeznek a 0-ban. Az M sokaság x -beli érintővektorainak halmazát $T_x M$ -mel jelöljük, azt az érintővektort pedig, amelyhez egy adott γ tartozik, $\gamma'(0)$ -val. A

$$\theta_\varphi : \gamma'(0) \mapsto \frac{d(\varphi \circ \gamma)}{dt}(0)$$

leképezés kölcsönösen egyértelműen képezi le $T_x M$ -et \mathbb{R}^n -re. Az inverz leképezés a $h \in \mathbb{R}^n$ vektorhoz a

$$\gamma(t) = \varphi^{-1}(\varphi(x) + th)$$

sima görbével érintkező görbék osztályát rendeli, mert

$$\frac{d(\varphi \circ \gamma)}{dt}(0) = \frac{d(\varphi(x) + th)}{dt}(0) = h.$$

A

$$\theta_\varphi^{-1}(h_1) + \theta_\varphi^{-1}(h_2) = \theta_\varphi^{-1}(h_1 + h_2), \quad \alpha \theta_\varphi^{-1}(h) = \theta_\varphi^{-1}(\alpha h)$$

definícióval elláthatjuk $T_x M$ -et egy vektortér-struktúrával. Ha ψ egy másik térkép, amelynek értelmezési tartományában szintén benne van x , akkor

$$\gamma(t) = \varphi^{-1}(\varphi(x) + th)$$

jelöléssel

$$\theta_\psi \circ \theta_\varphi^{-1} : h \mapsto \frac{d(\psi \circ \gamma)}{dt}(0) = \frac{d(\psi \circ \varphi^{-1} \circ \varphi \circ \gamma)}{dt}(0) = (\psi \circ \varphi^{-1})'(\varphi(x))h.$$

Ez azt jelenti, hogy $\theta_\psi \circ \theta_\varphi^{-1}$ bijektív lineáris leképezés, így a vektortér-struktúra nem függ a térkép választásától.

* **10.52. Az érintőleképezés.** Legyenek M és N sima sokaságok, $f : M \rightarrow N$ egy sima leképezés, $x \in M$ és $y = f(x) \in N$. Egy $\gamma'(0) \in T_x M$ érintővektorhoz rendeljük hozzá a $(f \circ \gamma)'(0)$ érintővektort; mint a 10.44 pontban megmutattuk, ez nem függ az érintővektor reprezentánsának választásától. Jelölje ezt a $T_x M \rightarrow T_y N$ leképezést $T_x f$. Ez az f érintőleképezése az x pontban. Megmutatjuk, hogy lineáris. Valóban, mint a 10.44 pontban már kiszámoltuk, ha φ az x -ben, a ψ pedig az y -ban értelmezett térkép, akkor $F = \psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ jelöléssel

$$\frac{d(\psi \circ f \circ \gamma)}{dt}(0) = F'(\varphi(x)) \frac{d(\varphi \circ \gamma)}{dt}(0),$$

így mivel a θ_ψ és θ_φ leképezések lineáris bijekciók, a $T_x f = \theta_\psi^{-1} \circ F'(\varphi(x)) \circ \theta_\varphi$ leképezés is lineáris, sőt, rangja megegyezik $F'(\varphi(x))$ rangjával. Így definiálhatjuk a $T_x f$ érintőleképezés rangját. Ezt a rangot $\text{rg}_x f$ -fel is fogjuk jelölni.

* **10.53. Tétel.** Ha K, M, N sima sokaságok, $f : K \rightarrow M$ és $g : M \rightarrow N$ sima leképezések, $x \in K$ és $y = f(x)$, akkor $T_x(g \circ f) = T_y g \circ T_x f$.

* **10.54. Az érintővektorok mint funkcionálok.** Legyen M egy sima sokaság és $X = \gamma'(0) \in T_x M$. Minden M -en értelmezett sima f függvényhez az

$$f \mapsto \frac{d(f \circ \gamma)}{dt}(0)$$

leképezés egy számot rendel, amely csak az $X = \gamma'(0)$ érintővektortól függ. Ezt a számot Xf -fel is jelöljük. Nyilván ha $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ és f, g sima függvények, akkor $X(\alpha f + \beta g) = \alpha Xf + \beta Xg$, azaz a funkcionál lineáris, és a szorzás differenciálási szabálya alapján $X(fg) = f(x)Xg + g(x)Xf$. Az érintővektorokat ezen tulajdonságok segítségével is be lehet vezetni. Meg lehet mutatni, hogy két érintővektor pontosan akkor egyenlő, ha minden sima függvényre ugyanúgy hatnak.

Legyen most $\varphi = (\varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^m)$ egy x -ben értelmezett térkép, és

$$X^1, X^2, \dots, X^m$$

az X érintővektor koordinátái a $\theta_\varphi^{-1}(e_i)$, $i = 1, 2, \dots, m$ bázisban, ahol e_1, e_2, \dots, e_m az \mathbb{R}^m szokásos bázisa. (Ez a bázis a $T_x M$ érintőtérnek a φ térképhez tartozó természetes bázisa.) Ekkor

$$\begin{aligned} Xf &= \frac{d(f \circ \gamma)}{dt}(0) = \frac{d(f \circ \varphi^{-1} \circ \varphi \circ \gamma)}{dt}(0) = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial \varphi^i}(\varphi(x)) \frac{d(\varphi^i \circ \gamma)}{dt}(0) \\ &= \sum_{i=1}^m X^i \frac{\partial f}{\partial \varphi^i}. \end{aligned}$$

Ennek megfelelően X hagyományos felírása ebben a koordinátarendszerben

$$X = \sum_{i=1}^m X^i \frac{\partial}{\partial \varphi^i}.$$

*** 10.55. Az érintőleképezés lokális koordinátákban.** Legyenek M és N sima sokaságok, $f : M \rightarrow N$ egy sima leképezés, $x \in M$ és $y = f(x)$. Ha $\varphi = (\varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^m)$ az x -ben $\psi = (\psi^1, \psi^2, \dots, \psi^n)$ pedig az y -ban értelmezett térkép, akkor az

$$X = \sum_{i=1}^m X^i \frac{\partial}{\partial \varphi^i}$$

érintővektorra

$$Y = (T_x f)(X) = \sum_{j=1}^n Y^j \frac{\partial}{\partial \psi^j},$$

ahol

$$Y^j = \sum_{i=1}^m \frac{\partial \psi^j}{\partial \varphi^i}(\varphi(x)) X^i,$$

mivel az $F = \psi \circ f \circ \varphi^{-1}$ jelöléssel az $F : (\varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^m) \rightarrow (\psi^1, \psi^2, \dots, \psi^n)$ leképezés deriváltjának mátrixa

$$\frac{\partial \psi^j}{\partial \varphi^i}(\varphi(x)).$$

Speciálisan, ha $N = M$ és f az identikus leképezés, azt kapjuk, hogy térképcserénél X koordinátái a fenti módon transzformálódnak.

* **10.56. Feladat** [8]. Az \mathbb{S}_2 gömbfelületen gömbi koordinátákban legyen egy vektormező

$$\cos \vartheta \frac{\partial}{\partial \varphi}, \quad \text{ha} \quad \frac{-\pi}{2} < \vartheta < \frac{\pi}{2},$$

és nulla egyébként. Számoljuk át az $(1, 0, 0)$ pontból való vetítés által adott koordinátákba.

* **10.57. Érintőnyaláb.** Egy M sima sokaság érintőtereinek (diszjunkt) unióját a sokaság *érintőnyalábjának* nevezzük. Ez is sima sokasággá tehető egy természetes módon, de ezzel nem foglalkozunk.

* **10.58. Példa.** Egy csavarvonal egy darabja.

* **10.59. Immerzió, szubimmerzió, szubimmerzió és beágyazás.** Legyenek M és N sima sokaságok, $f : M \rightarrow N$ egy sima leképezés. Ha $T_x f$ kölcsönösen egyértelmű minden $x \in M$ -re, akkor azt mondjuk, hogy f *immerzió*. Ha $T_x f$ a $T_{f(x)} N$ -re képez minden $x \in M$ -re, akkor azt mondjuk, hogy f *szubimmerzió*. Ha $T_x f$ rangja ugyanannyi $x \in M$ -re, akkor azt mondjuk, hogy f *szubimmerzió*. Ha f immerzió, kölcsönösen egyértelmű és homeomorfizmus M és $f(M)$ között, akkor azt mondjuk, hogy *beágyazás*.

* **10.60. Példák.** $x \mapsto (x, 0)$, $(x, y) \mapsto x$, $(x, y) \mapsto (x, 0, 0)$, $]0, 2\pi[\ni t \mapsto (\sin t, \sin 2t)$, $x \mapsto x^3$, $x \mapsto (\cos x, \sin x)$.

* **10.61. Részsokaság.** Egy M egy sokaság egy K részhalmaza az M egy k -dimenziós *részsokasága*, ha minden $x \in K$ -hoz van olyan $\varphi = (\varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^m)$ térkép az M atlaszához tartozó telített atlaszban, amelynek U értelmezési tartományában benne van x és amelyre

$$\varphi(U \cap K) = \{(\varphi^1, \varphi^2, \dots, \varphi^m) \in \varphi(U) : \varphi^{k+1} = \dots = \varphi^m = 0\}.$$

Egy nyílt részhalmaz nyilván mindig részsokaság.

* **10.62. Tétel.** *Egy részsokaságon egyetlen olyan sima telített atlasz létezik, amelyre az identikus leképezése K -nak M -be beágyazás. Megfordítva, ha $f : K \rightarrow M$ egy beágyazás, akkor $f(K)$ egy részsokaság, amely diffeomorf K -val.*

* **10.63. Whitney tétele.** *Minden m -dimenziós sima sokaság beágyazható az \mathbb{R}^{2m+1} sokaságba sima részsokaságként.*

* **10.64. Tétel.** *Legyen $f : M \rightarrow N$ egy szubimmerzió, $x \in M$ és $y = f(x)$. Ekkor $f^{-1}(y)$ egy zárt részsokasága M -nek és $T_x f^{-1}(y)$ a $T_x f$ magja.*

* **10.65. Példa.** Az \mathbb{S}_m gömb mint az $x \mapsto \|x\|$, $x \in \mathbb{R}^{m+1} \setminus \{0\}$ leképezésnél az 1 ösképe.

* **10.66. Vektormező.** Egy m -dimenziós M sima sokaságon értelmezett $X : x \mapsto X(x) \in T_x M$ leképezést *vektormezőnek* nevezzük. Nyilván ha X, Y vektormezők,

$\alpha \in \mathbb{R}$ és f függvény M -en, akkor $X + Y$, αX és fX is vektormezők. Az X vektormezőt *sima vektormező*nek nevezzük, ha minden f sima függvényre $x \mapsto X(x)f$ sima függvény; ezt a függvényt Xf -fel jelöljük. Megmutatható, hogy X pontosan akkor sima vektormező, ha bármely φ térképre az

$$X(x) = \sum_{i=1}^m X^i(x) \frac{\partial}{\partial \varphi^i}$$

előállításában szereplő X^i koordinátafüggvények simák.

* **10.67. Sima vektormezők Lie-zárójele.** Legyen M egy m -dimenziós sima sokaság, X és Y pedig sima vektormezők M -en. Megmutatható, hogy létezik (és csak egy) $[X, Y]$ vektormező amelyre bármely f sima függvényre

$$[X, Y]f = X(Yf) - Y(Xf).$$

Mivel Xf és Yf , és így $X(Yf)$ valamint $Y(Xf)$ is sima függvények, $[X, Y]$ sima vektormező.

Legyen a φ térkép az x -ben értelmezve. Ekkor

$$X(x)f = \sum_{j=1}^m X^j(x) \frac{\partial f}{\partial \varphi^j},$$

így

$$\begin{aligned} Y(Xf) &= \sum_{i=1}^m Y^i \frac{\partial}{\partial \varphi^i} \sum_{j=1}^m X^j \frac{\partial f}{\partial \varphi^j} \\ &= \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m Y^i \frac{\partial X^j}{\partial \varphi^i} \frac{\partial f}{\partial \varphi^j} + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m Y^i X^j \frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^i \partial \varphi^j}, \end{aligned}$$

tehát

$$[X, Y]f = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^m \left(X^i \frac{\partial Y^j}{\partial \varphi^i} - Y^i \frac{\partial X^j}{\partial \varphi^i} \right) \frac{\partial f}{\partial \varphi^j},$$

amiből

$$[X, Y] = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^m \left(X^i \frac{\partial Y^j}{\partial \varphi^i} - Y^i \frac{\partial X^j}{\partial \varphi^i} \right) \frac{\partial}{\partial \varphi^j}.$$

* **10.68. Feladat [6].** Mutassuk meg, ha X , Y sima vektormezők és f sima függvény, akkor

$$[X, fY] = f[X, Y] + (Xf)Y.$$

* **10.69. Feladat [8].** Az \mathbb{S}_2 gömbfelületen gömbi koordinátákban legyen egy vektormező

$$\cos \vartheta \frac{\partial}{\partial \varphi}, \quad \text{ha } -\frac{\pi}{2} < \vartheta < \frac{\pi}{2},$$

egy másik pedig

$$\cos \vartheta \frac{\partial}{\partial \vartheta}, \quad \text{ha } -\frac{\pi}{2} < \vartheta < \frac{\pi}{2}.$$

Számoljuk ki a Lie-zárójelüket.

* **10.70. Feladat [11].** Az előző feladatban szereplő vektormezőket számoljuk át az $(1, 0, 0)$ pontból való vetítés által adott koordinátákba, majd számoljuk ki a Lie-zárójelüket. Ellenőrizzük eredményünket a Lie-zárójel transzformálásával.

* **10.71. Lie-algebra.** Egy V vektorteret \mathbb{K} felett egy $(x, y) \mapsto [x, y]$ kétváltozós művelettel *Lie-algebrának* nevezünk, ha

- (1) $[\alpha x + \beta y, z] = \alpha[x, z] + \beta[y, z]$ minden $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$ és $x, y, z \in V$ -re;
- (2) $[x, y] = -[y, x]$ minden $x, y \in V$ -re;
- (3) $[[x, y], z] + [[z, x], y] + [[y, z], x] = 0$ minden $x, y, z \in V$ -re (*Jacobi-azonosság*).

* **10.72. Tétel.** Egy M sima sokaság sima vektormezői a vektormezők Lie-zárójelével *Lie-algebrát alkotnak* \mathbb{R} felett.

Bizonyítás. Kiszámoljuk.

* **10.73. Iránymező, teljes integrál.** Legyen M egy m -dimenziós sima sokaság és $0 \leq k \leq m$. Egy $S : x \mapsto S_x$ hozzárendelést, ahol S_x a $T_x M$ egy k -dimenziós altere, *k-iránymezőnek* nevezünk. (A k -dimenziós *disztribúció* elnevezés is szokásos; mi ez utóbbit nem használjuk, mert a disztribúció szó másik értelme sokkal elterjedtebb.) Egy *k-iránymezőre* azt mondjuk, hogy *sima iránymező*, ha bármely $x \in M$ -hez létezik olyan X_1, X_2, \dots, X_k sima vektormezők, hogy valamely U környezetére x -nek $X_1(y), X_2(y), \dots, X_k(y)$ bázisa $T_y M$ -nek, ha $y \in U$.

Egy S sima k -iránymezőre legyen $\mathcal{E}(S)$ az összes olyan sima vektormezők halmaza, amelyekre $X(x) \in S(x)$, ha $x \in M$; ez az S -hez tartozó *differenciárendszer*. Könnyen igazolható, hogy $\mathcal{E}(S)$ -ből nem vezet ki a sima függvényekkel való szorzás és az összeadás, sőt, még a lokálisan véges vektormező-rendszerek összeadása sem. Egy sima k -iránymezőt *involutív*nak nevezünk, ha $\mathcal{E}(S)$ -re $X, Y \in \mathcal{E}(S)$ esetén $[X, Y] \in \mathcal{E}(S)$.

Ha egy k -dimenziós K sima sokaság egy $f : K \rightarrow M$ immerziójára $(T_x f)(T_x K) = S_{f(x)}$ minden $x \in K$ -ra, akkor azt mondjuk, hogy a (K, f) pár az S egy *teljes integrálja*; az $f(K)$ halmazt a *teljes integrál képének* nevezzük. Ha az M sokaság minden pontja rajta van valamely teljes integrál képen, akkor azt mondjuk, hogy S *teljesen integrálható*.

* **10.74. Frobenius tétele.** Az előző definíció jelöléseivel, egy S sima iránymező pontosan akkor teljesen integrálható, ha involutív.

* **10.75. Feladat [7].** Mutassuk meg, hogy sima 1-iránymező mindig teljesen integrálható.

* **10.76. Feladat [9].** Legyen az \mathbb{R}^3 sokaságon a szokásos koordinátákban

$$X = X^1 \frac{\partial}{\partial \varphi^1} + X^2 \frac{\partial}{\partial \varphi^2} + X^3 \frac{\partial}{\partial \varphi^3}$$

egy sima vektormező, amely sehol sem tűnik el, és $S(x) = X(x)^\perp$ a szokásos belső szorzatban. Mutassuk meg, hogy S pontosan akkor involutív, ha $X \perp \text{rot } X$.

- 286/14 :
 - <
 - * **A Riemann-integrál intervallum additivitása [7].** Tegyük
 - >
 - * **Feladat: A Riemann-integrál intervallum additivitása [7].** Tegyük

- 286/16 :
 - <
 - lyik oldalának kettéosztásával kaptuk. Egy $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ korlátos függvényre
 - >
 - lyik oldalának kettéosztásával kaptuk. Mutassuk meg, hogy egy $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ korlátos függvényre

- 288/1 :
 - <
 - * **Feladat: Darboux tétele.** A többváltozós Riemann-integrál
 - >
 - * **Feladat: Darboux tétele [10].** A többváltozós Riemann-integrál

- 291/6 :
 - <
 - a másik a végpontja. Ívszerűen összefüggő tér mindig összefüggő is. Egy tartományt *egyszeresen összefüggő tartománynak* nevezünk, ha benne minden
 - >
 - a másik a végpontja. Ívszerűen összefüggő tér mindig összefüggő is. Egy halmazt *egyszeresen összefüggő halmaznak* nevezünk, ha benne minden

- 291/14 :
 - <
 - egy $D \subset X$ tartomány *csillagszerű*, azaz van benne olyan c pont, úgynevezett *csillagpont*, hogy minden $z \in D$ -re, a c és z pontokat összekötő szakasz D -ben van, akkor D egyszeresen összefüggő. Speciálisan, minden konvex tartomány
 - >
 - egy $D \subset X$ halmaz *csillagszerű*, azaz van benne olyan c pont, úgynevezett *csillagpont*, hogy minden $z \in D$ -re, a c és z pontokat összekötő szakasz D -ben van, akkor D egyszeresen összefüggő. Speciálisan, minden konvex halmaz

- 323/9 :
 - <
 - $$f(\gamma(\psi(t))) p_{a_1}(\gamma \circ \psi)(t) \cdots \partial_{m-1}(\gamma \circ \psi)(t)$$
 - >
 - $$f(\gamma(\psi(t))) \partial_1(\gamma \circ \psi)(t) \cdots \partial_{m-1}(\gamma \circ \psi)(t)$$

- 329/−12 :
<
Emlékeztetünk a szokásos jelölésre: \mathbb{K} vagy \mathbb{R} , vagy \mathbb{C} .
>
Az $U_1(0) \subset \mathbb{C}$ nyílt körlapra a \mathbb{D} jelölést is fogjuk használni.

- 340/−16 :
<
nesen vannak, így törtlineáris leképezés „körtartó”.
>
nesen vannak, így törtlineáris leképezés „körtartó”.

13.34.5 Feladat [7]. Bizonyítsuk be, hogy körre vagy egyenesre szimmetrikus pontpár képe törtlineáris leképezésnél szimmetrikus a kör vagy egyenes képére.

tett komplex síkot *Riemann-féle számgömbnek* nevezzük. A Riemann-féle
tett komplex síkot *Riemann-féle számgömbnek* nevezzük. Az f függvényt vizsgálatát
a ∞ pontban a $z \mapsto f(1/z)$ függvény origóban való vizsgálatára vezethetjük vissza.
A Riemann-féle

- 340/−11 :
<
tett komplex síkot *Riemann-féle számgömbnek* nevezzük. A Riemann-féle
>
tett komplex síkot

Riemann-féle számgömbnek nevezzük. Az f függvényt vizsgálatát a ∞ pontban
a $z \mapsto f(1/z)$ függvény origóban való vizsgálatára vezethetjük vissza. A Riemann-
féle

- 340/−8 :
<
is fontos szerepet játszanak. Mivel ezen kérdések elegáns tárgyalása a komplex dif-
ferenciálható sokaságok segítségével oldható meg, itt nem foglalkozunk velük.
>
is fontos szerepet játszanak. Ezen kérdések elegáns tárgyalása a komplex differenci-
álható sokaságok segítségével oldható meg. Például a komplex számgömbön a $z \mapsto z$
és $z \mapsto 1/z$ térképekből álló atlaszt vezetjük be. Itt nem foglalkozunk részletesen
ezekkel a kérdésekkel.

- 344/2 :
<
programozásban egy kulcs-cím leképezés, alkalmazása keresések gyorsítására.
>
programozásban egy kulcs-cím leképezés, hash-transzformáció alkalmazása keresések
gyorsítására.

- 344/−9 :
 - <
 - * **13.48. Definíció.** Néha a generátorfüggvényt használjuk fel egy számsorozat definiálására. például a b_n , $n = 0, 1, \dots$ Bernoulli-számok sorozatát azzal definiáltuk, hogy exponenciális generátorfüggvénye a $z \mapsto z/(e^z - 1)$ függvény.
 - >
 - * **13.48. Feladat [9].** Néha a generátorfüggvényt használjuk fel egy számsorozat definiálására. Mutassuk meg, hogy például a b_n , $n = 0, 1, \dots$ Bernoulli-számok sorozatát azzal is definiálhatnánk, hogy exponenciális generátorfüggvénye a $z \mapsto z/(e^z - 1)$ függvény.

- 344/−4 :
 - <
 - * **13.50. Feladat [7].** Mutassuk meg, hogy $z \mapsto z/2 + z/(e^z - 1)$ páratlan
 - >
 - * **13.50. Feladat [7].** Mutassuk meg, hogy $z \mapsto z/2 + z/(e^z - 1)$ páros

- 344/−2 :
 - <
 - * **13.51. Feladat [8].** Mutassuk meg, hogy a b_k Bernoulli-számokra, ha $n > 1$, akkor $\sum_{k=0}^n b_k = b_n$.
 - >
 - * **13.51. Feladat [6].** Mutassuk meg, hogy a ζ függvény sora egyenletesen konvergens minden $\Re(z) \geq \alpha$, $\alpha > 1$ félsíkon.

- 347/12 :
 - <
 - $\text{ind}(c, \gamma)$ egész. Ha $n = \text{ind}(c, \gamma)$, akkor γ egy $\mathbb{C} \setminus \{c\}$ -ben a $t \mapsto e^{2\pi int}$,
 - >
 - $\text{ind}(c, \gamma)$ egész. Ha $n = \text{ind}(c, \gamma)$, akkor γ egy $\mathbb{C} \setminus \{c\}$ -ben a $t \mapsto c + e^{2\pi int}$,

- 347/15 :
 - <
 - konvex halmazban, akkor ez a konstans nulla $\mathbb{C} \setminus B$ -n.
 - >
 - egyszeresen összefüggő halmazban, akkor ez a konstans nulla $\mathbb{C} \setminus B$ -n.

- 347/−2 :
 - <
 - ha $\gamma(I)$ benne van valamely B konvex halmazban, és $c \in \mathbb{C} \setminus B$, akkor γ össze-
 - >
 - ha $\gamma(I)$ benne van valamely B egyszeresen összefüggő halmazban, és $c \in \mathbb{C} \setminus B$, akkor γ össze-

- 349/7 :

<

amiből következik az állítás.

>

amiből következik az állítás.

14.12.5 Morera tétele. Legyen $D \subset \mathbb{C}$ nyílt halmaz, f folytonos komplex függvény D -n. Ha minden γ háromszög-pályára, amelynek értékkészlete az általa határolt háromszög-lappal együtt D -ben van, $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$, akkor f holomorf D -n.

Bizonyítás. Az f -nek lokálisan van primitív függvénye, amely analitikus, így f is analitikus.

14.12.7 Weierstrass példája. Legyen $0 < b < 1$ és a páratlan egész úgy, hogy $ab > 1 + 3\pi/2$ teljesüljön. A $\sum_{k=0}^{\infty} b^k z^{a^k}$ hatványsor egyenletesen abszolút konvergens a zárt egységkörlapon, analitikus a belsejében, de nincs olyan bővebb tartomány, amire analitikusan kiterjeszhető.

Bizonyítás. Tekintsük a $t \mapsto e^{i\pi t}$ függvény és a hatványsor összetételével keletkező függvényt. Elég megmutatni, hogy ennek az $f(t) = \sum_{k=0}^{\infty} b^k \cos a^k \pi t$ valós része sehol sem differenciálható. Legyen $f_n(t) = \sum_{k=0}^{n-1} b^k \cos a^k \pi t$. Rögzítsünk egy t -t. Bármenny n -re és $h > 0$ -ra a differenciahányadosnak megfelelő összeget bontsuk két részre: a 0-tól $n-1$ -ig terjedő rész legyen s_n , a többi r_n . A két koszinusz különbségét a középérték-tétellel becslve, azt kapjuk, hogy $|s_n| < \pi a^n b^n / (ab - 1)$. Legyen $a^n t = \alpha_n + \beta_n$, ahol α_n egész és $-1/2 \leq \beta_n < 1/2$. Legyen $h_n = (1 - \beta_n)/a^n$. Ha $k \geq n$, akkor $a^k \pi(t + h_n) = a^{k-n} \pi(1 + \alpha_n)$, így mivel a páratlan, $\cos a^k \pi(t + h_n) = (-1)^{1+\alpha_n}$. Másrészt

$$\begin{aligned} -\cos a^k \pi t &= \cos a^{k-n} \pi(\alpha_n + \beta_n) = -\cos a^{k-n} \pi \alpha_n \cdot \cos a^{k-n} \pi \beta_n \\ &= (-1)^{1+\alpha_n} \cos a^{k-n} \pi \beta_n. \end{aligned}$$

A $h = h_n$ helyettesítéssel r_n -re azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} |r_n| &= \left| \sum_{k=n}^{\infty} b^k \frac{(-1)^{1+\alpha_n} + (-1)^{1+\alpha_n} \cos a^{k-n} \pi \beta_n}{h_n} \right| \\ &= \left| \frac{(-1)^{1+\alpha_n}}{h_n} \right| \sum_{k=n}^{\infty} b^k (1 + \cos a^{k-n} \pi \beta_n) \geq \frac{b^n}{h_n} \geq \frac{2a^n b^n}{3}, \end{aligned}$$

mivel $\cos \pi \beta_n \geq 0$. A két becslést kombinálva,

$$\left| \frac{f(t + h_n) - f(t)}{h_n} \right| \geq |r_n| - |s_n| > \frac{2a^n b^n}{3} - \frac{\pi a^n b^n}{ab - 1} = a^n b^n \left(\frac{2}{3} - \frac{\pi}{ab - 1} \right).$$

Mivel a zárójelben álló kifejezés pozitív konstans, a jobb oldali differenciahányadosoknak vagy a limesz szuperiorja, vagy a limesz inferiorja nem véges.

- 351/13 :

<

* **14.20. Schwarz-lemma.** Legyen f a nyílt komplex egységkör önmagába való analitikus leképezése, amelyre $f(0) = 0$. Ekkor $|f(z)| \leq |z|$, és ha valamely $z \neq 0$ pontban egyenlőség teljesül, akkor $f(z) = cz$.

Bizonyítás. f felírható $f(z) = zg(z)$ alakban, és g is analitikus. Ha $0 < r < 1$, akkor $|z| = r$ esetén $|g(z)| \leq 1/r$. A maximumelv miatt $|z| \leq r$ esetén is $|g(z)| \leq 1/r$. Ebből $r \uparrow 1$ határátmenettel $|g| \leq 1$ az egész körön, amiből kapjuk az egyenlőtlenséget. Ha valahol egyenlőség teljesül, akkor ott $|g|$ -nek lokális maximuma van, így konstans.

>

* **14.20. Schwarz-lemma.** Legyen $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{D}$ holomorf leképezés, amelyre $f(0) = 0$. Ekkor $|f(z)| \leq |z|$, $|f'(0)| \leq 1$, és ha valamely $z \neq 0$ pontban egyenlőség teljesül vagy $|f'(0)| = 1$, akkor $f(z) = cz$.

Bizonyítás. Az f felírható $f(z) = zg(z)$ alakban, és g is analitikus. Ha $0 < r < 1$, akkor $|z| = r$ esetén $|g(z)| \leq 1/r$. A maximumelv miatt $|z| \leq r$ esetén is $|g(z)| \leq 1/r$. Ebből $r \uparrow 1$ határátmenettel $|g| \leq 1$ az egész körlapon, amiből kapjuk az egyenlőtlenséget. Ha valahol egyenlőség teljesül vagy $|f'(0)| = |g(0)| = 1$, akkor ott $|g|$ -nek lokális maximuma van, így konstans.

- 352/16 :

<

tő le konform módon egy korlátos tartományra. A következő tétel mutatja, hogy az egyszeresen összefüggő tartományok csak két ekvivalenciaosztályt alkotnak. Nem egyszeresen összefüggő tartományok körében a helyzet bonyolultabb.

Riemann tétele. Ha $D, E \subset \mathbb{C}$ a \mathbb{C} -től különböző egyszeresen összefüggő tartományok, akkor konform ekvivalensek.

A bizonyítás megtalálható Szőkefalvi-Nagy [135] jegyzetében.

>

tő le konform módon egy korlátos tartományra. Riemann tétele mutatja, hogy a nem üres és \mathbb{C} -től különböző egyszeresen összefüggő tartományok mind konform ekvivalensek. Nem egyszeresen összefüggő tartományok körében a helyzet bonyolultabb.

- 354/-7 :

<

14.12.5 Morera tétele. Legyen $D \subset \mathbb{C}$ nyílt halmaz, f folytonos komplex függvény D -n. Ha minden γ háromszög-pályára, amelynek értékkészlete az általa határolt háromszög-lappal együtt D -ben van, $\int_{\gamma} f(z) dz = 0$, akkor f holomorf D -n.

Bizonyítás. Az f -nek lokálisan van primitív függvénye, amely analitikus, így f is analitikus.

>

* **14.37.1. Vitali tétele.** *Tegyük fel, hogy a $D \subset \mathbb{C}$ tartományon ugyanazzal a K korláttal korlátos komplex értékű holomorf függvények egy f_n sorozata egy C halmaz pontjaiban konvergál, és C -nek van torlódási pontja D -ben. Ekkor f_n lokálisan egyenletesen konvergens D -n.*

Bizonyítás. Legyen c a C egy torlódási pontja, és tegyük fel, hogy $r > 0$ -ra $\mathbb{B}_r(c) \subset D$. Először megmutatjuk, hogy f_n egyenletesen konvergens $\mathbb{B}_{r/2}(c)$ -n. Feltehetjük, hogy $c = 0$. Legyen

$$(1) \quad f_n(z) = a_0^{(n)} + a_1^{(n)}z + \dots, \quad \text{ha } |z| \leq r.$$

Mivel $|f_n(z) - f_n(0)| \leq 2K$, a Schwarz-lemma miatt

$$|f_n(z) - f_n(0)| \leq \frac{2K|z|}{r}, \quad \text{ha } |z| \leq r.$$

Legyen $0 \neq w \in C$. Ekkor

$$\begin{aligned} |f_n(0) - f_m(0)| &\leq |f_n(0) - f_n(w)| + |f_n(w) - f_m(w)| + |f_m(w) - f_m(0)| \\ &\leq 4K|w|/r + |f_n(w) - f_m(w)|. \end{aligned}$$

Először úgy választva w -t, hogy az első tag kisebb legyen, mint $\varepsilon/2$, majd olyan N -et választva, hogy $n, m \geq N$ esetén a második tag kisebb legyen, mint $\varepsilon/2$, kapjuk, hogy $f_n(0) = a_0^{(n)}$ konvergens.

Tekintsük most a

$$g_n(z) = a_1^{(n)} + a_2^{(n)}z + \dots, \quad \text{ha } |z| \leq r$$

függvényeket. Mivel $g_n(z) = (f_n(z) - f_n(0))/z$, ha $z \neq 0$, ezek is konvergensnek C pontjaiban, mert, mint megmutattuk, $f_n(0)$ konvergens. Továbbá $|g_n(z)| \leq 2K/r$: ez teljesül, ha $|z| = r$, és így $|z| \leq r$ esetén is. Megismételve az előző gondolatmenetet, kapjuk, hogy $a_1^{(n)}$ konvergens. Teljes indukcióval kapjuk, hogy minden j -re $a_j^{(n)}$ konvergens, $a_j^{(n)} \rightarrow a_j$. Az együttthatókra jobb korlátot is kaphatunk: a Cauchy-egyenlőtlenségekből $|a_j^{(n)}| \leq K/r^j$. Ha

$$f(z) = a_0 + a_1z + \dots,$$

akkor

$$|f_n(z) - f(z)| \leq \sum_{j=0}^k |a_j^{(n)} - a_j| \frac{r^j}{2^j} + \sum_{j=k+1}^{\infty} \frac{2K}{2^j}, \quad \text{ha } |z| \leq r/2.$$

Rögzítve egy elég nagy k -t, a második összeg kisebb, mint $\varepsilon/2$, és az első is, ha n elég nagy.

Innen már következik az állítás: a konvergenciapontok halmazának belseje nem üres nyílt halmaz, de minden torlódási pontját tartalmazza, így zárt is, tehát az egész D , és pontjaiban a konvergencia lokálisan egyenletes. \square

* **14.37.2. Vitali–Montel kiválasztási tétel.** Ha a $D \subset \mathbb{C}$ nyílt halmazon holomorf komplex értékű függvények egy f_n sorozata lokálisan ugyanazzal a korláttal korlátos, akkor kiválaszható belőle egy lokálisan egyenletesen konvergens részsorozat.

Bizonyítás. Vegyünk egy S megszámlálható sűrű halmazt D -ben, és átlós eljárással válasszunk egy részsorozatot, amely S minden pontjában konvergens. Lokálisan alkalmazva az előző tételt, kapjuk az állítást. \square

* **14.37.3. Hurwitz tétele.** Ha a $D \subset \mathbb{C}$ tartományon holomorf komplex értékű függvények egy f_n sorozata lokálisan egyenletesen konvergál egy nem konstans f függvényhez és $c \in D$ az f zérushelye, akkor c bármely környezetében elég nagy n -re f_n -nek is van zérushelye.

Bizonyítás. A zérushelyek izoláltsága miatt van olyan $r > 0$, hogy $\mathbb{B}_r(c)$ -ben nincs más zérushelye f -nek. Mivel ha n nagy, akkor $f_n - f$ abszolút értéke kicsi a c középpontú r sugarú körpályán, az állítás következik a (később bizonyítandó) Rouché-tételből. \square

* **14.37.4. Következmény.** Ha az f_n -ek konform leképezések és f nem konstans, akkor konform.

Bizonyítás. Ha $f(z) = f(w)$ lenne $z \neq w$ -re, akkor elég nagy n -re f_n sem lenne konform. Így f kölcsönösen egyértelmű, amiből a nyílt leképezések tétele szerint következik, hogy f' sehol sem nulla. \square

* **14.37.5. Tétel: holomorf függvény logaritmus.** Ha az f holomorf komplex értékű függvény sehol sem nulla a D egyszerűen összefüggő tartományon, akkor van olyan g holomorf függvény D -n, hogy $f(z) = \exp(g(z))$ minden $z \in D$ -re.

Bizonyítás. Mivel f'/f holomorf, minden D -beli zárt görbe mentén nulla az integrálja, így van primitív függvénye. Legyen g_0 egy primitív függvény. Ekkor

$$\left(f(z) \exp(-g_0(z)) \right)' = f'(z) \exp(-g_0(z)) - f(z) g_0'(z) \exp(-g_0(z)) \equiv 0.$$

Innen $f(z) \exp(-g_0(z))$ egy nem nulla konstans, ami felírható $\exp(c)$ alakban, és $g = g_0 + c$ -re teljesül az állítás.

14.37.8. Riemann tétele. Ha $D, E \subset \mathbb{C}$ a \mathbb{C} -től különböző nem üres egyszerűen összefüggő tartományok, akkor konform ekvivalensek.

Bizonyítás. A tétel következik az alábbi, valamivel precízebb változatból.

* **14.37.9. Konform leképezések alaptétele.** Legyen $\emptyset \neq D \subsetneq \mathbb{C}$ egyszerűen összefüggő tartomány, $c \in D$. Ekkor egyetlen olyan $f : D \rightarrow \mathbb{D}$ konform ráképezés létezik, amelyre $f(c) = 0$, $f'(c) > 0$.

Bizonyítás. Az egyértelműség bizonyításával kezdjük. Ha g egy másik, D -t \mathbb{D} -be képező holomorf leképezés amelyre $g(c) = 0$ és $g'(c) > 0$, akkor $g \circ f^{-1}$ az egységkör önmagába való holomorf leképezése, ami a nullát nullába viszi, így a

Schwarz-lemma szerint $|g'(c)/f'(c)| \leq 1$, azaz $g'(c) \leq f'(c)$. Ha g is eleget tesz a tétel állításának, akkor $f'(c) \leq g'(c)$ is teljesül, így a Schwarz-lemma szerint $(g \circ f^{-1})(z) \equiv z$, azaz $f = g$.

Ezek szerint az f függvényt az tünteti ki a D -t \mathbb{D} -be képező, $g(c) = 0$, $g'(c) > 0$ tulajdonságú g konform leképezések \mathcal{F} halmazában, hogy a c -beli deriváltja a lehető legnagyobb. Ez a létezés bizonyításának alapja. Legyen $s = \sup_{g \in \mathcal{F}} g'(c)$.

Először megmutatjuk, hogy \mathcal{F} nem üres. Legyen $a \in \mathbb{C} \setminus D$, és tekintsük a $z \mapsto \sqrt{z-a}$ függvényt. Pontosabban, tekintsünk egy olyan, az előző tétel szerint létező g holomorf függvényt, amelyre $z-a = \exp(g(z))$, ha $z \in D$ és legyen $f_1(z) = \exp(\frac{1}{2}g(z))$. Ha $f_1(z_1) = \pm f_1(z_2)$, akkor $z_1 - a = f_1(z_1)^2 = f_1(z_2)^2 = z_2 - a$. Innen egyrészt f_1 kölcsönösen egyértelmű, tehát konform, másrészt ha valamilyen w értéket felvesz, akkor $-w$ -t nem. Mivel nyílt leképezés, értékkészlete tartalmaz valamely $-w \neq 0$ körüli valamely $r > 0$ sugarú zárt körlapot. Az $f_2(z) = r/(f_1(z) - w)$ leképezés szintén konform, és már \mathbb{D} -be képez. Végül

$$f_3(z) = \frac{|f_2'(c)|}{2f_2'(c)}(f_2(z) - f_2(c)) \in \mathcal{F}.$$

Második lépésként megmutatjuk, hogy van olyan $f \in \mathcal{F}$, amelyre $f'(c) = s$. Válasszunk olyan $f_n \in \mathcal{F}$ sorozatot, amelyre $f_n'(c) \rightarrow s$. A Vitali–Montel kiválasztási tétel szerint ennek van olyan részsorozata, amely lokálisan egyenletes konvergál egy f függvényhez. Az egyszerűbb jelölések kedvéért feltehetjük, hogy ez mindjárt f_n . Weierstrass tétele szerint f holomorf és $f_n' \rightarrow f'$ lokálisan egyenletesen, így $f'(c) = s$. Nyilván $|f| \leq 1$. Ha valahol egyenlőség állna, akkor f konstans lenne, de $f'(c) > 0$. Mivel f konform leképezések lokálisan egyenletesen konvergens sorozatának a határértéke, és nem konstans, maga is konform.

Azt kell még megmutatnunk, hogy f értékkészlete \mathbb{D} . Tegyük fel indirekt, hogy van olyan $d \in \mathbb{D}$, amely nincs az értékkészletben. A $t_1(z) = (z-d)/(1-z\bar{d})$ törtlineáris leképezés a d -t 0 -ba képezi, és

$$|t_1(z)|^2 = \frac{|z|^2 + |d|^2 - 2\Re(z\bar{d})}{1 + |z|^2|d|^2 - 2\Re(z\bar{d})}.$$

Mivel $|d|^2 < 1$, nyilván $0 \leq (1-|d|^2)(1-|z|^2)$, ha $|z| \leq 1$, és egyenlőség pontosan akkor teljesül, ha $|z| = 1$. Innen a számláló pontosan akkor egyenlő a nevezővel, ha $|z| = 1$, egyébként kisebb, tehát t_1 a \mathbb{D} -t \mathbb{D} -be, \mathbb{D} határát pedig a \mathbb{D} határába képezi. Mivel $t_1^{-1}(w) = (w+d)/(1+w\bar{d})$ is ugyanilyen tulajdonságú, a \mathbb{D} és a határa is önmagára képeződik kölcsönösen egyértelműen. Tekintsük most a $t_1 \circ f$ leképezés négyzetgyökét. Pontosabban, legyen g olyan leképezés, amelyre $(t_1 \circ f)(z) = \exp(g(z))$, ha $z \in D$, és legyen $f_1(z) = \exp(\frac{1}{2}g(z))$, ha $z \in D$. Ugyanúgy mint az első lépésben adódik, hogy f_1 kölcsönösen egyértelmű. Alkalmazzunk még egy t_1 -hez hasonló t_2 törtlineáris leképezést, amivel visszavisszük $f_1(c)$ -t az origóba, de a törtet szorozzuk meg egy egységnyi abszolút értékű komplex számmal is. Ezzel elérhetjük, hogy $f_2 = t_2 \circ f_1$ -re $f_2'(c) > 0$ legyen. Ha $|w| < 1$ -re $h(w) = t_1^{-1}(t_2^{-1}(w)^2)$,

akkor $f = h \circ f_2$. A h holomorf függvény, $|h(w)| < 1$, ha $|w| < 1$ és $h(0) = 0$. A Schwarz-lemmából $|h'(0)| \leq 1$. Egyenlőség csak akkor lehetne, ha h egy egységnyi abszolút értékű komplex számmal való szorzás lenne. Ez azonban lehetetlen, mert h nem kölcsönösen egyértelmű. Így $|h'(0)| < 1$. Innen $s = f'(c) = h'(0)f_2'(c) < f_2'(c) \leq s$, ami ellentmondás.

- 359/2 :

<
 $r' < |z - a| < R' < R$ teljesüljön, és legyen
 >
 $r' < |z - a| < R' < R$ teljesüljön, és legyen először

- 360/12 :

<
 konvergens. Legyen $\gamma : I \rightarrow D$ egy zárt pálya, amelyre $r' < |\gamma(t) - a| < R'$
 >
 konvergens. Legyen most $\gamma : I \rightarrow D$ egy tetszőleges zárt pálya, amelyre $r' < |\gamma(t) - a| < R'$

- 361/16 :

<
 c_{-1} az f reziduuma a -ban, jelölése $\text{Res}(a, f)$.
 >
 c_{-1} az f reziduuma a -ban, jelölése $\text{Res}(a, f)$.

15.2.5. Casorati–Weierstrass-tétel. *Ha a a komplex értékű f függvény lényeges szingularitása, akkor az a bármely környezetében vett értékkészlete f -nek sűrű \mathbb{C} -ben.*

A tétel mutatja, hogy lényeges szingularitás környezetében a függvény sokkal csúnyábban viselkedik, mintha véges a -ban. Egyébként ennél több is igaz: Picard tétele szerint a függvény az a minden környezetében legfeljebb egy érték kivételével minden \mathbb{C} -beli értéket felvesz.

Bizonyítás. Tegyük fel indirekt, hogy valamely $w \in \mathbb{C}$ -re és $\delta, \varepsilon > 0$ -ra $\mathbb{U}_\varepsilon(w)$ nincs az $\mathbb{U}_\delta(a) \setminus \{a\}$ -n vett értékkészletben. Ekkor a $z \mapsto 1/(f(z) - w)$ függvény korlátos, így megszüntethető szingularitása van. Innen a reciproka, a $z \mapsto f(z) - w$ függvény véges rendű lenne.

- 367/-12 :

<
 ciójánál használt jelölésekkel \mathbb{R}^m -ben $\lambda^m(\mathbb{B}_1(0)) = \alpha(m)$.
 >
 ciójánál használt jelölésekkel \mathbb{R}^m -ben $\lambda^m(\mathbb{B}_1(0)) = \alpha(m) \rightarrow 0$, ha $m \rightarrow \infty$.

15.25.5. Feladat [10]. Mutassuk meg, hogy

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{z-1}}{e^x - 1} dx = \zeta(z)\Gamma(z),$$

ha $\Re(z) > 1$.

- 378/–4 :

<

ahol $f(x+)$ és $f(x-)$ a jobb és bal oldali határértékek x -ben. Minden $[c, d] \subset$

>

ahol $f(x+)$ és $f(x-)$ a jobb és bal oldali határértékek x -ben. Ha f folytonos is, akkor minden $[c, d] \subset$

- 386/8 :

<

Fourier-sorát:

- (1) $|\sin x|$;
- (2) $\operatorname{sgn} \sin x$;
- (3) $x - [x]$;
- (4) $f(x)$ az x távolsága a legközelebbi egésztől.

>

Fourier-sorát:

- (1) $|\sin x|$;
- (2) $\sin^4 x$;
- (3) $\operatorname{sgn}(\sin x)$;
- (4) $\operatorname{sgn}(\cos x)$;
- (5) $(1 - a^2)/(1 - 2a \cos x + a^2)$, $|a| < 1$;
- (6) $(1 - a \cos x)/(1 - 2a \cos x + a^2)$, $|a| < 1$;
- (7) $x - [x]$;
- (8) $f(x)$ az x távolsága a legközelebbi egésztől;
- (9) $[2x] - 2[x]$;
- (10) $[4x] - 3[2x] + 2[x]$;
- (11) $x \mapsto \int_0^x [2x] - 2[x] dx$;
- (12) $x \mapsto \int_0^x [4x] - 3[2x] + 2[x] dx$;
- (13) $\ln|\sin(x/2)|$.

16.28.5. Feladat [8]. Határozzuk meg az alábbi függvények (klasszikus) Fourier-sorát] - π , π [-n:

- (1) $\operatorname{sgn}(x)$;
- (2) $|x|$;
- (3) x ;
- (4) xe^{x^2} ;
- (5) $\operatorname{sgn}(x)(\pi - |x|)$;
- (6) x^2 ;
- (7) $\operatorname{sgn}(x) \cos x$;
- (8) $(1 + \operatorname{sgn}(x)) \sin x$;
- (9) $\cos ax$;
- (10) $\sin ax$.

16.28.7. Feladat [8]. Az alábbi függvények (klasszikus) Fourier-sora] - π , π [-n mely pontokban konvergens és mi az összege:

- (1) $\sqrt{x - [x]}$;
- (2) $\sin(1/x)$;
- (3) $x \sin(1/x)$;
- (4) $\sin(x)/x$.

16.28.9. Feladat [8]. Számítsuk ki az alábbi sorok összegét:

- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^2$;
- (2) $\sum_{n=1}^{\infty} 1/(2n + 1)^2$;
- (3) $\sum_{n=1}^{\infty} 1/n^4$;
- (4) $\sum_{n=1}^{\infty} 1/(2n + 1)^4$;
- (5) $\sum_{\operatorname{lnko}(n,6)=1} 1/n^4$.

- $386/-12$:

<

talma, attól függően, hogy a húrt hol pendítjük meg?

>

talma, attól függően, hogy a húrt hol pendítjük meg?

16.31.2. Feladat [11]. Határozzuk meg az alábbi Fourier-sorok összegét:

(1)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n + 1)x}{2n + 1};$$

(2)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n};$$

$$(3) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2 - 1};$$

$$(4) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n};$$

$$(5) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(2n+1)x}{2n+1}.$$

16.31.4. Feladat [10]. Bizonyítsuk be, hogy $\sum_{n=1}^{\infty} \sin(nx)/n$ részletösszegei egyenletesen korlátosak.

16.31.6. Feladat [8]. Bizonyítsuk be, hogy ha a b_n -ek egy $f \in \mathbb{L}^1[0, 2\pi]$ függvény Fourier-együtthatói, akkor

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x)(\pi - x) dx.$$

16.31.7. Feladat [11]. Bizonyítsuk be, hogy az alábbi trigonometrikus sorok mindenütt konvergensek, de nem Fourier-sorai egyetlen $f \in \mathbb{L}^1[-\pi, \pi]$ függvénynek sem:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{\ln n}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{\ln n \ln \ln n}.$$

16.31.9. Feladat: Gibbs-féle jelenség [12]. Bizonyítsuk be, hogy az $x - \lfloor x \rfloor$ függvény Fourier-sorának részletösszegei a szakadás közelében mintegy 9% „túllövés” tartalmaznak, azaz ennyivel a függvény alá illetve fölé mennek. Igaz-e ez más szakadásos függvényekre? Van-e „túllövés” a Fejér-közepeknél?

- 412/–15 :
<

Így csak egy helyen van szükség f' kiszámítására, de a konvergencia lelassul. A két utóbbi módszer Banach-terekre való általánosítását a differenciálszámításnál tárgyaljuk.

* **17.27. Egy példa: a konvergencia rendje.** Tekintsük a $2 \sin x - x = 0$ egyenletet, és határozzuk meg egyetlen pozitív gyökét. Az ismertetett eljárásokkal a táblázatokban látható eredményeket kapjuk.

Látjuk, hogy a húrmódszernél a helyes jegyek száma minden lépésben ugyanannyival nő, amit úgy szokás kifejezni, hogy a módszer *elsőrendben konvergens*. A Newton-féle érintőmódszernél a helyes jegyek száma minden lépésben kb. megduplázódik, a Newton-módszer *másodrendben konvergens*. A szelőmódszernél minden lépésben a helyes jegyek száma kb. 1,6-szeresére nő, a szelő módszer *konvergencia rendje* $\approx 1,6$.

Megjegyezzük, hogy a módosított Newton-módszer is elsőrendben konvergens, és többszörös gyökök esetében, tehát ha nem csak $f(\alpha) = 0$, hanem $f'(\alpha) = 0$ is teljesül, akkor a Newton-módszer is csak elsőrendben konvergens.

>

Így csak egy helyen van szükség f' kiszámítására, de a konvergencia lelassul.

A Newton-módszer és a módosított Newton-módszer is speciális esete az

$$x_{n+1} = x_n - \alpha_n \frac{f(x_n)}{Q_n}$$

iterációval dolgozó *kvázi Newton-módszerek*, amelynél α_n minden lépésben változtatható paraméter, Q_n pedig $f'(x_n)$ egy közelítése. Megtehetjük például, hogy $f'(x_n)$ -et egy

$$Q_n = \frac{f(x_n + h_n) - f(x_n)}{h_n}$$

differenciával közelítjük, ekkor egyáltalán nem kell deriváltat számolni. Ha $h_n = x_n - x_{n-1}$, akkor a szelőmódszert kapjuk vissza. Ha h_n ennél lényegesen kisebb abszolút értékű, akkor az eljárás felgyorsul, azonban a kerekítési hibák megnőhetnek.

Természetesen fixpontmódszerek is használhatók, és a módszerek kombinálhatók is.

Leállási kritériumként (egy adott iterációs szám túllépésén kívül) annak vizsgálata kínálkozik, hogy $|f(x_n)| < \varepsilon$ valamely előre megadott $\varepsilon > 0$ -ra. Ha a gyök közelében $|f'| \ll 1$, akkor ez túl hamar történő leállást eredményezhet, míg $|f'| \gg 1$ esetén az iteráció túl soká tarthat. Ezért inkább az $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$ kritériumot alkalmazzuk. Ez csak nagyon lassan konvergáló fixpontmódszer esetén (azaz ha a kontrakcióra a Lipschitz-konstans nagyon közel van egyhez) hátrányos; ezt észrevehetjük Aitken Δ^2 -módszerével.

A módszerek Banach-terekre való általánosítását a differenciálszámításnál tárgyaljuk.

* **17.27. Egy példa.** Tekintsük a $2 \sin x - x = 0$ egyenletet, és határozzuk meg egyetlen pozitív gyökét. Az ismertett eljárásokkal a táblázatokban látható eredményeket kapjuk.

* **17.27.5. A konvergencia rendje.** Mint az előző példából látjuk, a húrmódszernél a helyes jegyek száma minden lépésben ugyanannyival nő, amit úgy szokás kifejezni, hogy a módszer *elsőrendben konvergens*. A Newton-féle érintőmódszernél a

helyes jegyek száma minden lépésben kb. megduplázódik, a Newton-módszer *másodrendben konvergens*; ezt jóval általánosabb esetben, a differenciálszámításnál bizonyítjuk. A szelómódszernél minden lépésben a helyes jegyek száma kb. 1,6-szeresére nő, megmutatható hogy a szelő módszer *konvergencia rendje* $(\sqrt{5} + 1)/2 \approx 1,6$.

Megjegyezzük, hogy a módosított Newton-módszer is elsőrendben konvergens, és többszörös gyökök esetében, tehát ha nem csak $f(\alpha) = 0$, hanem $f'(\alpha) = 0$ is teljesül, akkor a Newton-módszer is csak elsőrendben konvergens: Valóban, az általánosabb kvázi Newton módszerre (de $f'(x)$ -et használva), ha $f(x) = 0$, azaz x a gyök, és $f^{(m)}(x)$ az első el nem tűnő derivált, f pedig lokálisan C^m -ben van, akkor a Taylor-formulából

$$f(x_n) = \frac{f^{(m)}(\xi)}{m!}(x_n - x)^m \quad \text{és} \quad f'(x_n) \approx \frac{f^{(m)}(\xi')}{(m-1)!}(x_n - x)^{m-1},$$

így

$$x_{n+1} = x_n - \alpha_n \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \approx x_n - \alpha_n \frac{x_n - x}{m},$$

ahonnan $x_{n+1} - x \approx (1 - \alpha_n/m)(x_n - x)$, azaz $\alpha_n = \alpha \neq m$ esetén a konvergencia lineáris, a hiba $x_n - x \approx cq^n$ a $q = 1 - \alpha/m$ értékkel. Megmutatható, hogy $\alpha = m$ esetén a konvergencia másodrendű lesz. Ha nem ismerjük m értékét, akkor az Aitken-módszernél leírtak szerint q — és így m is — minden második lépésben újra becsülhető; így kapjuk az *adaptív Newton-módszert*.

- 414/4 :

<

gyökeiből, interpolációval.

>

gyökeiből, interpolációval.

* **17.31.1. Feladat [11].** Oldjuk meg az alábbi egyenleteket a tanult módszerekkel és megállási kritériumokkal:

- (1) $\cos^2(2x) - x^2 = 0$;
- (2) $\prod_{k=1}^{10} (x + k) = 0$;
- (3) $x^6 - 2x^5 + 5x^4 - 6x^3 + 2x^2 + 8x - 8 = 0$;
- (4) $e^{-x} - \eta = 0$, $\eta = 10^{-9}$;
- (5) $(x^2 - 1)^{m-1} \ln x = 0$, $m = 3, 5, 7$.

* **17.31.2. Feladat [9].** Határozzuk meg 1 mól CO_2 térfogatát 300 K° -on 10 atm (1013250 Pa) nyomáson a van der Waals-állapotegyenletből:

$$(p + a(n/V)^2)(V/n - b) = nRT,$$

ahol n a mólok száma. A van der Waals-állandók CO_2 -ra $a/(\text{Pa m}^6 \text{K}^\circ/\text{mól}^2) = 188,33$ és $b/(\text{m}^3 \text{K}^\circ/\text{mól}) = 9,77 \cdot 10^{-4}$. Vessük össze az eredményt a tökéletes gázra kapott eredménnyel.

* **17.31.3. Feladat [9].** Egy alagútdióda karakterisztikája

$$I = \alpha(e^{U/\beta} - 1) - \mu U(U - \gamma),$$

ahol $\alpha/A = 10^{-12}$, $\beta/V = 25 \cdot 10^{-3}$, $\mu/(A/V^2) = 10^{-3}$ és $\gamma/V = 0,4$. Sorbakötjük egy 3333Ω -os ellenállással egy $0,4 \text{ V}$ -os feszültségforrásra. Határozzuk meg a kialakuló munkapontokat. Mi a helyzet, ha a feszültség $0,6 \text{ V}$, az ellenállás pedig $12 \text{ k}\Omega$?

- 428/9 :

<

értelmezett függvény, és $x \in \mathbb{R}^n$, akkor legyen az f függvény $\tau_x f$ eltoltja és \check{f} megfordítása a

$$(\tau_x f)(y) = f(y - x) \quad \text{illetve} \quad \check{f}(y) = f(-y)$$

>

értelmezett függvény, $x \in \mathbb{R}^n$, $0 \neq s \in \mathbb{R}$, akkor legyen az f függvény $\tau_x f$ eltoltja, $\sigma_s(f)$ nyújtottja illetve \check{f} megfordítása a

$$(\tau_x f)(y) = f(y - x), \quad \sigma_s(f)(y) = f(y/s), \quad \text{illetve} \quad \check{f}(y) = f(-y)$$

- 428/-5 :

<

$$\hat{f}(t/2\pi) = \int f(x) e^{-i\langle t, x \rangle} dx$$

>

$$\hat{f}\left(\frac{t}{2\pi}\right) = \int f(x) e^{-i\langle t, x \rangle} dx$$

- 428/-2 :

<

jelölésünknel frekvencia. A definícióból azonnal következik, hogy a Fourier-

>

jelölésünknel frekvencia. A Fourier-transzformált egyszerű kapcsolatban van a $t \mapsto \int f(x) e^{-\langle t, x \rangle} dx$ Laplace-transzformálttal is, hiszen

$$\hat{f}\left(\frac{t}{2\pi i}\right) = \int f(x) e^{-\langle t, x \rangle} dx$$

A definícióból azonnal következik, hogy a Fourier-

- 429/1 :

<

- (1) $|\hat{f}| \leq \|f\|_1$;
- (2) $(\tau_x f)^\wedge = e_{-x} \hat{f}$;
- (3) $(e_x f)^\wedge = \tau_x \hat{f}$;
- (4) ha $\varepsilon > 0$ és $g(x) = f(\varepsilon x)$, akkor $\hat{g}(t) = \hat{f}(t/\varepsilon)/\varepsilon^n$.

>

- (1) $|\hat{f}| \leq \|f\|_1$;
- (2) $\bar{\hat{f}} = \check{\hat{f}}$ (konjugálás);
- (3) $(\tau_x f)^\wedge = e_{-x} \hat{f}$ (eltolás);
- (4) $(e_x f)^\wedge = \tau_x \hat{f}$ (modulálás);
- (5) $(\sigma_s(f))^\wedge = |s|^n \sigma_{1/s}(\hat{f})$ (nyújtás).

- 429/-16 :

<

Egy metrikus téren értelmezett, skalár értékű h függvényre azt mondjuk,

>

Egy metrikus téren értelmezett, normált térbeli értékű h függvényre azt mondjuk,

- 432/-15 :

<

transzformáltját.

>

transzformáltját.

18.11.1. Feladat [7]. Számítsuk ki az $f(x) = \cos x$, ha $|x| \leq \pi/2$, $f(x) = 0$ egyébként függvény Fourier-transzformáltját.

- 433/6 :

<

fel. Megadunk egy ilyen, kompakt tartójú és síma függvényt. A L'Hospital-szabály alkalmazásával kapjuk, hogy a

>

fel. Megadunk egy ilyen, kompakt tartójú és síma függvényt. A 12.6 lemma bizonyításában a L'Hospital-szabály alkalmazásával megmutattuk, hogy a

- 437/-4 :

<

leképpen terjeszthető ki egy L^2 -t önmagára képező izometriává.

>

leképpen terjeszthető ki egy L^2 -t önmagára képező izometriává.

18.22.1. Feladat [10]. Mutassuk meg, hogy ha $f \in \mathbb{L}^1(\mathbb{R}^n; \mathbb{C}) \cap \mathbb{L}^2(\mathbb{R}^n; \mathbb{C})$, akkor \hat{f} és az f függvény \mathbb{L}^2 -beli Fourier-transzformáltja megegyeznek.

- 437/-1 :
<

$$\int_{-\infty}^{\infty} (\sin(ax)/x)^4 dx = 2a^3 \pi/3.$$

>

$$\int_{-\infty}^{\infty} (\sin(ax)/x)^4 dx = 2a^3 \pi/3.$$

18.25. Feladat[8]. Határozzuk meg $x \mapsto 1/(1+x^2)$ Fourier-transzformáltját és $\int_{-\infty}^{+\infty} 1/(1+t^2)^2 dt$ értékét.

18.26. Ablak Fourier-transzformált. Legyen a $0 \neq \varrho \in \mathbb{L}^2(\mathbb{R})$ ablak függvény rögzített. Ha $\text{spt}(\varrho) \subset [-T, 0]$, akkor azt mondjuk, hogy az ablak-függvény *kauzális*. Egy $f \in \mathbb{L}^2(\mathbb{R})$ függvény erre vonatkozó *ablak Fourier-transzformáltja* (angol rövidítéssel: WFT-je) az $(\nu, t) \mapsto \tilde{f}(\nu, t) = (f_t)^\wedge$ függvény, ahol $f_t(x) = \overline{\varrho}(x-t)f(x)$. A $\varrho_{\nu, t}(x) = g(x-t)e^{2\pi i \nu x}$ jelöléssel $\tilde{f}(\nu, t) = \langle f, g_{\nu, t} \rangle$. Az ablak Fourier transzformáltat Gábor Dénes Nobel-díjas magyar fizikus vezette be, ezért *Gábor-transzformálnak* is szokás nevezni. Ő az $x \mapsto e^{-x^2/2}$ Gauss-függvényt használta ablaknak. Néha csak az ezzel az ablakkal vett transzformáltat nevezik Gábor-transzformálnak.

18.27. Példa. Az $x \mapsto \sin(2\pi x^2)$ „zirp” jel a

$$g(x) = \begin{cases} \cos^2(\pi x), & \text{ha } -1/2 \leq x \leq 1/2, \\ 0 & \text{egyébként} \end{cases}$$

Hanning-ablakkal. Más függvények, amelyeket $[-1/2, 1/2]$ -re megszorítva ablaknak használnak: 1 (négyzet-ablak); $x \mapsto 0,54 + 0,46 \cos(2\pi x)$ (*Hamming-ablak*); $x \mapsto e^{-18x^2}$ (*Gauss-ablak*); $x \mapsto 0,42 + 0,5 \cos(2\pi x) + 0,08 \cos(4\pi x)$ (*Blackman-ablak*).

18.28. Megjegyzés. A fenti „időablakozásnak” megfelel egy „frekvenciaablakozás”: a Plancherel-tétel szerint $\tilde{f}(\nu, t) = \langle f, \varrho_{\nu, t} \rangle = \langle \hat{f}, (\varrho_{\nu, t})^\wedge \rangle$, ahol $\varrho_{\nu, t} = (\tau_t \varrho) \mathbf{e}_\nu$ miatt $(\varrho_{\nu, t})^\wedge = \tau_\nu((\tau_t \varrho)^\wedge) = \tau_\nu(\hat{\varrho}_{-t})$, így

$$\tilde{f}(\nu, t) = e^{-2\pi i t \nu} \langle \hat{f}, \hat{\varrho}_{-t, \nu} \rangle.$$

Nyilván célszerű, ha az ablakfüggvény abszolútértékének négyzetét sűrűségfüggvénynek tekintve, a szórásnégyzete és a Fourier-transzformáltjának a szórásnégyzete is minél kisebb. A kettő azonban egyszerre nem csökkenthető tetszőlegesen.

18.29. Tétel: bizonytalansági reláció. Tegyük fel, hogy $\varrho \in \mathbb{L}^2(\mathbb{R})$, $\|\varrho\|_2 = 1$, továbbá

$$\int_{\mathbb{R}} t^2 |\varrho(t)|^2 dt \quad \text{és} \quad \int_{\mathbb{R}} \nu^2 |\hat{\varrho}(\nu)|^2 d\nu$$

végesek. Ekkor

$$t_0 := \int_{\mathbb{R}} t |\varrho(t)|^2 dt \quad \text{és} \quad \nu_0 := \int_{\mathbb{R}} \nu |\hat{\varrho}(\nu)|^2 d\nu$$

valamint

$$T^2 := \int_{\mathbb{R}} (t - t_0)^2 |\varrho(t)|^2 dt \quad \text{és} \quad N^2 := \int_{\mathbb{R}} (\nu - \nu_0)^2 |\hat{\varrho}(\nu)|^2 d\nu$$

léteznek és végesek és $4\pi NT \geq 1$.

Bizonyítás. Mivel $\sqrt{2}|t| \leq 1 + t^2$ és $\sqrt{2}|\nu| \leq 1 + \nu^2$, létezik t_0 és ν_0 . Megfelelő eltolást és modulációt alkalmazva, az általánosság megszorítása nélkül feltehetjük, hogy $t_0 = 0$ és $\nu_0 = 0$. Tegyük fel, hogy νr minden kompakt intervallumon abszolút folytonos és ϱ' négyzetesen integrálható. Először megmutatjuk, hogy $x|\varrho(x)|^2 \rightarrow 0$, ha $x \rightarrow \pm\infty$. A $t \mapsto t\varrho(t)\overline{\varrho(t)} = t|\varrho(t)|^2$ függvény minden kompakt intervallumon abszolút folytonos és

$$\frac{d}{dt} t|\varrho(t)|^2 = |\varrho(t)|^2 + t\varrho'(t)\overline{\varrho(t)} + t\varrho(t)\overline{\varrho'(t)} = |\varrho(t)|^2 + 2\Re(t\varrho'(t)\overline{\varrho(t)}).$$

Mindkét oldalt integrálva

$$2\Re \int_0^x t\varrho'(t)\overline{\varrho(t)} dt + \int_0^x |\varrho(t)|^2 dt = x|\varrho(x)|^2.$$

Ha $x \rightarrow +\infty$, a bal oldalon lévő integrálok konvergálnak, minkettő két négyzetesen integrálható függvény belső szorzatához $[0, +\infty[$ -en. Innen a $\lim_{x \rightarrow +\infty} x|\varrho(x)|^2$ határérték létezik. Hasonlóan adódik, hogy $\lim_{x \rightarrow -\infty} x|\varrho(x)|^2$ is létezik. Mivel $t \mapsto t|\varrho(t)|^2$ integrálható, a határértékek csak végesek lehetnek.

Másodszor megmutatjuk, hogy ϱ' Fourier-transzformáltja az $f : \nu \mapsto 2\pi i\nu \hat{\varrho}(\nu)$ függvény. Parciális integrálással

$$\int_{-n}^n \varrho'(t) e^{-2\pi i\nu t} dt = \varrho(n) e^{-2\pi i\nu n} - \varrho(-n) e^{2\pi i\nu n} + 2\pi i\nu \int_{-n}^n \varrho(t) e^{-2\pi i\nu t} dt.$$

A bal oldalon álló integrál $\varrho' \xi_{[-n,n]}$, a jobb oldalon álló pedig $\varrho \xi_{[-n,n]}$ Fourier-transzformáltja. Részszorozatra áttérve elérhetjük, hogy a bal oldali integrálok majdnem mindenütt tartsanak ϱ' Fourier-transzformáltjához. Mégegyszer részszorozatra

áttérve, elérhetjük, hogy a jobb oldalon álló integrálok majdnem mindenütt tartsanak ϱ Fourier-transzformáltjához.

Térjünk rá az egyenlőtlenség bizonyítására:

$$\begin{aligned} 4\pi^2 T^2 N^2 &= 4\pi^2 \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 |\varrho(t)|^2 dt \int_{-\infty}^{+\infty} \nu^2 |\hat{\varrho}(\nu)|^2 d\nu \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} t^2 |\varrho(t)|^2 dt \int_{-\infty}^{\infty} |2\pi i \nu \hat{\varrho}(\nu)|^2 d\nu \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} t^2 |\varrho(t)|^2 dt \int_{-\infty}^{\infty} |\varrho'(t)|^2 dt \\ &\geq \left(\int_{-\infty}^{\infty} |t| |\varrho(t)| |\varrho'(t)| dt \right)^2 \geq \left(\Re \int_{-\infty}^{\infty} t \varrho(t) \varrho'(t) dt \right)^2 \\ &\geq \left(\frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} t \frac{d}{dt} |\varrho(t)|^2 dt \right)^2. \end{aligned}$$

Innen parciális integrálással — felhasználva, hogy $x|\varrho(x)|^2 \rightarrow 0$, ha $x \rightarrow \pm\infty$ — kapjuk, hogy $4\pi^2 T^2 N^2 \geq 1/4$.

A bizonyítás teljes lesz, ha megmutatjuk, hogy a tétel feltételeiből következik, hogy ϱ minden kompakt intervallumon abszolút folytonos és ϱ' négyzetesen integrálható. Disztribúciókkal fogunk dolgozni; a definíciókat és alaptulajdonságokat lásd azok részletes tárgyalásánál. Ha $\varphi \in \mathcal{S}$, akkor

$$T_f(\varphi) = \int_{-\infty}^{\infty} 2\pi i \nu \hat{\varrho}(\nu) \varphi(\nu) d\nu = - \int_{-\infty}^{\infty} \varrho \hat{\varphi}' = T'_\varrho(\hat{\varphi}),$$

ahol T'_ϱ a T_ϱ disztribúció deriváltja. Innen $T_f(\varphi) = T'_\varrho(\hat{\varphi})$ minden $\varphi \in \mathcal{S}$ -re. Ez azt jelenti, hogy T'_ϱ reguláris disztribúció, az \hat{f} négyzetesen integrálható függvény megfordítása reprezentálja. Megmutatjuk, hogy ϱ minden kompakt intervallumon abszolút folytonos és \hat{f} megfordításának a deriváltja majdnem mindenütt. Legyen $g(x) = \int_0^x \hat{f}(-t) dt$. A g abszolút folytonos minden kompakt intervallumon és

$$T'_g(\varphi) = T_{g'}(\varphi) = T_f(\hat{\varphi}) = T'_\varrho(\varphi),$$

így $T'_{\varrho-g}(\varphi) = 0$ minden $\varphi \in \mathcal{D}$ -re. A DuBois-Reymond-lemma bizonyításában megmutatjuk, hogy $T_{\varrho-g}$ konstanssal reprezentálható, így $\varrho = g + c$ majdnem mindenütt, tehát ϱ is abszolút folytonos minden kompakt intervallumon és $\varrho' = g'$ az \hat{f} megfordítása négyzetesen integrálható.

18.30. Példa. Ha $\varrho(t) = \sqrt[4]{2ae^{-\pi t^2 a}}$, akkor $\hat{\varrho}(\nu) = \sqrt[4]{2/ae^{-\pi \nu^2/a}}$, $t_0 = \nu_0 = 0$ és $T = 1/\sqrt{4\pi a}$, $N = \sqrt{a}/\sqrt{4\pi}$.

18.31. Feladat [11]. Bizonyítsuk be a példában szereplő állításokat.

18.32. Feladat [13]. Határozzuk meg a példaként felsorolt ablakok Fourier-transzformáltját, ha kell, numerikusan.

18.33. Tétel: rekonstrukciós formula. Ha ϱ egy ablak függvény, akkor a hozzá tartozó ablak Fourier-transzformáltra bármely $f \in \mathbb{L}^2(\mathbb{R})$ -re

$$f(x) = \frac{1}{\|\varrho\|_2^2} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\cdot, t)(-x) \varrho(x-t) dt$$

majdnem minden x -re, ahol az \mathbb{L}^2 -beli Fourier-transzformált a kipontozott frekvencia változóban értendő.

Bizonyítás. Mivel \tilde{f} a három változójában mérhető

$$(x, \nu, t) \mapsto \overline{\varrho}(x-t) f(x) e^{-2\pi i \nu x}$$

függvény x szerinti integrálja, mérhető. Mivel az $(x, t) \mapsto \overline{\varrho}(x-t) f(x)$ függvény minden t -re négyzetesen integrálható, $\hat{f}(\cdot, t)$ az $f \tau_t \overline{\varrho}$ megfordítása majdnem mindeütt, azaz $\hat{f}(\cdot, t)(-x) = f(x) \overline{\varrho}(x-t)$ majdnem minden x -re. Szorozva $\varrho(x-t)$ -vel és integrálva t szerint, kapjuk a bizonyítandó állítást.

18.34. Tétel. Legyen $g \in \mathbb{L}^2(\mathbb{R})$ egy ablak függvény. Ekkor bármely $h \in \mathbb{L}^2(\mathbb{R}^2)$ -re, ha

$$f_h = \frac{1}{\|g\|_2^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g_{\omega, t} h(\omega, t) dt d\omega,$$

akkor bármely $f \in \mathbb{L}^2(\mathbb{R})$ -re, amelyre $f \neq f_h$, teljesül, hogy $\|h - \tilde{f}\|_2 > \|h - \tilde{f}_h\|_2$.

A továbbiakban olyan formulákat keresünk, amelyek a Gábor-transzformált diszkrét helyeken vett értékeiből állítják vissza a függvényt. Az ilyen formulák öse a mintavételi tétel:

18.35. Mintavételi tétel. Legyen $f \in \mathbb{L}^2(\mathbb{R})$ folytonos függvény, amely „sávhatárolt N -nel”, azaz amelyre $\hat{f}(\nu) = 0$, ha $\nu \notin [-N, N]$. Ekkor $t_n = n/(2N)$ jelöléssel

$$f(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{\sin(2\pi N(t - t_n))}{2\pi N(t - t_n)} \hat{f}(t_n);$$

itt $t = t_n$ esetén a tört értékének a határértéke (= 1) veendő.

Bizonyítás. Mivel \hat{f} sávhatárolt, $\hat{f} \in \mathbb{L}^1 \cap \mathbb{L}^2$, és az inverziós tétel szerint

$$f(t) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-n}^n \hat{f}(\nu) e^{2\pi i t \nu} d\nu \int_{-N}^N \hat{f}(\nu) e^{2\pi i t \nu} d\nu.$$

Mivel $\hat{f} \in \mathbb{L}^2[-N, N]$, Fourier-sorba fejthető,

$$\hat{f}(\nu) \sim \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e^{\pi i n \nu / N},$$

ahol

$$c_n = \int_{-N}^N \hat{f}(\nu) e^{-\pi i n \nu} d\nu.$$

A fentiek szerint az integrál $f(-n/(2N))$, így $c_n = f(-n/(2N))/(2N)$. A Fourier-sort behelyettesítve az inverziós formulába

$$f(t) = \int_{-N}^N \hat{f}(\nu) e^{2\pi i t \nu} d\nu = \langle \hat{f}, \mathbf{e}_{-t} \rangle = \left\langle \sum c_n \mathbf{e}_{n/(2N)}, \mathbf{e}_{-t} \right\rangle.$$

Mivel a belső szorzat folytonos,

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{1}{2N} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}\left(-\frac{n}{2N}\right) \int_{-N}^N e^{\pi i n \nu / N} e^{2\pi i t \nu} d\nu \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}\left(-\frac{n}{2N}\right) \int_0^N \cos \pi \nu (2t + n/N) d\nu \\ &= \frac{1}{N} \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}\left(-\frac{n}{2N}\right) \left[\frac{\sin \pi \nu (2t + n/N)}{\pi (2t + n/N)} \right]_0^N \\ &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \hat{f}\left(-\frac{n}{2N}\right) \frac{\sin \pi (2Nt + n)}{\pi (2Nt + n)}. \end{aligned}$$

18.36. Diszkrét rekonstrukciós formula. Legyen $g \in \mathbb{L}^2(\mathbb{R})$ egy kompakt tartójú ablak függvény, amely eltűnik egy $1/\nu$ hosszúságú intervallumon kívül. Legyen

$$H_\tau(x) = \tau \sum_{n \in \mathbb{Z}} |g(x - n\tau)|^2.$$

(Ha g majdnem mindenütt folytonos, akkor $\tau \downarrow 0$ esetén $H_\tau(x) \rightarrow \|g\|_2^2$ minden $x \in \mathbb{R}$ -re.) Tegyük fel, hogy

$$0 < \inf_{x \in \mathbb{R}} H_\tau(x) \quad \text{és} \quad \sup_{x \in \mathbb{R}} H_\tau(x) < \infty.$$

(Ez csak $\nu\tau \leq 1$ esetén lehetséges.) Ekkor

$$f(t) = \nu\tau \sum_{n \in \mathbb{Z}} \sum_{m \in \mathbb{Z}} \frac{g_{m\nu, m\tau}(t)}{H_\tau(t)} \tilde{f}(m\nu, n\tau).$$

A továbbiakban skálafüggetlen módszert keresünk.

18.37. Definíció. Legyen $p \in \overline{\mathbb{R}}$ rögzített, és egy $\psi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ függvényre legyen $\psi_s(x) = |s|^{-1/p} \psi(x/s)$ és $\psi_{s,t}(x) = |s|^{-1/p} \psi((x-t)/s)$; ez a ψ anyawavelethez tartozó waveletcsalád (itt $1/\infty = 0$). Ha $1 \leq q < \infty$, akkor

$$\|\psi_{s,t}\|_q^q = \int_{\mathbb{R}} |s|^{-q/p} \left| \psi((x-t)/s) \right|^q dx = |s|^{-q/p} \int_{\mathbb{R}} |\psi(y)|^q |s| dy = |s|^{1-q/p} \|\psi\|_q^q,$$

így $p = q$ esetén a norma nem változik; $q = \infty$ -re $\|\psi_{s,t}\|_\infty = |s|^{-1/p} \|\psi\|_\infty$.

18.38. Példa. Anyawaveletnek alkalmas például $\psi(x) = xe^{-x^2}$ vagy a deriváltja, a $\psi(x) = (1 - 2x^2)e^{-x^2}$ „mexikói kalap”.

18.39. Feladat [8]. Számoljuk ki az előző példában szereplő anyawaveletek Fourier-transzformáltját.

18.40. Definíció. Legyen $p \in \overline{\mathbb{R}}$ és $\psi \in \mathbb{L}^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ rögzített. Egy $f \in \mathbb{L}^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ függvény folytonos wavelet transzformáltja az

$$\tilde{f}(s, t) = \langle f, \psi_{s,t} \rangle = \langle \hat{f}, (\psi_{s,t})^\wedge \rangle$$

függvény. Egyszerű számolással $(\psi_{s,t})^\wedge(\omega) = |s|^{1-1/p} e^{-2\pi i \omega t} \hat{\psi}(s\omega)$, így $\tilde{f}(s, t)$ az $\omega \mapsto |s|^{1-1/p} \hat{f}(\omega) \hat{\psi}(s\omega)$ függvény Fourier-transzformáltja a $-t$ helyen.

18.41. Szimmetrikus rekonstrukciós formula. Az előző definíció jelöléseivel, tegyük fel, hogy

$$0 < C = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\hat{\psi}(\xi)|^2}{|\xi|} d\xi < \infty.$$

Ekkor tetszőleges $f \in \mathbb{L}^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ visszaállítható \tilde{f} -ből:

$$f = \frac{1}{C} \int_{-\infty}^{\infty} |s|^{2/p-3} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(s, t) \psi_{s,t} dt ds.$$

18.42. Megjegyzés. Ha $\psi \in \mathbb{L}^1(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, akkor $\hat{\psi}$ folytonos, így a feltételből $\hat{\psi}(0) = 0$, azaz $\int_{\mathbb{R}} \psi(x) dx = 0$.

18.43. Asszimmetrikus rekonstrukciós formula. Az előző definíció jelöléseivel, tegyük fel, hogy

$$0 < C_+ = \int_0^{\infty} \frac{|\hat{\psi}(\xi)|^2}{|\xi|} d\xi < \infty$$

és

$$0 < C_- = \int_{-\infty}^0 \frac{|\hat{\psi}(\xi)|^2}{|\xi|} d\xi < \infty.$$

Legyen

$$\eta(u) = \frac{\eta_+(u)}{C_+} + \frac{\eta_-(u)}{C_-},$$

ahol

$$\eta_+(u) = \int_0^\infty \hat{\psi}(\omega) e^{2\pi i \omega u} d\omega \quad \text{és} \quad \eta_-(u) = \int_{-\infty}^0 \hat{\psi}(\omega) e^{2\pi i \omega u} d\omega.$$

Ekkor

$$f = \int_0^\infty |s|^{2/p-3} \int_{-\infty}^\infty \tilde{f}(s,t) \eta_{s,t} dt ds.$$

18.44. Megjegyzés. Ha $C_- = 0$ vagy $C_+ = 0$, akkor $\tilde{f}(s,t)$, $s > 0$ nem tartalmaz információt \hat{f} egyik feléről. Ez nem fordulhat elő, ha ψ valós, mert ekkor $\hat{\psi}(-\omega) = \overline{\hat{\psi}(\omega)}$.

18.45. Megjegyzés. Diszkrét visszaállítás is lehetséges, ekkor $s = \pm \sigma^m$, $t = n\sigma^m \tau$, $m, n \in \mathbb{Z}$. A folytonos és a diszkrét esetnek, valamint az ablak Fourier-transzformálnak van közös általánosítása, a különböző „frame”-ek.

18.46. Hardy-tér a felső és alsó (illetve bal és jobb) félsíkon. Jelölje \mathbb{C}^+ a nyílt komplex felső félsíkot, \mathbb{C}^- pedig a nyílt komplex alsó félsíkot, azaz legyen $\mathbb{C}^+ = \{z \in \mathbb{C} : \Im(z) > 0\}$ és $\mathbb{C}^- = \{z \in \mathbb{C} : \Im(z) < 0\}$. Ha $1 \leq p < \infty$, legyen H_+^p azon $f : \mathbb{C}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ komplex függvények halmaza, amelyek analitikusak, és amelyekre

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x+iy)|^p dx$$

korlátos, mint $y > 0$ függvénye. Egy $f \in H_+^p$ függvényre legyen

$$\|f\| = \sup_{y>0} \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x+iy)|^p dx \right)^{1/p}.$$

Legyen H_+^∞ azon $f : \mathbb{C}^+ \rightarrow \mathbb{C}$ komplex függvények halmaza, amelyek analitikusak és korlátosak. Egy $f \in H_+^\infty$ függvényre legyen $\|f\| = \sup_{x \in \mathbb{R}, y > 0} |f(x+iy)|$. Legyen $f \in H_+^p$ pontosan akkor, ha az $z \mapsto \overline{f(\bar{z})}$ függvény H_+^p eleme; ezek a függvények az alsó félsíkon analitikusak. (Ha a Fourier-transzformált helyett Laplace-transzformáltat akarunk használni, akkor a felső félsíknak a bal, az alsó félsíknak a jobb félsík felel meg.)

18.47. Definíció. Ha $x \in \mathbb{R}$, jelentse $\lim_{z \searrow x} f(z) = c$ azt, hogy minden $C > 0$ -ra az f függvény $\{\xi + i\eta : \xi \in \mathbb{R}, |\xi - x| < C\eta\}$ halmazra vett megszorításának c a határértéke az x pontban; $\lim_{z \searrow x}$ a *nemtangenciális határérték*.

18.48. Tétel. Ha $1 \leq p \leq \infty$, $f \in H_+^p$, akkor $f(x) := \lim_{z \searrow x} f(z)$ majdnem mindenütt létezik, $f \in L^p(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, továbbá $x \mapsto \ln|f(x)|/(1+x^2)$ integrálható.

18.49. Következmény: Poisson-formula. Ha $1 \leq p \leq \infty$, $f \in H_+^p$, akkor $x \in \mathbb{R}$, $y > 0$ esetén

$$f(x + iy) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{y}{(x-t)^2 + y^2} f(t) dt.$$

Megfordítva, ha $h \in \mathbb{L}^p(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ és

$$f(x + iy) = \frac{1}{\pi} \int_{\mathbb{R}} \frac{y}{(x-t)^2 + y^2} h(t) dt$$

analitikus a felső félsíkon, akkor $f \in H_+^p$ és $h(x) = \lim_{z \searrow x} f(z)$ majdnem mindenütt. Továbbá az $x \mapsto f(x + iy)$ függvény \mathbb{L}^p -normája tart az $x \mapsto f(x)$ függvény \mathbb{L}^p -normájához, ha $y \downarrow 0$.

18.50. Következmény. Ha $1 \leq p < \infty$, $f \in H_+^p$, akkor

$$\lim_{y \downarrow 0} \int_{\mathbb{R}} |f(x + iy) - f(x)|^p dx = 0.$$

18.51. Tétel: Cauchy-formula. Ha $1 \leq p \leq \infty$, $f \in H_+^p$, akkor $x \in \mathbb{R}$, $y > 0$ esetén

$$f(x + iy) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{R}} \frac{f(t)}{t - (x + iy)} dt \quad \text{és} \quad \int_{\mathbb{R}} \frac{f(t)}{t - (x - iy)} dt = 0$$

Megfordítva, ha $h \in \mathbb{L}^p(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ és $x \in \mathbb{R}$, $y > 0$ esetén

$$\int_{\mathbb{R}} \frac{h(t)}{t - (x - iy)} dt = 0,$$

akkor az

$$f(x + iy) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\mathbb{R}} \frac{h(t)}{t - (x + iy)} dt$$

összefüggéssel definiált függvényre $f \in H_+^p$ és $h(x) = \lim_{z \searrow x} f(z)$ majdnem mindenütt.

18.52. Megjegyzés. A fentiek alapján úgy tekinthető, hogy $H_+^p \subset \mathbb{L}^p(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, ha $1 \leq p \leq \infty$. Megmutatható, hogy zárt altér, így maga is Banach-tér.

18.53. Paley–Wiener-tétel. Egy $f \in \mathbb{L}^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ függvény pontosan akkor van H_+^2 -ben, ha a Fourier-transzformáltja majdnem mindenütt nulla a $[0, +\infty[$ intervallumon kívül.

18.54. Megjegyzés. Ebből már könnyen következik, hogy egy $f \in \mathbb{L}^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ függvény pontosan akkor van H^2 -ben, ha a Fourier-transzformáltja majdnem mindeütt nulla a $] -\infty, 0]$ intervallumon kívül. Mivel a Fourier-transzformáció \mathbb{L}^2 -n belső szorzat tartó, minden $f \in \mathbb{L}^2(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ függvény egyértelműen írható fel egy $f_+ \in H_+^2$ és egy $f_- \in H_-^2$ függvény ortogonális összegeként. A megfelelő $P_+ : \mathbb{L}^2 \rightarrow H_+^2$ és $P_- : \mathbb{L}^2 \rightarrow H_-^2$ ortogonális projekciókat *Riesz-projekciónak* hívjuk.

18.55. Definíció. Legyen $\varphi \in \mathbb{L}^\infty(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ rögzített. Az előző pont jelöléseivel az ehhez a függvényhez tartozó $T_\varphi : H_+^2 \rightarrow H_+^2$ *Töplitz-operátort* a $T_\varphi f = P_+(\varphi f)$ összefüggés, a $H_\varphi : H_+^2 \rightarrow H_-^2$ *Hankel-operátort* pedig a $H_\varphi f = P_-(\varphi f)$ összefüggés definiálja.

18.56. Nehari tétele. Az előző definíció jelöléseivel, ha $\varphi \in \mathbb{L}^\infty(\mathbb{R}; \mathbb{C})$, akkor $\|H_\varphi\| = d(\varphi, H_+^\infty)$, ahol a d távolság $\mathbb{L}^\infty(\mathbb{R}; \mathbb{C})$ -ben értendő.

- 442/13 :

<

19.6. Tétel. 19.4 jelöléseivel, tegyük fel, hogy $L \in \mathcal{C}^m(Q)$ és az $x \in M$

>

19.6. Tétel. 19.4 jelöléseivel, tegyük fel, hogy $L \in \mathcal{C}^{m+1}(Q)$ és az $x \in M$

- 447/-11 :

<

jelölésekkel, az $n = 1, m = 1$ eset vizsgálatára szorítkozunk.

>

jelölésekkel, az $m = 1, L \in \mathcal{C}^2(Q)$ eset vizsgálatára szorítkozunk.

- 447/-3 :

<

hogy a $\frac{d}{dt}(L(x, x') - x' L_{x'}(x, x'))$ függvény nulla, így az elsőrendű

$$L(x, x') - x' L_{x'}(x, x') = c$$

egyenletre jutunk.

>

hogy a $\frac{d}{dt}(L(x, x') - L_{x'}(x, x')x')$ függvény nulla, így az elsőrendű

$$L(x, x') - L_{x'}(x, x')x' = c$$

egyenletre jutunk.

- 448/6 :

<

19.15. Brachiszochoon-probléma. Egy tömegpont egy sima pályán

>

19.15. Brachiszochoon-probléma [10]. Egy tömegpont egy sima pályán

- 448/−8 :

<

differenciálható, akkor az $u^{(m)}(x)$ szimmetrikus m -lineáris forma koordinátái

>

differenciálható, akkor az $u^{(m)}(x)$ szimmetrikus m -lineáris leképezés koordinátái

- 448/−66 :

<

ós, rögzített peremű variációs problémát.. Legyenek n, m, k pozitív termé-

>

ós, rögzített peremű variációs problémát. Legyenek n, m, k pozitív termé-

- 450/9 :

<

$$\int_G \left(\sum_{|\alpha| \leq m} (-1)^\alpha \partial^\alpha (L_{\partial^\alpha u}) \right) v = 0,$$

>

$$\int_G \left(\sum_{|\alpha| \leq m} (-1)^{|\alpha|} \partial^\alpha (L_{\partial^\alpha u}) \right) v = 0,$$

- 452/−3 :

<

$$f_n(x) = \frac{\arctan nx}{\arctan n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

>

$$f_n(x) = \frac{\operatorname{arctg} nx}{\operatorname{arctg} n}, \quad n = 1, 2, \dots$$

19.23.5 Feladat [8]. Tekintsünk egy $\sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$ hatványsort 1 konvergenciasugárral és az egyszerűség kedvéért valós együtthatókkal. Mutassuk meg, hogy az összeg u valós része gradiense hosszának négyzetintegrálja a körlapon $\sum_{n=1}^{\infty} n c_n^2$. Megfelelő együtthatósorozatot választva érjük el, hogy legyen a hatványsor egyenletesen konvergens (így u a Laplace-egyenletre vonatkozó Dirichlet-probléma megoldása), de az integrál értéke végtelen.

- 454/11 :

<

állapot és vezérlési függvények, valamint a t_2 végpont meghatározása.

>

állapot és vezérlési függvények, valamint a t_1 végpont meghatározása.

- 454/−9 :

<

Ha a vezérlési függvény függ x' -től, akkor az $x'(t) = \tilde{w}(t)$ összefüggés

>

Ha az f vagy az L függvény függ x' -től, akkor az $x'(t) = \tilde{w}(t)$ összefüggés

- 455/−9 :

<

Pontrjagin-függvény, akkor létezik $\lambda \geq 0$, $\alpha \in \mathbb{R}^{n^*}$, nem mindkettő nulla és $p : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^{m^*}$ folytonos függvény úgy, hogy

>

Pontrjagin-függvény, akkor létezik $\lambda \geq 0$, $\alpha \in \mathbb{R}^{n^*}$, nem mindkettő nulla és $p : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}^{n^*}$ folytonos függvény úgy, hogy

- 455/−3 :

<

transzverzalizációs feltételek. Létezik továbbá olyan $p_0 : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos

>

transzverzalizációs feltételek. Létezik továbbá olyan $p_0 : [t_0, t_1] \rightarrow \mathbb{R}$ folytonos

- 456/3 :

<

transzverzalizációs feltétel. A λ mindig választható 1-nek vagy 0-nak. Ha $g \equiv 0$, akkor $\lambda = 1$.

>

transzverzalizációs feltétel. A λ mindig választható 1-nek vagy 0-nak. Ha $g_i \equiv 0$, akkor $\alpha_i = 0$ választható.

- 456/−14 :

<

könyvének III. kötete 48. §-ára utalunk.

>

könyvének III. kötete 48. §-ára utalunk.

* **19.33.1. Feladat [10].** Oldjuk meg a következő irányítási feladatot: az egyenesen kell egy tömegpontot eljuttatni -1 -ből 1 -be minimális idő alatt, 1 -nél kisebb abszolút értékű gyorsulással.

* **19.33.2. Feladat [11].** Oldjuk meg a következő irányítási feladatot: az egyenesen x_0 helyen tartózkodó v_0 sebességű tömegpontot kell minimális idő alatt az origóban megállítani. Mutassuk meg, hogy a vezérlés felírható a pillanatnyi hely és sebesség függvényeként. Ábrázoljuk a mozgást a fázistérben.

* **19.33.3. Feladat [12].** Írjuk fel a Pontrjagin-elvből adódó egyenleteket a (függőleges) „sima” Holdraszállás minimális üzemanyagfelhasználással irányítási feladatra az alábbi feltételekkel, a Hold forgását figyelmen kívül hagyva (a gyorsulás 0 és a között lehet):

- (1) sem az űrhajó tömegének, sem a gravitációs mezőnek a változását nem vesszük figyelembe;
- (2) csak az űrhajó tömegének változását vesszük figyelembe;
- (3) mindkettőt figyelembe vesszük.

* **19.33.4. Feladat [11].** Írjuk fel a Pontrjagin-elvből adódó egyenleteket a rakétaindítás feladatára homogén gravitációs térben. A rakétának minimális üzemanyagfelhasználással kell egy adott pontot elérnie, a gyorsulás 0 és a között lehet.

* **19.33.5. Feladat: visszatérés a Holdról [13].** A feladat egy űrhajó lefékezése a Föld légkörében és Föld körüli pályára állítás minimális felmelegedéssel. Legyen x_1 a sebesség, x_2 a hajlási szög a „pillanatnyi vízszinteshez”, x_3 a magasság a felszín felett R fűldsugár egységeiben véve, w a „fékezés”, $\varrho = \varrho_0 e^{-\beta R x_3}$ a levegő sűrűsége. A kezdeti adatok $x_1(t_0) = 10,8$ km/s, $x_2(t_0) = 0,0045\pi$, $x_3(t_0) = 120$ km/R, a céladatok $x_0(t_1) = 8,1$ km/s, $x_2(t_1) = 0$, $x_3(t_1) = 75$ km/R. Az $x'_i = f_i(x_1, x_2, x_3, w)$ vezérlési feltételekben

$$\begin{aligned} f_1 &= -\frac{F\varrho x_1^2}{2}c_1(w) - \frac{g \sin x_2}{(1+x_3)^2}, \\ f_2 &= \frac{F\varrho x_1}{2}c_2(w) + \frac{x_1 \cos x_2}{R(1+x_3)} - \frac{g \cos x_2}{x_1(1+x_3)^2}, \\ f_3 &= \frac{x_1 \sin x_2}{R}; \end{aligned}$$

itt F az űrhajó keresztmetszet/tömege, g a gravitációs gyorsulás, $c_1(w) = 1,174 - 0,9 \cos w$, $c_2(w) = 0,6 \sin w$, a (nem SI egységeiben megadott!) aerodinamikus ellenállás illetve emelő erő. A felmelegedést kívánjuk minimalizálni, a közelítő gyakorlati formula:

$$\int_{t_0}^{t_1} x_1^3 \sqrt{\varrho} \rightarrow \min.$$

Az űrhajósokról feltesszük, hogy bármit kibírnak, a Föld nyugvó gömb, és a Föld középpontján átmenő síkban repülünk. Írjuk fel a Pontrjagin-elvből adódó egyenleteket, határozzuk meg a vezérlést, és visszaírva az egyenletekbe, határozzuk meg a differenciálegyenleteket és a peremfeltételeket. (Az adott numerikus esetben a magasság lemegy kb. 50 km-ig, majd nő, a sebesség kezdetben kicsit nő, majd csökken, $t_1 = 224,9$ s.)

- 457/9 :

<

$$p' = -H_x = \lambda L_x, \quad p(t_1) = -\alpha, \quad \tilde{p}' = -H_{\tilde{x}} = 0, \quad \tilde{p}(t_1) = -\tilde{\alpha},$$

>

$$p' = -H_x = \lambda L_x, \quad p(t_1) = -\alpha, \quad \tilde{p}' = -H_{\tilde{x}} = \lambda L_{\tilde{x}}, \quad \tilde{p}(t_1) = -\tilde{\alpha},$$

- 457/-4.. - 1 :

<

$$L_x(t, x(t), x'(t)) \quad \text{és} \quad L_{x'}(t, x(t), x'(t))x'(t) - L(t, x(t), x'(t))$$

bal és jobboldali határértéke megegyezik, ezek a *Weierstrass–Erdmann-féle törési feltételek*. Figyeljük meg a Pontrjagin-függvény szoros kapcsolatát a mechanikában használatos Hamilton-függvénnyel.

>

$$L_{x'}(t, x(t), x'(t)) \quad \text{illetve} \quad L_{x'}(t, x(t), x'(t))x'(t) - L(t, x(t), x'(t))$$

bal és jobb oldali határértéke megegyezik, ezek a *Weierstrass–Erdmann-féle törési feltételek*. Figyeljük meg a Pontrjagin-függvény szoros kapcsolatát a mechanikában használatos Hamilton-függvénnyel.

* **19.34.1. Feladat** [11]. Alkalmazzuk a Pontrjagin-féle maximumelvet a szakaszonként folytonosan differenciálható $x : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvényekre vonatkozó

$$\int_a^b L(t, x(t), x'(t)) dt \rightarrow \min, \quad x(a) = x_0, \quad x(b) = x_1$$

$$\int_a^b f(t, x(t), x'(t)) dt = c$$

mellékfeltételes problémára, és vezessük le a megfelelő Euler–Lagrange-egyenleteket.

* **19.34.2. Feladat** [11]. Határozzuk meg két végén felfüggesztett homogén súlyos lánc alakját (láncgörbe).

- 458/−1 :

<

közelítés javítható. Például a Newton-módszer alkalmazásával kaphatunk jobb közelítéseket adó $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots$ paramétersorozatot.

>

közelítés javítható, és kaphatunk jobb közelítéseket adó $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots$ paramétersorozatot.

* **19.36. Diszkrét irányítási feladat.** Tipikus esetként tekintsünk egy gyártási folyamatot, amelyben egy x_1 kezdeti állapotból kiindulva, ha egy w_1 vezérlést választottunk, az $x_2 = \varphi_1(x_1, w_1)$ állapotba jutunk, ahol $x_1 \in \mathbb{R}^N$, $w_1 \in W_1 \subset \mathbb{R}^M$, és közben $k_1(x_1, w_1)$ költség lép fel, majd ha egy w_2 vezérlést választunk, az $x_3 = \varphi_2(x_2, w_2)$ állapotba jutunk, ahol $x_2 \in \mathbb{R}^N$, $w_2 \in W_2 \subset \mathbb{R}^M$, és közben $k_2(x_2, w_2)$ költség lép fel stb. (Például lehet x_j összesen N kémiai anyag eloszlása a j -edik lépés előtt egy vegyipari gyártási folyamatban.) A φ_j és k_j függvények adottak, és álljon

a gyártás összesen n lépésből; az utolsó költségbe annak a költségét is beleértjük, hogy a végtermék elmarad valamely „ideális” végterméktől. Legyen

$$K_r(x_r, w_r, w_{r+1}, \dots, w_n) := \sum_{j=r}^n k_j(x_j, w_j)$$

az utolsó $n - r + 1$ lépés költsége, és

$$(r, x_r) \mapsto S_r(x_r) := \inf_{w_r, \dots, w_n} K_r(x_r, w_r, w_{r+1}, \dots, w_n), \quad S_{n+1}(x_{n+1}) \equiv 0$$

az úgynevezett *Bellman-függvény*.

* **19.37. Tétel.** Az előző pont jelöléseivel,

(1) a Bellman-függvényre

$$S_r(x_r) = \inf_{w_r \in W_r} k_r(x_r, w_r) + S_{r+1}(\varphi_r(x_r, w_r)), \quad \text{ha } r = 1, \dots, n;$$

(2) az x_r és $w_j \in W_j$, $j = r, \dots, n$ változókra a $x_{j+1} = \varphi_j(x_j, w_j)$, $j = r, \dots, n$ értékekkel pontosan akkor teljesül, hogy

$$S_r(x_r) = K_r(x_r, w_r, w_{r+1}, \dots, w_n),$$

ha

$$S_j(x_j) = k_j(x_j, w_j) + S_{j+1}(x_{j+1}), \quad j = r, \dots, n.$$

Bizonyítás. (1)-hez nyilván

$$K_r(x_r, w_r, w_{r+1}, \dots, w_n) = k_r(x_r, w_r) + K_{r+1}(\varphi_r(x_r, w_r), w_{r+1}, \dots, w_n)$$

teljesül a költségekre. Mivel nyilván

$$\inf_{w_r, \dots, w_n} K_r(x_r, w_r, w_{r+1}, \dots, w_n) = \inf_{w_r} \inf_{w_{r+1}, \dots, w_n} K_r(x_r, w_r, w_{r+1}, \dots, w_n),$$

kapjuk (1)-et.

(2)-höz tetszőleges $w_j \in W_j$, $j = r, \dots, n$ -re a megfelelő $x_{j+1} = \varphi_j(x_j, w_j)$, $j = r, \dots, n$ értékekkel

$$S_r(x_r) \leq k_r(x_r, w_r) + S_{r+1}(x_{r+1}) \leq \dots \leq K_r(x_r, w_r, w_{r+1}, \dots, w_n).$$

Ha az adott értékekre egyenlőség áll, akkor mindenütt egyenlőségnek kell állnia, így kapjuk (2)-t.

* **19.38. Következmény: Bellman-féle optimum elv.** A következő két állítás ekvivalens:

(1) az x_1 és $w_j \in W_j$, $j = 1, \dots, n$ változókra az $x_{j+1} = \varphi_j(x_j, w_j)$, $j = 1, \dots, n$ értékekkel

$$S_1(x_1) = K_1(x_1, w_1, w_2, \dots, w_n);$$

(2) az x_1 és $w_j \in W_j$, $j = 1, \dots, n$ változókra az $x_{j+1} = \varphi_j(x_j, w_j)$, $j = 1, \dots, n$ értékekkel

$$S_m(x_m) = K_m(x_m, w_m, w_{m+1}, \dots, w_n)$$

teljesül, ha $m = 1, 2, \dots, n$.

* **19.39. Bellman módszere.** Meghatározva az optimális vezérléseket az

$$S_j(x_j) = k_j(x_j, w_j) + S_{j+1}(x_{j+1})$$

egyenletekből $j = n, n-1, \dots, 1$ -re x_j függvényében, kapjuk az optimális vezérlést.

A következő célunk a Lagrange-elv általánosítása Banach-terekre, egyenlőtlenség típusú feltételeket is megengedve. Az eszköz a Dubovickij–Miljutyin-elmélet lesz. A Lagrange-elv általános alakja lehetővé teszi a Pontrjagin-féle maximumelv bizonyítását is. Részben Páles [102] jegyzetét, részben Zeidler [147] könyvét követjük.

* **19.40. Konvex függvények.** Egy X valós normált tér egy részhalmazát $[-\infty, +\infty]$ -be képező F függvényt konvexnek nevezünk, ha $0 < \alpha < 1$ esetén

$$F(\alpha x + (1 - \alpha)y) \leq \alpha F(x) + (1 - \alpha)F(y),$$

valahányszor a jobb oldal értelmezve van. Minden ilyen függvényt kiterjeszthetünk az egész X -en konvex függvénné, ha az eredeti értelmezési tartományán kívül $+\infty$ -nek definiáljuk. Nyilván ha F nem vette fel a $+\infty$ értéket, akkor visszakaphatjuk a kiterjesztésből. Általánosabban, azon pontok halmaza, ahol $F(x) < +\infty$, egy konvex halmaz. Ha ezen a halmazon valahol $F(x) = -\infty$, akkor az egész halmazon.

* **19.41. Állítás.** Egy X normált teret $[-\infty, +\infty]$ -be képező F függvényre az alábbiak ekvivalensek:

(1) F folytonos x -ben;

(2) F felülről korlátos az x egy környezetében.

Továbbá ha egy U nyílt halmazon F véges és valamely pontjában folytonos, akkor az egész U -n folytonos.

Bizonyítás. Nyilván (1)-ből következik (2). A megfordításhoz feltehetjük, hogy $x = 0$, $F(x) = 0$. Tegyük fel, hogy $\mathbb{U}_r(0)$ -n F -nek felső korlátja M . Ha $0 < \varepsilon < 1$, akkor

$$y = (1 - \varepsilon) \cdot 0 + \varepsilon \frac{y}{\varepsilon}, \quad 0 = \frac{1}{1 + \varepsilon} y + \frac{\varepsilon}{1 + \varepsilon} \frac{-y}{\varepsilon},$$

így ha $y \in \mathbb{U}_{\varepsilon r}(0)$, akkor

$$F(y) \leq (1 - \varepsilon)F(0) + \varepsilon F(y/\varepsilon) \leq \varepsilon M,$$

és ha $-y \in \mathbb{U}_{\varepsilon r}(0)$, akkor

$$F(y) \geq (1 + \varepsilon)F(0) - \varepsilon F(-y/\varepsilon) \geq -\varepsilon M.$$

A második állítás bizonyításához feltehetjük, hogy $0 \in U$ és F a 0 -ban folytonos. Az F felülről korlátos valamilyen M -mel valamilyen $\mathbb{U}_r(0)$ -n. Legyen $x \in U$ és válasszunk olyan $\varrho > 1$ -et, amelyre $\varrho x \in U$. A $h(y) = (1 - 1/\varrho)y + (1/\varrho)(\varrho x)$ összefüggéssel definiált h homeomorfizmusa X -nek önmagára, $h(0) = x$, így h a nulla $\mathbb{U}_r(0)$ környezetét x egy $h(\mathbb{U}_r(0))$ környezetére képezi. Mivel

$$F(h(y)) \leq (1 - 1/\varrho)F(y) + \frac{1}{\varrho}F(\varrho x) \leq (1 - 1/\varrho)M + \frac{1}{\varrho}F(\varrho x),$$

és mivel (2)-ből következik (1), F folytonos x -ben. \square

* **19.42. Következmény.** Véges dimenziós normált tér nyílt konvex részhalmaza valós értékű konvex függvény folytonos.

Bizonyítás. Legyen F az eredeti U értelmezési tartományon kívül $+\infty$, és legyen $x \in U$. Feltehetjük, hogy $x = 0$. Válasszunk egy $S \subset U$ szimplexet, amely belsejében tartalmazza a 0 -t, például a szokásos bázisvektorok és összegük ellentettje konvex burkának ε -szorosát egy alkalmas $\varepsilon > 0$ -ra. Mivel F korlátos S -en, folytonos a belsejében, így 0 -ban is. \square

* **19.43. Definíció.** Egy X valós normált tér (vagy akár lineáris tér) egy K részhalmazát kúpnek nevezzük, ha $u \in K$, $\alpha > 0$ esetén $\alpha u \in K$.

A $K \subset X$ kúp duális kúpjá a

$$K^+ = \{f \in X^* : f(u) \geq 0, \text{ ha } u \in K\}$$

halmaz. Nyilvánvaló, hogy K^+ konvex, zárt és nem üres kúp X^* -ban.

Legyen $U \subset X$ nyílt. A $h_0 \in X$ vektort az $F : U \rightarrow \mathbb{R}$ függvény $u_0 \in U$ -beli csökkenési irányának nevezzük, ha van olyan $\varepsilon > 0$ és V környezete h_0 -nak, hogy $0 < t < \varepsilon$, $h \in V$ esetén

$$\frac{F(u_0 + th) - F(u_0)}{t} < 0.$$

Ha $N \subset X$, a $h_0 \in X$ vektort az $u_0 \in X$ -ben N -re nézve megengedett iránynak nevezzük, ha van olyan $\varepsilon > 0$ és V környezete h_0 -nak, hogy $0 < t < \varepsilon$, $h \in V$ esetén $u_0 + th \in N$.

Ha $N \subset X$, a $h \in X$ vektort az $u_0 \in X$ -ben N -re nézve félérintő iránynak nevezzük, ha van olyan $\varepsilon > 0$ és $t \mapsto u(t)$ görbe, hogy $u(t) = u_0 + th + \omega(t) \in N$, ha $0 < t < \varepsilon$, ahol $\lim_{t \downarrow 0} \omega(t)/t = 0$.

Világos, hogy a megengedett irányok egyben félérintő irányok is, a félérintő irányok, a megengedett irányok és a csökkenési irányok is kúpot alkotnak, és a két utóbbi nyílt.

A Dubovickij–Miljutyin-elmélet alap gondolata egyszerű: ha F -nek u_0 -ban minimuma van N -ben, akkor nem lehet olyan csökkenési irány, amely megengedett irány. Pontosabban, az alábbi lemma teljesül.

* **19.44. Dubovickij–Miljutyin-lemma.** Legyen X valós normált tér, $U \subset X$ nyílt és $F_0 : U \rightarrow \mathbb{R}$ tetszőleges függvény, $N_1, \dots, N_n, N_{n+1} \subset X$ tetszőleges halmazok. Az

$$F_0(u) \rightarrow \min, \quad u \in \bigcap_{j=1}^{n+1} N_j$$

feltételes minimumfeladat u_0 megoldására

$$\bigcap_{i=0}^{n+1} K_i = \emptyset,$$

ahol K_0 az F_0 függvény u_0 -beli csökkenési irányainak kúpja, K_j az N_j halmaz u_0 -beli megengedett irányainak kúpja, K_{n+1} pedig az N_{n+1} halmaz u_0 -beli félérintő irányainak kúpja.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy a metszet nem üres, h_0 egy eleme. Ekkor létezik egy V környezete h_0 -nak, $\varepsilon > 0$, és $\omega : [0, \varepsilon[\rightarrow X$, hogy

$$F_0(u_0 + th) < F_0(u_0), \quad u_0 + th \in \bigcap_{j=1}^n N_j, \quad u_0 + th_0 + \omega(t) \in N_{n+1},$$

ha $0 < t < \varepsilon$, $h \in V$, továbbá $\lim_{t \downarrow 0} \omega(t)/t = 0$. Csökkentve ε -t, feltehetjük, hogy $h(t) = h_0 + \omega(t)/t \in V$, ha $0 < t < \varepsilon$. Ekkor $u_0 + th(t) \in N_j$, ha $j = 1, \dots, n, n+1$ és $F_0(u_0 + th(t)) < F_0(u_0)$, ha $0 < t < \varepsilon$, ami ellentmondás. \square

* **19.45. Dubovickij–Miljutyin elválasztási lemma.** Legyen X valós normált tér, $K_0, \dots, K_n, K_{n+1} \subset X$, $n \geq 0$ nem üres konvex kúpok, és tegyük fel, hogy K_0, \dots, K_n nyíltak. Ekkor

$$\bigcap_{i=0}^{n+1} K_i = \emptyset$$

pontosan akkor teljesül, ha léteznek nem mind nulla $f_i \in K_i^+$ funkcionálok, hogy $f_0 + \dots + f_n + f_{n+1} = 0$.

Bizonyítás. Az elégségeség bizonyításához vegyük észre, hogy $f_0 = 0, \dots, f_n = 0$ nem lehetséges, mert akkor minden f_j nulla lenne. Legyen $f_j \neq 0$, $f_j(v) \neq 0$. Ha u a metszet egy eleme lenne, akkor $f_j(u + \lambda v) \geq 0$ lenne, ha $|\lambda|$ elég kicsi, ahonnan $f_j(u) > 0$ következne. Mivel $f_i \in K_i^+$, minden f_i nemnegatív a metszeten, nem lehet az összegük nulla u -ban.

A szükségeség bizonyításához legyen $A = K_0 \times \dots \times K_n$ és

$$B = \{(u, u, \dots, u) \in X^{n+1} : u \in K_{n+1}\}.$$

Az A és B diszjunkt nem üres konvex kúpok X^{n+1} -ben, A nyílt. A Hahn–Banach-tétel elválasztási alakja szerint van olyan $f \neq 0$ és $c \in \mathbb{R}$, hogy $f(b) \leq c \leq f(a)$, ha $a \in A$, $b \in B$. Mivel A és B kúpok, $\lambda > 0$ esetén $\lambda f(b) \leq c \leq \lambda f(a)$ is teljesül, ahonnan $\lambda \downarrow 0$ határátmenettel $c = 0$. Legyen $f_0(u) = f(u, 0, \dots, 0), \dots, f_n(u) = (0, \dots, 0, u)$ és $f_{n+1}(u) = -f(u, u, \dots, u)$. Nyilván $f_{n+1}(u) \geq 0$, ha $u \in K_{n+1}$. Mivel f nem nulla, és $f(u_0, u_1, \dots, u_n) = f_0(u_0) + f_1(u_1) + \dots + f_n(u_n)$, a jobb oldalon szereplő funkcionálok valamelyike nem nulla. Ha $u_i \in K_i$ rögzített, akkor

$$(\lambda u_0, \dots, \lambda u_{j-1}, u_j, \lambda u_{j+1}, \dots, \lambda u_n) \in A,$$

így

$$\lambda f_0(u_0) + \dots + \lambda f_{j-1}(u_{j-1}) + f_j(u_j) + \lambda f_{j+1}(u_{j+1}) + \dots + \lambda f_n(u_n) \geq 0,$$

ahonnan $\lambda \downarrow 0$ határátmenettel $f_j(u_j) \geq 0$, ha $u_j \in K_j$. \square

* **19.46. Dubovickij–Miljutyin-tétel.** A Dubovickij–Miljutyin-lemma jelöléseivel, az ottani feltételes minimumfeladatot kívánjuk vizsgálni. Tegyük fel, hogy $n \geq 0$, $N_j^\circ \neq \emptyset$, ha $j = 1, \dots, n$, és K_0, \dots, K_{n+1} konvex nem üres halmazok. Ekkor

(1) Szükséges feltétel: ha u_0 -ban feltételes minimum van, akkor léteznek $f_i \in K_i^+$, $i = 0, \dots, n+1$ nem mind nulla funkcionálok, hogy $f_0 + \dots + f_{n+1} = 0$.

(2) Nemelfajulás: ha

$$\bigcap_{i \neq k} K_i \neq \emptyset,$$

akkor $f_k \neq 0$.

(3) Elégséges feltétel: az (1)-ben szereplő szükséges feltétel elégséges is, ha még teljesül az is, hogy $F_0 : X \rightarrow \mathbb{R}$ konvex és folytonos, továbbá teljesül a Slater-feltétel: van olyan h , amelyre $h \in N_j^\circ$, $j = 1, \dots, n$ és $h \in N_{n+1}$.

A szükséges feltétel nyilván lokális feltételes minimum esetén is fennáll.

Bizonyítás. A szükséges feltétel következik a Dubovickij–Miljutyin-lemmából és Dubovickij–Miljutyin elválasztási lemmából.

Ha $f_k = 0$ és $\bigcap_{i \neq k} K_i \neq \emptyset$ lenne, akkor $f_0 + \dots + f_{n+1} = 0$ ellentmondana a Dubovickij–Miljutyin elválasztási lemmának.

Az elégségeség bizonyításához tegyük fel indirekt, hogy van olyan u_1 , amire $F_0(u_1) < F_0(u_0)$ és $u_1 \in N_j$, $j = 1, \dots, n+1$. Legyen $u = tu_1 + (1-t)h$, ha $0 < t < 1$. A Slater-feltétel szerint $u \in N_j^\circ$ és $u \in N_{n+1}$. A K_i definíciója szerint $u - u_0 \in K_i$, ha $i \geq 1$. Ha megmutatjuk, hogy $u - u_0 \in K_0$, akkor az a Dubovickij–Miljutyin elválasztási lemma miatt ellentmond (1)-nek. Az F_0 folytonossága miatt találhatunk olyan kis $t > 0$ -t, hogy $F_0(u) < F_0(u_0)$. Ha $0 < \varepsilon < 1$, akkor

$$F_0(u_0 + \varepsilon(u - u_0)) \leq \varepsilon F_0(u) + (1 - \varepsilon)F_0(u_0),$$

ahonnan

$$\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \frac{F_0(u_0 + \varepsilon(u - u_0)) - F_0(u_0)}{\varepsilon} \leq F_0(u) - F_0(u_0) < 0,$$

azaz $u - u_0 \in K_0$; a határérték létezése F_0 konvexitásából következik. \square

* **19.47. Definíció.** Legyen X valós vektortér, $U \subset X$ nyílt, $u_0 \in U$ és $F : U \rightarrow \mathbb{R}$. Az F csökkenési irányait az

$$\bar{\delta}F(u_0; h_0) = \limsup_{t \downarrow 0, h \rightarrow h_0} \frac{F(u_0 + th) - F(u_0)}{t}$$

mennyiség segítségével kívánjuk vizsgálni. A \limsup úgy értendő, hogy mindazon α bővített valós számok halmazának a pontos alsó korlátja, amelyekhez van olyan $\varepsilon > 0$ és V környezete h_0 -nak, hogy $0 < t < \varepsilon$ és $h \in V$ esetén

$$\frac{F(u_0 + th) - F(u_0)}{t} \leq \alpha.$$

Könnyű látni, hogy a $h \mapsto \bar{\delta}F(u_0; h)$ leképezés pozitív homogén és felülről félig folytonos. A könnyebben kezelhető

$$\bar{\delta}F(u_0; h_0) = \limsup_{t \downarrow 0} \frac{F(u_0 + th_0) - F(u_0)}{t}$$

mennyiséget is használni fogjuk, ami megegyezik az irány menti deriválttal, ha az létezik. Nyilván

$$\bar{\delta}F(u_0; h_0) \leq \bar{\delta}F(u_0; h_0),$$

ha $h_0 \in X$. A két mennyiség gyakran megegyezik.

Ha $h \mapsto \bar{\delta}F(u_0; h)$ konvex és van olyan $h_1 \in X$, hogy $\bar{\delta}F(u_0; h_1) < 0$, akkor a rövidség kedvéért azt fogjuk mondani, hogy F reguláris az u_0 -ban.

* **19.48. Tétel.** Legyen X valós normált tér, $U \subset X$ konvex nyílt halmaz, $u_0 \in U$ és $F : U \rightarrow \mathbb{R}$. Ha az

- (1) F folytonos konvex függvény;
- (2) F Lipschitz-függvény;
- (3) F differenciálható u_0 -ban

feltételekből valamelyik teljesül, akkor

$$\bar{\delta}F(u_0; h_0) = \bar{\delta}F(u_0; h_0)$$

minden $h_0 \in X$ -re.

Bizonyítás. Csak a \leq -t kell bizonyítanunk. Az (1) esetben legyen

$$\alpha > \limsup_{t \downarrow 0} \frac{F(u_0 + th_0) - F(u_0)}{t}$$

tetszőleges. Ekkor van olyan $\varepsilon > 0$, hogy

$$\frac{F(u_0 + \varepsilon h_0) - F(u_0)}{\varepsilon} < \alpha.$$

Ha $0 < t < \varepsilon$, akkor

$$F(u_0 + th) \leq F((1 - t/\varepsilon)u_0 + (t/\varepsilon)(u_0 + \varepsilon h)) \leq (1 - t/\varepsilon)F(u_0) + (t/\varepsilon)F(u_0 + \varepsilon h),$$

ezért

$$\begin{aligned} \bar{\delta}F(u_0, h_0) &\leq \limsup_{t \downarrow 0, h \rightarrow h_0} \frac{(1 - t/\varepsilon)F(u_0) + (t/\varepsilon)F(u_0 + \varepsilon h)}{t} \\ &= \limsup_{t \downarrow 0, h \rightarrow h_0} \frac{F(u_0 + \varepsilon h) - F(u_0)}{\varepsilon} = \limsup_{h \rightarrow h_0} \frac{F(u_0 + \varepsilon h) - F(u_0)}{\varepsilon} < \alpha; \end{aligned}$$

az utolsó lépésben a folytonosságot használtuk.

A (2) esetben, ha L egy Lipschitz-konstans, akkor

$$F(u_0 + th) \leq F(u_0 + th_0) + tL\|h - h_0\|,$$

ha t elég kicsi. Így

$$\begin{aligned} \bar{\delta}F(u_0, h_0) &\leq \limsup_{t \downarrow 0, h \rightarrow h_0} \left(\frac{F(u_0 + th_0) - F(u_0)}{t} + L\|h - h_0\| \right) \\ &\leq \limsup_{t \downarrow 0} \frac{F(u_0 + th_0) - F(u_0)}{t} + \limsup_{h \rightarrow h_0} L\|h - h_0\| \\ &= \limsup_{t \downarrow 0} \frac{F(u_0 + th_0) - F(u_0)}{t}. \end{aligned}$$

Végül a (3) esetben, ha $\omega(h) = F(u_0 + h) - F(u_0) - F'(u_0)h$, akkor

$$\begin{aligned} \bar{\delta}F(u_0, h_0) &\leq \limsup_{t \downarrow 0, h \rightarrow h_0} \frac{F'(u_0)th + \|\omega(th)\|}{t} \\ &\leq \limsup_{h \rightarrow h_0} F'(u_0)h + \limsup_{t \downarrow 0, h \rightarrow h_0} \frac{\|\omega(th)\|}{\|th\|} \|h\| \\ &= F'(u_0)h_0. \quad \square \end{aligned}$$

* **19.49. Következmény.** Ha F konvex és folytonos u_0 -ban, akkor $h \mapsto \bar{\delta}F(u_0; h)$ konvex és

$$\bar{\delta}F(u_0; h) = \lim_{t \downarrow 0} \frac{F(u_0 + th) - F(u_0)}{t}$$

véges.

Bizonyítás. Mivel F mindenütt folytonos, így $\bar{\delta}F(u_0; h) = \bar{\delta}F(u_0; h)$, és mivel

$$t \mapsto \frac{F(u_0 + th) - F(u_0)}{t}$$

monoton növekedő függvénye t -nek, létezik és véges a jobb oldali határérték, és nyilván megegyezik $\bar{\delta}F(u_0; h)$ -val. Ha $h_1, h_2 \in X$ tetszőleges, akkor

$$F\left(u_0 + t(\alpha h_1 + (1 - \alpha)h_2)\right) \leq \alpha F(u_0 + th_1) + (1 - \alpha)F(u_0 + th_2).$$

Innen

$$\bar{\delta}F(u_0; \alpha h_1 + (1 - \alpha)h_2) \leq \alpha \bar{\delta}F(u_0; h_1) + (1 - \alpha)\bar{\delta}F(u_0; h_2). \quad \square$$

* **19.50. Tétel.** Legyen X valós normált tér, $U \subset X$ nyílt, $u_0 \in U$ és $F : U \rightarrow \mathbb{R}$. Ha h_0 az F csökkenési iránya u_0 -ban, akkor $\bar{\delta}F(u_0; h_0) \leq 0$. Ha $\bar{\delta}F(u_0; h_0) < 0$ akkor h_0 az F csökkenési iránya u_0 -ban. Ha F reguláris u_0 -ban, akkor az utóbbi feltétel szükséges és elégséges ahhoz, hogy h_0 csökkenési irány legyen, és a csökkenési irányok halmaza nem üres konvex kúp.

Bizonyítás. Az első két állítás nyilvánvaló a definícióból. Az utolsó állítás bizonyításához legyen h_0 csökkenési irány. Mivel h_0 belső pontja a csökkenési irányok kúpjának, van olyan $0 < t < 1$, hogy $h' = h_0 - th_1/(1 - t)$ is csökkenési irány, így $\bar{\delta}F(u_0; h') \leq 0$. A konvexitást alkalmazva

$$\bar{\delta}F(u_0; h_0) = \bar{\delta}F(u_0, th_1 + (1 - t)h') \leq t\bar{\delta}F(u_0; h_1) + (1 - t)\bar{\delta}F(u_0; h') < 0.$$

Ezek szerint a csökkenési irányok kúpja a $\{h : \bar{\delta}F(u_0; h) < 0\}$ nívóhalmaz, ami mint konvex függvény nívóhalmaza, konvex. \square

* **19.51. Tétel.** Legyen X valós normált tér, $U \subset X$ nyílt, $u_0 \in U$, $F : U \rightarrow \mathbb{R}$ és

$$N = \{u \in U : F(u) \leq F(u_0)\}.$$

Ha h_0 az N megengedett iránya u_0 -ban, akkor $\bar{\delta}F(u_0; h_0) \leq 0$. Ha $\bar{\delta}F(u_0; h_0) < 0$ akkor h_0 az N megengedett iránya u_0 -ban. Ha F reguláris u_0 -ban, akkor az utóbbi feltétel szükséges és elégséges ahhoz, hogy h_0 megengedett irány legyen, és a megengedett irányok halmaza nem üres konvex kúp.

Bizonyítás. Hasonlóan bizonyítható, mint az előző tétel. \square

* **19.52. Lemma: korlátos jobbinverz létezése.** Legyenek X és Y Banach-terek és A egy X -et Y -ra képező korlátos lineáris operátor. Ekkor létezik olyan $J : Y \rightarrow X$ (nem feltétlenül lineáris és nem is feltétlenül folytonos) leképezés és K valós konstans, hogy $A(J(y)) = y$ és $\|J(y)\| \leq K\|y\|$ minden $y \in Y$ -ra.

Bizonyítás. Mivel A folytonos, $\ker(A)$ zárt, így — mint könnyen látható — az $\tilde{X} = X/\ker(A)$ faktortér Banach-tér az $\|\tilde{x}\| = \inf_{x \in \tilde{x}} \|x\|$ normával és az $\tilde{A}\tilde{x} = Ax$, ha $x \in \tilde{x}$ összefüggéssel értelmezett operátor lineáris és folytonos leképezése \tilde{X} -nek Y -ra, amely korlátos $\|A\|$ -val. Alkalmazva Banach-nak a korlátos inverzre vonatkozó tételét, \tilde{A} inverze, a $\tilde{J} : Y \rightarrow \tilde{X}$ operátor korlátos. Minden $y \in Y$ esetén válasszunk egy $J(x)$ -szel jelölt elemet a $\tilde{J}y$ osztályból úgy, hogy $\|J(x)\| \leq 2\|\tilde{J}y\|$ teljesüljön. \square

* **19.53. Következmény: zárt képtér tétel.** Legyenek X, Y és Z Banach-terek és $A : X \rightarrow Y, B : X \rightarrow Z$ korlátos lineáris operátorok. Tegyük fel, hogy $\text{rng}(A)$ és $B(\ker(A))$ zárt alterek. Ekkor a $Cx = (Ax, Bx)$ összefüggéssel definiált leképezés $Y \times Z$ -beli képtere is zárt.

Bizonyítás. Az $A : X \rightarrow \text{rng}(A)$ leképezésnek létezik egy J jobbinverze, amelyre $\|J(y)\| \leq K\|y\|$ teljesül. Ha (y, z) a $\text{rng}(C)$ lezártjában van, akkor van olyan x_n sorozat, hogy $(Ax_n, Bx_n) \rightarrow (y, z)$. Mivel $y \in \text{rng}(A)$, értelmezhetjük az $x'_n = J(Ax_n - y)$ sorozatot, amelyre $A(x_n - x'_n) = y$ és $\|x'_n\| \leq K\|Ax_n - y\| \rightarrow 0$. Innen $Bx'_n \rightarrow 0$ és így $B(x_n - x'_n) \rightarrow z$. Tehát z benne van a $\{Bx : x \in X, Ax = y\}$ halmaz lezártjában, ami a $B(\ker(A))$ zárt altér eltölti, tehát zárt. Ezért van olyan $x \in X$, amelyre $Ax = y$ és $Bx = z$. \square

* **19.54. Lusztornyik tétele.** Legyenek X és Y Banach-terek, $U \subset X$ nyílt halmaz és $F : U \rightarrow Y$ folytonosan differenciálható függvény. Legyen $u_0 \in U$ és tegyük fel, hogy $F'(u_0)$ értékészlete Y . Ekkor létezik u_0 -nak egy U_0 környezete, egy K konstans és egy $\varphi : U_0 \rightarrow X$ leképezés, hogy $u \in U_0$ esetén

$$F(u + \varphi(u)) = F(u_0) \quad \text{és} \quad \|\varphi(u)\| \leq K\|F(u) - F(u_0)\|.$$

A tételt és az első következményét elolvasva az az érzésünk támadhat, hogy az implicit függvény tétel segítségével ennél többet is be tudunk bizonyítani. A gondot az okozza, hogy a $\ker(F'(u_0))$ zárt altér nem feltétlenül „hasítja” az X teret, azaz nem biztos, hogy van hozzá olyan zárt altér, hogy X a kettő direkt összege.

Bizonyítás. A módosított Newton-módszer alkalmazásával történik. Az általánosság megszorítása nélkül feltehetjük, hogy $u_0 = 0$ és $F(u_0) = 0$. A lemma szerint az $A = F'(0)$ operátorhoz tartozó jobbinverz legyen J , és $K > 0$ a megfelelő konstans. A folytonos differenciálhatóság és a középérték-egyenlőtlenség segítségével válasszunk olyan $\varepsilon > 0$ -t, hogy U tartalmazza az ε -nál kisebb normájú elemeket és teljesüljön

$$(1) \quad \|F(u') - F(u'') - F'(0)(u' - u'')\| \leq \frac{1}{2K}\|u' - u''\|,$$

ha $\|u'\| < \varepsilon$ és $\|u''\| < \varepsilon$. Válasszunk olyan $\delta > 0$ -t, hogy $\|u\| < \delta$ esetén fennálljon $\|u\| + K\|F(u)\| < \varepsilon/2$. Ha $\|x\| < \delta$, akkor legyen $x_0 = x$ és

$$(2) \quad x_{n+1} = x_n - J(F(x_n)), \quad \text{ha} \quad n \geq 0.$$

Indukcióval megmutatjuk, hogy $\|x_n\| < \varepsilon$, ha $n \geq 0$. Ez $n = 0$ -ra nyilvánvaló, és

$$\|x_1 - x_0\| \leq \|J(F(x_0))\| \leq K\|F(x_0)\|,$$

ahonnan $\|x_1\| \leq \|x_0\| + \|x_1 - x_0\| < \varepsilon/2$. Indukcióval, tegyük fel, hogy $\|x_i\| < \varepsilon$ teljesül, ha $i = 0, 1, \dots, k$. A (2) definíciót átrendezve és mindkét oldalra alkalmazva $F'(0)$ -t,

$$(3) \quad F'(0)(x_{i+1} - x_i) + F(x_i) = 0,$$

ha $i = 0, 1, \dots, k$. Ebből, felhasználva (1)-et

$$(4) \quad \begin{aligned} \|x_{i+1} - x_i\| &= \|J(F(x_i))\| \leq K\|F(x_i)\| \\ &= K\|F(x_i) - F(x_{i-1}) - F'(0)(x_i - x_{i-1})\| \\ &\leq \frac{1}{2}\|x_i - x_{i-1}\|. \end{aligned}$$

Innen azonnal adódik, hogy

$$(5) \quad \|x_{i+1} - x_i\| \leq \frac{\|x_1 - x_0\|}{2^i} < \frac{\varepsilon}{2^{i+1}},$$

ha $i = 0, 1, \dots, k$. A háromszög-egyenlőtlenség felhasználásával

$$\begin{aligned} \|x_{k+1}\| &\leq \|x_{k+1} - x_k + x_k - \dots - x_1 + x_1\| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} \left(\frac{1}{2^k} + \frac{1}{2^{k-1}} + \dots + \frac{1}{2} + 1 \right) < \varepsilon, \end{aligned}$$

amivel az indukciót befejeztük.

A (4) és (5) egyenlőtlenségek ismételt felhasználásával azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} \|x_{n+m} - x_n\| &\leq \left(\frac{1}{2^{m-1}} + \dots + 1 \right) \|x_{n+1} - x_n\| \\ &< 2\|x_{n+1} - x_n\| \leq \frac{\|x_1 - x_0\|}{2^{n-1}}. \end{aligned}$$

A sorozat tehát Cauchy-sorozat, legyen a határértéke $\psi(x)$. Megmutatjuk, hogy a $\varphi(x) = \psi(x) - x$ függvénnyel teljesül a tétel állítása K helyett $2K$ -val. Alkalmazva az (5) egyenlőtlenséget

$$\|x_n - x\| < \left(\frac{1}{2^{n-1}} + \dots + \frac{1}{2} + 1 \right) \|x_1 - x\| < 2\|x_1 - x\|$$

adódik, amiből $n \rightarrow \infty$ esetén azt kapjuk, hogy

$$\|\varphi(x)\| = \|\psi(x) - x\| \leq 2\|x_1 - x\| = \|J(F(x))\| \leq 2K\|F(x)\|,$$

ahonnan

$$\|\psi(x)\| \leq \|x\| + 2\|x_1 - x\| \leq 2\left(\|x\| + K\|F(x)\|\right) < \varepsilon.$$

Az (1) egyenlőtlenség szerint F folytonos az ε -nál kisebb normájú pontokban, ezért $\psi(x)$ -ben is. Alkalmazva (3)-at, a bizonyítandó

$$F(x + \varphi(x)) = F(\psi(x)) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(x_n) = - \lim_{n \rightarrow \infty} F'(0)(x_{n+1} - x_n) = 0$$

összefüggést kapjuk. \square

* **19.55. Következmény.** Ha $F'(u_0)h = 0$, akkor $\|\varphi(u_0 + h)\|/\|h\| \rightarrow 0$, amint $h \rightarrow 0$.

Bizonyítás.

$$\begin{aligned} \|\varphi(u_0 + h)\| &\leq K\|F(u_0 + h) - F(u_0)\| \\ &= \|F(u_0 + h) - F(u_0) - F'(u_0)h\| \\ &\leq \|h\| \sup_{\|u-u_0\|\leq\varepsilon} \|F'(u) - F'(u_0)\|, \end{aligned}$$

ha $\|h\| \leq \varepsilon$. \square

* **19.56. Következmény.** Ha

$$N = \{u \in U : F(u) = 0\},$$

akkor N félérintő irányainak halmaza $\ker F'(u_0)$.

Bizonyítás. Azt, hogy $\ker F'(u_0)$ elemei félérintő irányok, adja az előző következmény. Ha h_0 félérintő irány, akkor van olyan $\varepsilon > 0$ és $\omega :]0, \varepsilon[\rightarrow X$, hogy $F(u_0 + th_0 + \omega(t)) = 0$, ha $0 < t < \varepsilon$ és $\lim_{t \downarrow 0} \omega(t)/t = 0$. Mivel F differenciálható u_0 -ban, $\varrho(h) = F(u_0 + h) - F(u_0) - F'(u_0)h$ jelöléssel $\lim_{h \rightarrow 0} \varrho(h)/\|h\| = 0$. Mivel $F(u_0) = 0$,

$$\begin{aligned} 0 &= \frac{F(u_0 + th_0 + \omega(t))}{t} = \frac{F'(u_0)(th_0 + \omega(t)) + \varrho(th_0 + \omega(t))}{t} \\ &= F'(u_0)(h_0 + \omega(t)/t) + \frac{\varrho(th_0 + \omega(t))}{\|th_0 + \omega(t)\|} \|h_0 + \omega(t)/t\|. \end{aligned}$$

Innen $t \downarrow 0$ határátmenettel kapjuk, hogy $F'(u_0)h_0 = 0$. \square

* **19.57. Tétel.** Legyen X valós normált tér, $g : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ felülről félig folytonos pozitív homogén és konvex függvény, amire $g(h_0) < 0$ valamely $h_0 \in X$ -re. Ekkor a $K = \{h \in X : g(h) < 0\}$ kúp adjungált kúpja

$$\{f \in X^* : \text{van olyan } \lambda \geq 0, \text{ hogy } f \geq -\lambda g\}.$$

(Itt $0 \cdot \pm\infty = 0$.)

Bizonyítás. Az nyilvánvaló, hogy ennek a halmaznak az elemei K^+ -ban vannak. Legyen $f \in K^+$. A K nem üres konvex nyílt halmaz. Ha f sehol sem pozitív K -n, akkor $f = 0$, és $\lambda = 0$ választható. Egyébként az $A = \{(h, t) \in X \times \mathbb{R} : g(h) < t\}$ és $B = \{(h, 0) \in X \times \mathbb{R} : f(h) = 0\}$ nem üres konvex halmazok, A nyílt, B zárt. Ha (h, t) a metszetben lenne, akkor $g(h) < 0$ és $f(h) = 0$ teljesülne. Ez lehetetlen, mivel f valahol pozitív, és innen az összekötő egyenesen h felé mozogva, túljutva h -n negatívvá válna, ami ellentmond annak, hogy $f \in K^+$. Alkalmazva a Hahn-Banach-tétel elválasztási alakját, olyan nem nulla $F \in (X \times \mathbb{R})^*$ lineáris funkcionált

és c konstanszt kapunk, amelyre $F|_B \leq c \leq F|_A$. Mivel B altér, feltehetjük, hogy $c = 0$. Így $F(h, 0) \leq 0$, ha $f(h) = 0$ és $F(h, t) = F(h, 0) + tF(0, 1) \geq 0$, ha $g(h) < t$. Az első egyenlőtlenségből a $h \mapsto F(h, 0)$ leképezés eltűnik az f nullterén, így annak konstansszorosa, mondjuk $F(h, 0) = kf(h)$. A második egyenlőtlenségből $t \rightarrow +\infty$ határátmenettel $F(0, 1) \geq 0$, majd $t \downarrow g(h)$ határátmenettel $kf(h) + g(h)F(0, 1) \geq 0$ minden h -ra. Ha $F(0, 1) = 0$ lenne, akkor innen $F = 0$ adódna, ami ellentmondás. Mivel $g(h_0) < 0$, $kf(h_0) > 0$. Mivel f nemnegatív K -n, ez csak úgy teljesülhet, ha $k > 0$. A $\lambda = F(0, 1)/k$ választással készen vagyunk. \square

* **19.58. Tétel.** Legyenek X és Y Banach-terek A az X -et Y -ra képező korlátos lineáris operátor. Ekkor $\ker(T)^+ = \{y^* \circ T : y^* \in Y^*\}$.

Bizonyítás. Az egyik irány nyilvánvaló. Legyen $f \in \ker(A)^+$. Ez azt jelenti, hogy f nulla $\ker(A)$ -n, mivel az altér. Legyen $Cx = (Ax, fx)$, ha $x \in X$. A zárt képtér tétel feltételei teljesülnek, így C képtere zárt, azonban a $(0, 1)$ pár nincs benne. Válasszuk el C képterét a $(0, 1)$ -től egy H nem nulla lineáris funkcionállal. A H nulla $\text{rng}(C)$ -n. Feltehetjük, hogy $H(0, 1) = -1$. Az $y^*(y) = H(y, 0)$ jelöléssel $H(Cx) = y^*(Ax) + H(0, 1)fx$, azaz $f = y^* \circ A$. \square

* **19.59. Lagrange-szorzók.** Az

$$(1) \quad \begin{aligned} F_0(u) &\rightarrow \min, & u &\in N \\ F_j(u) &\leq 0, & j &= 1, 2, \dots, n, \\ F_{n+1}(u) &= 0 \end{aligned}$$

feltételes minimumproblémát akarjuk tanulmányozni. Az u_0 -at a feltételes minimumprobléma egy *lokális megoldásának* fogjuk nevezni, ha van olyan U_0 környezete, hogy $F_0(u) \geq F_0(u_0)$ minden $u \in U_0$ -ra, ami teljesíti az (1)-ben szereplő mellékfeltételeket. Szükséges és elégséges feltételt is a λ_j és y^* Lagrange-szorzók segítségével adhatunk:

$$(2) \quad \sum_{i=0}^n \lambda_i \bar{\delta} F_i(u_0; u - u_0) + y^* F'_{n+1}(u_0)(u - u_0) \geq 0, \quad \text{ha } u \in N;$$

$$(3) \quad \begin{aligned} \lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n &\geq 0, & y^* &\in Y^* \\ \lambda_j F_j(u_0) &= 0, & j &= 1, 2, \dots, n; \end{aligned}$$

$$(4) \quad \begin{aligned} F_j(u_0) &\leq 0, & j &= 1, 2, \dots, n, \\ F_{n+1}(u_0) &= 0, & u_0 &\in N. \end{aligned}$$

A (2) variációs egyenlőtlenség az Euler–Lagrange-egyenleteknek felel meg, (3) és (4) további feltételek. Nyilván $\lambda_j = 0$ kell legyen, ha $F_j(u_0) < 0$ ($j = 1, \dots, n$), azaz ekkor λ_j nem aktív. Figyeljük meg, hogy ha egy pozitív konstanssal megszorozzuk a Lagrange-szorzókat, (2), (3) és (4) ekvivalens feltételbe mennek át, így akár azt is feltehetjük, hogy vagy $\lambda_0 = 0$ (*elfajuló eset*), vagy $\lambda_0 = 1$ (*nemelfajuló eset*).

* **19.60. Általánosított Kuhn–Tucker-tétel.** Az előző pont jelöléseivel, tekintsük az alábbi feltételeket:

- (5) X és Y valós Banach-terek;
- (6) $U \subset X$ nyílt környezete u_0 -nak, $F_i : U \rightarrow \mathbb{R}$, a $h \mapsto \bar{\delta}F(u_0; h)$ funkcionálok konvexek ($i = 0, 1, \dots, n$) és F_j folytonos u_0 -ban ($j = 1, \dots, n$);
- (7) N konvex részhalmaza X -nek, amelynek a belseje nem üres;
- (8) $F_{n+1} : U \rightarrow Y$ folytonosan differenciálható U -n;
- (9) regularitás: $\text{rng}(F'_{n+1}(u_0))$ zárt.

Szükségesség: ha (5)–(9) teljesülnek, és u_0 lokális megoldása (1)-nek, akkor léteznek $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$ valós számok és $y^* \in Y^*$, nem mind nulla, hogy (2), (3) és (4) teljesülnek.

Elégségesség: ha (5)–(8) teljesülnek, akkor (2), (3) és (4)-ből következik, hogy u_0 megoldása (1)-nek, feltéve, hogy az alábbi két kiegészítő feltétel teljesül:

- (10) $\lambda_0 = 1$;
- (11) F_0, F_1, \dots, F_n és $u \mapsto y^* F_{n+1}(u)$ konvexek.

Használni fogjuk az L Lagrange-függvényt, amelyet az

$$L(u, \lambda, y^*) = \lambda_0 F_0(u) + \sum_{i=1}^n \lambda_i F_i(u) + y^* F_{n+1}(u)$$

összefüggéssel definiálunk, ahol $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$.

Bizonyítás. Az elégségességet bizonyítása teljesen elemi. Legyen

$$\varphi(t) = L(u_0 + t(u - u_0), \lambda, y^*),$$

ahol $t \in [0, 1]$ és $u \in N$ rögzített. A φ függvény konvex, valamint (2) szerint $\varphi'(0+) \geq 0$, ezért a $[0, 1]$ -en φ -nek minimuma van 0-ban. Innen következik, hogy

$$L(u_0, \lambda, y^*) \leq L(u, \lambda, y^*), \quad \text{ha } u \in N.$$

Mivel $\lambda_0 = 1$, a (3) és (4) feltételekből

$$F_0(u_0) = L(u_0, \lambda, y^*).$$

Minden u -ra, amely teljesíti az (1)-ben szereplő mellékfeltételeket,

$$L(u, \lambda, y^*) \leq F_0(u),$$

mivel $\lambda_j \geq 0$. Innen $F_0(u_0) \leq F_0(u)$.

A szükségesség a Dubovickij–Miljutyin-tételből fog következni. A bizonyítást több lépésre osztjuk.

I. Először a triviális speciális eseteket tekintjük. Ha $h \mapsto \bar{\delta}F_0(u_0, h)$ nemnegatív X -en, akkor $\lambda_0 = 1$, $\lambda_j = 0$, $j = 1, 2, \dots, n$, $y^* = 0$ választással (2), (3) és (4) teljesül. Ha $h \mapsto \bar{\delta}F_j(u_0, h)$ nemnegatív, $F_j(u_0) = 0$ valamely $1 \leq j \leq n$ -re, akkor $\lambda_j = 1$, $\lambda_k = 0$, ha $k \neq j$, $y^* = 0$ választással élhetünk. Ha $\text{rng}(F'_{n+1}(u_0)) \neq Y$, akkor a Hahn–Banach-tétel elválasztási alakja szerint az értékkészlet elválasztható valamely rajta kívül fekvő ponttól egy $y^* \in Y^*$ -gal, amelyre tehát $y^*F'_{n+1}(u_0)h = 0$ minden $h \in X$ -re, így $\lambda_i = 0$, $i = 0, 1, \dots, n$ választással élhetünk.

II. A továbbiakban feltesszük, hogy a triviális speciális esetek egyike sem teljesül. Ekkor az F_i , $i = 0, 1, \dots, n$ függvények regulárisak u_0 -ban.

Először az F_0 -hoz u_0 -ban tartozó reguláris csökkenési irányok K_0 kúpjával foglalkozunk. Tudjuk, hogy ez

$$K_0 = \{h \in X : \bar{\delta}F_0(u_0; h) < 0\}$$

és

$$K_0^+ = \{f \in X^* : \text{van olyan } \lambda_0 \geq 0, \text{ hogy } f \geq -\lambda_0 \bar{\delta}F_0(u_0; \cdot)\}.$$

Legyen

$$N_j = \{u \in X : F_j(u) \leq 0\}, \quad j = 1, 2, \dots, n,$$

és tekintsük az N_j -hez u_0 -ban tartozó megengedett irányok K_j kúpját. Figyelembe véve, hogy F_j folytonos u_0 -ban, kapjuk, hogy ha $F_j(u_0) < 0$, akkor $K_j = X$, és így $K_j^+ = \{0\}$. Ha $F_j(u_0) = 0$, akkor

$$K_j = \{h \in X : \bar{\delta}F_j(u_0; h) < 0\}$$

és így

$$K_j^+ = \{f \in X^* : \text{van olyan } \lambda_j \geq 0, \text{ hogy } f \geq -\lambda_j \bar{\delta}F_j(u_0; \cdot)\}.$$

A definícióból és a duális kúp definíciójából közvetlenül következik, hogy az N -hez az u_0 -ban tartozó megengedett irányok K kúpjára

$$K = \{h \in X : h = \alpha(u - u_0), u \in N^\circ, \alpha > 0\}$$

és

$$K^+ = \{f \in X^* : f(u - u_0) \geq 0, \text{ ha } u \in N\}.$$

Az $N_{n+1} = f_{n+1}^{-1}(u_0)$ halmazhoz u_0 -ban tartozó félérintő irányok K_{n+1} kúpjára megmutattuk, hogy az $A = F'_{n+1}(u_0)$ jelöléssel a $\text{rng}(A) = Y$ esetben $K_{n+1} = \ker(A)$ és $K_{n+1}^+ = \{y^* \circ A : y^* \in Y^*\}$.

Alkalmazzuk a Dubovickij–Miljutyin-tételt. Az kapjuk, hogy léteznek nem mind nulla $f \in K^+$, $f_i \in K_i^+$, $i = 0, \dots, n, n+1$ lineáris funkcionálok, hogy az összegük nulla, azaz

$$f = -f_0 - f_1 - \dots - f_{n+1} \in K^+.$$

Ez azt jelenti, hogy

$$-f_0(u - u_0) - f_1(u - u_0) - \dots - f_{n+1}(u - u_0) \geq 0, \quad \text{ha } u \in N,$$

így vannak olyan $\lambda_0, \dots, \lambda_n$ nemnegatív valós számok és $y^* \in Y^*$, nem mind nulla, hogy

$$\begin{aligned} -f_i &\leq \lambda_i \bar{\delta} F(u_0, \cdot) \quad i = 0, 1, \dots, n; \\ -f_{n+1} &= y^* \circ F'_{n+1}(u_0); \\ 0 &= \lambda_j F_j(u_0) \quad j = 1, \dots, n. \quad \square \end{aligned}$$

* **19.61. Következmény: általánosítás.** Ha még

$$F_i : U \mapsto \mathbb{R}, \quad F_i(u_0) = 0 \quad i = n+2, \dots, n+m$$

alakú feltételek is vannak, ahol minden F_i , $i = n+2, \dots, n+m$ folytonosan differenciálható U -n, azokat beolvaszthatjuk F_{n+1} -be, mivel

$$u \mapsto (F'_{n+1}(u_0), \dots, F'_{n+m}(u_0))$$

értékkészlete zárt a zárt képtér tétel szerint. Ekkor léteznek $\lambda_i \geq 0$, $i = 0, 1, \dots, n$, $i = n+2, \dots, n+m$ és $y^* \in Y^*$, nem mind nulla, hogy (2) helyett

$$\sum_{i=0}^n \lambda_i \bar{\delta} F_i(u_0; u - u_0) + \sum_{i=n+2}^{n+m} \lambda_i F'_i(u_0)(u - u_0) + y^* F'_{n+1}(u_0)(u - u_0) \geq 0,$$

teljesül, ha $u \in N$; (3) és (4) változatlan. \square

* **19.62. Következmény: speciális esetek.** Ha nincs egyenlőség típusú feltétel, akkor $Y = \{0\}$ választással élhetünk, és a bizonyítás szerint $K_{n+1} = X$, így $K_{n+1}^+ = \{0\}$, azaz feltehetjük, hogy $y^* = 0$, és (2) arra redukálódik, hogy

$$\sum_{i=0}^n \lambda_i \bar{\delta} F_i(u_0; u - u_0) \geq 0, \quad \text{ha } u \in N.$$

Ha nincs $u \in N$ típusú feltétel, akkor $N = X$ választással élhetünk. Ha az $F_i : U \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 0, 1, \dots, n$ függvények konvexek, akkor a

$$h \mapsto \bar{\delta} F_i(u_0; h) = \bar{\delta} F_i(u_0; h) = \lim_{t \downarrow 0} \frac{F_i(u_0 + th) - F_i(u_0)}{t}$$

leképezések is konvexek, így (6) helyett csak azt kell megkövetelni, hogy F_j , $j = 1, \dots, n$ folytonos u_0 -ban. Ha még ezen kívül X véges dimenziós (az eredeti Kuhn-Tucker-tételben ez a két feltétel szerepelt), akkor ezt sem, mert ekkor a konvex függvények folytonosak. \square

* **19.63. Következmény: általános Lagrange-elv.** Tekintsük (6) helyett a (6') U nyílt környezete u_0 -nak, $F_0, F_1, \dots, F_n : U \rightarrow \mathbb{R}$ differenciálhatóak u_0 -ban feltételt.

Szükségesség: ha (5), (6'), (7)–(9) teljesülnek, és u_0 lokális megoldása (1)-nek, akkor léteznek $\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$ valós számok és $y^* \in Y^*$, nem mind nulla, hogy

$$(2') \quad \sum_{i=0}^n \lambda_i F'_i(u_0)(u - u_0) + y^* F'_{n+1}(u_0)(u - u_0) \geq 0, \quad \text{ha } u \in N,$$

továbbá (3) és (4) teljesülnek.

Elégségesség: ha (5), (6'), (7) és (8) teljesülnek, akkor (2'), (3) és (4)-ből következik, hogy u_0 megoldása (1)-nek, feltéve, hogy az alábbi két kiegészítő feltétel teljesül:

$$(10) \quad \lambda_0 = 1;$$

$$(11) \quad F_0, F_1, \dots, F_n \text{ és } u \mapsto y^* F_{n+1}(u) \text{ konvexek. } \square$$

A (2'), (3) és (4) feltételek az L Lagrange-függvény segítségével is kifejezhetők. Könnyű kiszámolni, hogy a $\lambda \in [0, +\infty]^n$, $y^* \in Y^*$, $u_0 \in U$ esetben (2'), (3) és (4) a

$$\begin{aligned} L_u(u_0, \lambda, y^*)(u - u_0) &\geq 0, \quad \text{ha } u \in N, \\ L_\lambda(u_0, \lambda, y^*)(\mu - \lambda) &\leq 0, \quad \text{ha } \mu \in [0, +\infty]^n, \\ L_{y^*}(u_0, \lambda, y^*) &= 0 \end{aligned}$$

feltételekkel ekvivalensek. Valóban, (2') nyilván ekvivalens az első feltétellel, az $F_{n+1}(u_0) = 0$ feltétel pedig az utolsóval. A középső feltételben $L_\lambda(u_0, \lambda, y^*) = (F_1(u_0), \dots, F_n(u_0))$, így μ egyik koordinátájával tartva $+\infty$ -hez, a többit rögzítve $F_j(u_0) \leq 0$ adódik. Ha $F_j(u_0) = 0$, akkor nyilván $\lambda_j F_j(u_0) = 0$, ha viszont $F_j(u_0) < 0$, akkor a $\lambda_j > 0$ esetben $\mu_j = 0$, $\mu_i = \lambda_i$, ha $i \neq j$ választással ellentmondást kapnánk. Megfordítva, $F_j(u_0) \leq 0$ -ból $\sum_{j=1}^n \mu_j F_j(u_0) \leq 0$, amiből levonva $\sum_{j=1}^n \lambda_j F_j(u_0) = 0$ -át, kapjuk a középső egyenlőtlenséget.

Bizonyítás. Alkalmazzuk a 19.48. tételt.

* **19.64. Belső pont módszerek.** Az

$$(1) \quad \begin{aligned} f_0(u) &\rightarrow \min, \quad u \in U \\ f_j(u) &\leq 0, \quad j = 1, 2, \dots, k, \\ f_j(u) &= 0, \quad j = k + 1, \dots, m \end{aligned}$$

feltételes minimumproblémát kívánjuk numerikusan megoldani. Az egyenlőség típusú feltételeket kiküszöbölhetjük, ha f_0 helyett az $f_0 + \sum_{i=k+1}^m (\lambda_i f_i)^2$ függvényt minimalizáljuk, ahol $\lambda_i \neq 0$ súlyok. Kérdés, hogyan célszerű választani a súlyokat.

Az egyenlőtlenség típusú feltételeket úgy vehetjük figyelembe, hogy a célfüggvényhez hozzáadunk egy

$$-\frac{1}{t} \sum_{j=1}^k \ln(-f_j(u))$$

tagot. Ez mint sorompó szerepel, az $U^- = \{u : f_j(u) < 0, j = 1, \dots, k\}$ nyílt halmaz belsejében tart minket, mert a határhoz közeledve $+\infty$ -hez tart. Innen a *belső pont módszerek* elnevezés. Minél nagyobb t , annál gyengébb a sorompó, annál közelebb mehetünk a határhoz. A legegyszerűbb *sorompó módszernél* $U^- \cap \text{dmn}(f_0)$ egy pontjából indulunk. Egy adott pozitív t -re minimalizálva (például a fékezett Newton-módszerrel), ha $u_0(t)$ -ben van a minimum, akkor megnövelt t -re, például t helyett μt -re a $u_0(t)$ -t használhatjuk kezdőpontnak, újra minimalizálunk, stb. A tapasztalatok szerint a módszer 3 és 100 közötti μ -t választva jól működik, sebessége alig függ μ -tól. Leggyakrabban μ értékét 10 és 20 között választjuk. Fontos észrevétel, hogy ha nincsenek egyenlőség típusú feltételek és $u_0(t)$ a minimumhely, akkor $u = u_0(t)$ -re

$$f'_0(u) + \sum_{j=1}^k \frac{f'_j(u)}{-tf_j(u)} = 0,$$

így — legalábbis a reguláris esetben — a

$$\lambda_j(t) = \frac{1}{-tf_j(u_0(t))}$$

menntiségek az $u_0(t)$ -hez tartozó Lagrange-szorozók, és $-\sum_{j=1}^k \lambda_j(t) f_j(u)$ az $u = u_0(t)$ helyen k/t . Ez adhatja az ötletet a sokkal agresszívebb és gyorsabb primálduál belső pont módszerhez.

Tekintsük a

$$\begin{aligned} 0 &= f'_0(u) + \sum_{j=1}^m v_j f'_j(u), \\ 0 &= -\frac{1}{t} - v_j f_j(u), \quad j = 1, \dots, k; \\ 0 &= f_j(u), \quad j = k+1, \dots, m \end{aligned}$$

egyenletrendszert, amely a $t > 0$ paramétertől függ. Ennek az (u, v) megoldását keressük $v_j > 0$, ha $j = 1, \dots, k$ feltételek mellett fékezett Newton-módszerrel. Azt várjuk, hogy t növekedésével (u, v) tart (u_0, λ) -hoz. Kiszámítjuk $\eta = -\sum_{j=1}^k v_j f_j(u)$ értékét, és t -t a k/η szám μ -szörösének választjuk (μ rendszerint 10 körüli). Csak egyetlen iterációs lépést teszünk, majd újraszámoljuk t -t. Az egyenes szakasz menti keresésnél kiszámítjuk azt a legnagyobb α -t, amely nem nagyobb mint 1, és amelyre $v_j + \alpha \Delta v_j \geq 0$, $j = 1, \dots, k$, majd az α kezdőértékének ennek mondjuk 0,99-szeresét vesszük, és ha kell, tovább csökkentjük α -t a fékezett Newton-módszernél leírtak szerint. Az egész program akkor áll meg, ha $\eta < \varepsilon$ és $\sum_{j=k+1}^m f_j(u)^2$ meg

az első egyenlet jobb oldala normanégyszetének összege kisebb mint δ^2 . Egy olyan $u \in U^-$ pontból indulunk, amely mindegyik függvény értelmezési tartományában benne van, v_j kezdőértéke $-1/(tf_j(u))$, ha $j = 1, \dots, k$, a többi v_j tetszőleges, például nulla. Nincs garancia a konvergenciára, kivéve, ha az f_i , $i = 0, 1, \dots, k$ függvények szigorúan konvexek, az f_j , $j = k + 1, \dots, m$ függvények pedig lineáris plusz konstans alakúak.

Ha nem tudunk pontot U^- -ban, amire minden f_i értelmezve van, de ismerjük az értelmezési tartományok egy közös pontját, akkor az $f_0 \rightarrow \min$, $f_j \leq s$, $j = 1, \dots, k$, $f_j = 0$, $j = k + 1, \dots, m$, $s = 0$ problémát próbáljuk megoldani. Ha csak külön-külön tudunk egy-egy $w_i \in \text{dmn}(f_i)$ pontot, akkor az $f_0(u + w_0) \rightarrow \min$, $f_j(u + w_j) \leq s$, $j = 1, \dots, k$, $f_j(u + w_j) = 0$, $j = k + 1, \dots, m$, $s = 0$, $w_i = 0$, $i = 0, 1, \dots, m$ problémát próbáljuk megoldani.

* **19.65. A Pontrjagin-féle maximumelv bizonyítása.** Most már rendelkezésünkre állnak azok az eszközök, amelyekkel be tudjuk bizonyítani a Pontrjagin-féle maximumelvet. Jelölje (P) a 19.32 pontban megfogalmazott irányítási problémát. Az ottani jelöléseket fogjuk használni. Az alaptrükk egy időtranszformáció bevezetése, aminek segítségével egyrészt a tetszőleges W halmazból egy N konvex halmazt kapunk, másrészt a változó $[t_0, t_1]$ intervallumból a rögzített $[0, 1]$ időintervallumot.

I. Jelölje C a $\mathcal{C}([0, 1]; \mathbb{R})$ függvényteret, C_+ pedig a C azon részhalmazát, amely olyan nemnegatív, nem azonosan nulla v függvényekből áll, amelyeknek a nullhalmaza véges sok zárt intervallum egyesítése. Vegyük észre, hogy C_+ a C konvex részhalmaza, amelynek belseje nem üres, például az azonosan 1 függvény a belsejében van. Minden $v \in C_+$ függvényhez hozzárendelünk egy időtranszformációt a

$$t(\tau) = t_0 + \int_0^\tau v(\tau) d\tau, \quad \text{ha } \tau \in [0, 1]$$

összefüggéssel. Azokon az intervallumokon, ahol $v(\tau)$ nem nulla, a transzformáció kölcsönösen egyértelmű, $t'(\tau) = v(\tau)$, de ha egy intervallumon $v(\tau)$ nulla, akkor ott t konstans. Az inverz transzformációt a

$$\tau(t^*) = \min\{\tau \in [0, 1] : t(\tau) = t^*\}$$

összefüggéssel definiáljuk. Tisztán formálisan az eredeti (P) probléma a

$$(P') \quad \int_0^1 L(y(\tau), \bar{w}(\tau), t(\tau))v(\tau) d\tau \rightarrow \min$$

problémával ekvivalens, ahol $(y, t, v) \in C^n \times C \times C_+$ és

$$0 = y(\tau) - a - \int_0^\tau f(y(\tau), \bar{w}(\tau), t(\tau))v(\tau) d\tau,$$

$$0 = t(\tau) - t_0 - \int_0^\tau v(\tau) d\tau,$$

$$0 = g(t(1), y(1)).$$

Ezt az problémát operátorokkal felírva,

$$(P'') \quad F_0(u) \rightarrow \min, \quad u \in N, \quad F_1(u) = 0,$$

ahol $u = (y, t, v) \in X = C^n \times C \times C$, $N = C^n \times C \times C_+$, $Y = C^n \times C \times \mathbb{R}^m$ és F_1 az X -et Y -ba képezi. Igazolnunk kell a formális eljárás jogosságát.

II. Megmutatjuk, hogy ha x, w és t_1 az eredeti (P) probléma egy megoldása és adott $w^* \in W$ -re és $\bar{v} \in C_+$ -ra a

$$\bar{t}(\tau) = t_0 + \int_0^\tau \bar{v}(\tau) d\tau, \quad \bar{y}(\tau) = x(\bar{t}(\tau))$$

definíciókkal $\bar{u} = (\bar{y}, \bar{t}, \bar{v})$, továbbá definíció szerint

$$\bar{w}(\tau) = \begin{cases} w(\bar{t}(\tau)), & \text{ha } \bar{v}(\tau) > 0, \\ w^*, & \text{ha } \bar{v}(\tau) = 0, \end{cases}$$

akkor \bar{u} megoldása (P')-nek, feltéve, hogy $\bar{v}(1) = t_1$.

Valóban, \bar{w} -nak csak véges sok szakadási helye van, továbbá $\bar{t} \in C$, $\bar{y} \in C^n$. Jelölje \bar{w} folytonossági helyeinek halmazát S . A (P)-ből könnyen következik, hogy \bar{u} teljesíti a (P')-beli mellékfeltételeket. Továbbá, új változót bevezetve,

$$(1) \quad F'_0(\bar{u}) = \int_{t_0}^{t_1} L(x(t), w(t), t) dt.$$

Ha most egy $u = (y, t, v)$ -re teljesül (P'), akkor a

$$t(\tau) = t_0 + \int_0^\tau v(\tau) d\tau$$

transzformációval az y, \bar{w} függvényekből a

$$t \mapsto \tilde{x}(t), \quad t \mapsto \tilde{w}(t), \quad t \in [t_0, \tilde{t}_1]$$

függvényeket kapjuk, amelyek teljesítik a (P)-ben szereplő mellékfeltételeket, továbbá

$$F_0(u) = \int_{t_0}^{\tilde{t}_1} L(\tilde{x}(t), \tilde{w}(t), t) dt.$$

Mivel x, w megoldása (P)-nek, $F_0(u) \geq F_0(\bar{u})$.

Az alábbiakban legyenek \bar{u}, \bar{w} rögzítettek. Csak az utolsó lépésben fogjuk felhasználni, hogy \bar{u}, w^* tetszőlegesek.

III. Harmadik lépésként a következő szükséges feltételt adjuk (P'') teljesülésére: Létezik olyan $\lambda \geq 0$ és $y^* \in Y^*$, nem mindkettő nulla, hogy minden $u \in N$ -re a

$$(2) \quad \lambda F'_0(\bar{u})(u - \bar{u}) + y^* F'_1(\bar{u})(u - \bar{u}) \geq 0$$

variációs egyenlőtlenség teljesül.

Ez az általános Lagrange-elvből következik: csak azt kell megmutatnunk, hogy $\text{rng}(F'_1(\bar{u}))$ zárt, mert a többi feltétel nyilván teljesül. Az

$$F'_1(\bar{u})(u - \bar{u}) = b$$

egyenlet nyilván megfelel a (P') feltételben szereplő inhomogén egyenleteknek, ha azok bal oldalát linearizáljuk, azaz

$$(3) \quad \begin{aligned} b_1 &= y - \bar{y} - \int_0^\tau f_x(\bar{P})\bar{v}(y - \bar{y}) d\tau \\ &\quad - \int_0^\tau (f_t(\bar{P})\bar{v}(t - \bar{t}) + f(\bar{P})(v - \bar{v})) d\tau, \\ b_2 &= t - \bar{t} - \int_0^\tau (v - \bar{v}) d\tau, \end{aligned}$$

továbbá

$$(4) \quad b_3 = g_t(\bar{Q})(t(1) - \bar{t}(1)) + g_x(\bar{Q})(y(1) - \bar{y}(1));$$

itt $u = (y, t, v)$, $\bar{P} = (\bar{y}(\tau), \bar{w}(\tau), \bar{t}(\tau))$, tehát a változót nem írjuk ki, és $\bar{Q} = (\bar{t}(1), \bar{y}(1))$. Fontos megfigyelés, hogy a (3) egyenletrendszer rögzített v -re Volterra integrálegyenlet rendszer. Valóban, $z = (y - \bar{y}, t - \bar{t})$ és alkalmas rögzített $k_1 \in C^n$, $k_2 \in C$ és $K : [0, 1] \rightarrow \mathcal{L}(\mathbb{R}^{n+1}, \mathbb{R}^{n+1})$ folytonos függvényekkel az egyenletrendszer $c = (b_1 + k_1, b_2 + k_2)$ jelöléssel

$$z(\tau) = c(\tau) + \int_0^\tau K(\sigma)z(\sigma) d\sigma$$

alakba írható. A jobb oldalon álló operátort T -vel jelölve, teljes indukcióval

$$|T^\ell(z_2)(\tau) - T^\ell(z_1)(\tau)| \leq \frac{\|K\|^\ell \tau^\ell}{\ell!} \|z_2 - z_1\|, \quad \text{ha } \tau \in [0, 1].$$

Innen T valamely hatványa kontrakció, így pontosan egy $(y, t) \in C^n \times C$ megoldása van (3)-nak bármely $(b_1, b_2) \in C^n \times C$ -re, és ez folytonosan függ (b_1, b_2) -től.

Jelölje $h(u)$ a (4) egyenlet jobb oldalát. Megmutatjuk, hogy $\text{rng}(F'_1(\bar{u}))$ pontosan azokból a b -kból áll, amelyekre

$$(5) \quad b_1 \in C^n, \quad b_2 \in C, \quad b_3 = h(u(b_1, b_2)) + \gamma,$$

ahol γ az \mathbb{R}^n egy rögzített Z lineáris alterén fut keresztül, $(b_1, b_2) \mapsto u(b_1, b_2)$ pedig egy bizonyos folytonos függvény $C^n \times C$ -n. Mivel Z zárt, $u \mapsto h(u)$ pedig szintén folytonos, ebből már következik, hogy $\text{rng}(F_1'(\bar{u}))$ zárt.

Az (5) összefüggés bizonyításához, (3)-nak a $b_1 = 0, b_2 = 0$ homogén esethez tartozó összes u_h megoldásának halmazát jelöljük U_h -val. Az $U_h - \bar{u}$ halmaz lineáris altér, így $h(U_h - \bar{u})$ is lineáris altér, ezt jelöljük Z -vel. Továbbá rögzített (b_1, b_2) -re (3)-nak pontosan egy megoldása van a $v = \bar{v}$ esetben is, ezt jelöljük $u(b_1, b_2)$ -vel. A (3) minden u megoldása $u = u(b_1, b_2) + u_h$ alakú, amivel (5) teljesülését beláttuk.

IV. Negyedik lépésként az y^* Lagrange-multiplikátort vizsgáljuk meg. Mivel $y^* \in Y^*$ és $Y = C^n \times C \times \mathbb{R}^n$,

$$y^* = (y_1^*, y_2^*, \alpha) \in C^{n*} \times C^* \times \mathbb{R}^{n*}.$$

Először megmutatjuk, hogy λ és α nem lehet egyszerre nulla. A bizonyítás indirekt. A $b_1 = 0$ és $b_2 = 0$ választással, rögzítve $v = v_1 \equiv 1$ -et, megkonstruáljuk (3) egy $u_1 = (y, t, v_1)$ megoldását. A (2) összefüggésből azt kapjuk, hogy

$$y^* F_1'(\bar{u})(u_1 - \bar{u}) = 0.$$

Mivel v_1 a C_+ belsejében van, u_1 az N belsejében van. Ezért (2)-ből $\lambda = 0$ miatt

$$y^* F_1'(\bar{u})(u - \bar{u}) = 0$$

minden $u \in X$ -re. Most felhasználva (5)-öt azt kapjuk, hogy $y_1^* = 0$ és $y_2^* = 0$, így $y^* = 0$, ez azonban ellentmond a III. lépésben bizonyítottaknak.

Tegyük fel, hogy g valamelyik koordinátája, mondjuk az utolsó, nulla. Hagyjuk el ezt a koordinátát. Megismételve az eddigieket, azt kapjuk, hogy a most eggyel kisebb dimenziós α -val is fennáll, hogy $\lambda = 0$ és $\alpha = 0$ egyszerre nem teljesülhet. Ez azt jelenti, hogy akár azt is feltehetjük, hogy $\alpha_n = 0$. A (2) kulcsegyenlőtlenség sem változik, az α_n szorzója úgyszólván nulla. Ismételve ezt a lépést, a g minden azonosan nulla koordinátájához tartozó α_i -ről feltehetjük, hogy nulla. Figyeljük meg, hogy ha minden koordináta nulla, akkor azt kapjuk, hogy $\lambda > 0$.

V. A maximumelv bizonyításához u és \bar{u} specializálásával jutunk el. Ebben a lépésben u -t specializáljuk (2)-ben. Minden $v \in C_+$ -hoz válasszuk a $b_1 = 0, b_2 = 0$ -hoz tartozó egyetlen u megoldását (3)-nak. Ekkor (2)-ből azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} & \lambda \int_0^1 \left(L_x(\bar{P})\bar{v}(y - \bar{y}) + L_t(\bar{P})\bar{v}(t - \bar{t}) + L(\bar{P})(v - \bar{v}) \right) d\tau \\ & + \alpha g_t(\bar{Q})(t(1) - \bar{t}(1)) + \alpha g_x(\bar{Q})(y(1) - \bar{y}(1)) \geq 0 \end{aligned}$$

és (3) teljesül $b_1 = 0, b_2 = 0$ -val. A (3) összefüggést differenciálhatjuk τ szerint az integrandus folytonossági pontjaiban, azaz ha $\tau \in S$. Azt kapjuk, hogy

$$(6) \quad y' - \bar{y}' = f_x(\bar{P})\bar{v}(y - \bar{y}) + f_t(\bar{P})\bar{v}(t - \bar{t}) + f(\bar{P})(v - \bar{v}), \quad \text{ha } \tau \in S,$$

és

$$t' - \bar{t}' = v - \bar{v}, \quad \text{ha } \tau \in [0, 1], \quad y(0) = \bar{y}(0), \quad t(0) = \bar{t}(0) \equiv t_0.$$

Elhagytuk a τ -tól való függés $y'(\tau), t'(\tau)$, stb. explicit kiírását.

VI. A maximumelv minden változatában fontos szerepet játszik egy trükk, amit az „adjungált állapotok bevezetésének” szokás nevezni. Bevezetjük a φ és ψ függvényeket, kiküszöbölve t -t és y -t. Célunk a

$$(7) \quad \int_0^1 (\lambda L(\bar{P}) - \psi f(\bar{P}) + \varphi)(v - \bar{v}) d\tau \geq 0, \quad \text{ha } v \in C_+$$

egyenlőtlenség bizonyítása, ahol a φ és ψ függvényeket a $\tau \in S$ esetén fennálló

$$(8) \quad \begin{aligned} \psi'(\tau) &= (\lambda L_x(\bar{P}) - \psi(\tau) f_x(\bar{P})) \bar{v}(\tau), \\ \varphi'(\tau) &= -(\lambda L_t(\bar{P}) - \psi(\tau) f_t(\bar{P})) \bar{v}(\tau) \end{aligned}$$

differenciálegyenletekkel és a

$$\psi(1) = -\alpha g_x(\bar{Q}), \quad \varphi(1) = \alpha g_t(\bar{Q})$$

kezdeti feltételekkel vezetjük be. A φ és ψ létezése könnyen adódik, ha (8)-at integráljuk 1-től τ -ig, a kapott Volterra-integrálegyenletet megoldjuk $[0, 1]$ -en, majd a kapott φ, ψ folytonos megoldásokat differenciáljuk S pontjaiban.

Ezeket a függvényeket úgy vezettük be, hogy a szorzat differenciálási szabályát lehet alkalmazni az V. lépésben szereplő integranduszra. Nevezetesen, ha $\tau \in S$, akkor

$$\begin{aligned} &\lambda \left(L_x(\bar{P}) \bar{v}(y - \bar{y}) + L_t(\bar{P}) \bar{v}(t - \bar{t}) + L(\bar{P})(v - \bar{v}) \right) \\ &= (\psi \cdot (y - \bar{y}))' - (\varphi \cdot (t - \bar{t}))' - (\psi f(\bar{P}) - \varphi)(v - \bar{v}). \end{aligned}$$

Figyelembe véve az V. lépésben szereplő egyenlőtlenséget integrálással azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned} &(\lambda L(\bar{P}) - \psi f(\bar{P}) + \varphi)(v - \bar{v}) d\tau + [\psi \cdot (y - \bar{y}) - \varphi \cdot (t - \bar{t})]_{\tau=0}^{\tau=1} \\ &+ \alpha g_t(\bar{Q})(t(1) - \bar{t}(1)) + \alpha g_x(\bar{Q})(y(1) - \bar{y}(1)) \geq 0. \end{aligned}$$

Ebből következik (7).

VII. Most a (7) integrálegyenlőtlenséget pontonkénti egyenlőtlenséggé változtatjuk. Vezessük be a Δ függvényt a

$$\Delta(\tau) = \lambda L(\bar{P}) - \psi(\tau) f(\bar{P}) + \varphi(\tau)$$

definícióval. Minden $\tau \in S$ pontban azt kapjuk, hogy

$$(9) \quad \begin{aligned} \Delta(\tau) &= 0, \quad \text{ha } \bar{v}(\tau) > 0, \\ \Delta(\tau) &> 0, \quad \text{ha } \bar{v}(\tau) = 0; \end{aligned}$$

valóban, ennek ellenkezője könnyen ellentmondásra vezet, ha megfelelő v -t választunk, mivel Δ folytonos a τ pontban.

VIII. A (8) összefüggést integrálva 1-től τ -ig azt kapjuk, hogy

$$\begin{aligned}\psi(\tau) &= \psi(1) + \int_1^\tau (\lambda L_x(\bar{P}) - \psi f_x(\bar{P})) \bar{v} d\tau, \\ \varphi(\tau) &= \varphi(1) - \int_1^\tau (\lambda L_t(\bar{P}) - \psi f_t(\bar{P})) \bar{v} d\tau.\end{aligned}$$

Áttérve a τ változóról a $t = \bar{t}(\tau)$ változóra, amit a

$$\bar{t}(\tau) = t_0 + \int_0^\tau \bar{v}(\tau) d\tau$$

összefüggéssel definiálunk, kapjuk a p és p_0 függvényeket, tehát

$$\begin{aligned}p(t) &= p(t_1) + \int_{t_1}^t (\lambda L_x(P) - p f_x(P)) dt, \\ p(t_1) &= \psi(1) = -\alpha g_x(t_1, x(t_1))\end{aligned}$$

és

$$\begin{aligned}p_0(t) &= p_0(t_1) - \int_1^\tau (\lambda L_t(P) - p f_t(P)) dt, \\ p_0(t_1) &= \varphi(1) = \alpha g_t(t_1, x(t_1))\end{aligned}$$

minden $t \in [t_0, t_1]$ -re, ahol $P = (x(t), w(t), t)$. Ezekből az egyenletekből következik, hogy p és p_0 folytonosak $[t_0, t_1]$ -en. Differenciálással kapjuk a p -re és p_0 -ra a tételben szereplő differenciálegyenletek fennállását.

IX. Most használjuk ki, hogy \bar{w} függ $\bar{v} \in C_+$ és $w^* \in W$ választásától. Értelmezzük (9)-et \bar{v} megfelelő választásával. Legyen $\bar{v}(\tau) \equiv t_1 - t_0$. Az időtranszformációval $\Delta(\tau) = 0$ -ból a $t \mapsto w(t)$ optimális irányítás minden pontjában

$$\lambda L(P) - p(t)f(P) + p_0(t) = 0.$$

Ez megegyezik a maximumelvben szereplő

$$(10) \quad p_0(t) = H(t, x(t), w(t), p(t), \lambda)$$

összefüggéssel. Magát a maximumelvet úgy kapjuk, hogy olyan \bar{v} -t választunk, amelyre \bar{t} egy pozitív hosszúságú intervallumon egy adott t^* -ot vesz fel értéként. Vegyük észre, hogy ez minden $t^* \in [t_0, t_1]$ -re megtehető. A (9)-ben szereplő $\Delta(\tau) \geq 0$ egyenlőtlenségből — figyelembe véve \bar{w} definícióját is — azt kapjuk, hogy

$$(11) \quad \lambda L(x(t^*), w^*, t^*) - p(t^*)f(x(t^*), w^*, t^*) + p_0(t^*) \geq 0$$

minden $w^* \in W$, $t^* \in [t_0, t_1]$ -re. Azonban, (10) miatt (11) éppen a

$$H(t^*, x(t^*), w(t^*), p(t^*), \lambda) \geq H(t^*, x(t^*), w^*, p(t^*), \lambda)$$

egyenlőtlenség, ami a maximumelv. \square

- 467/−16 :

<

- (8) $x = at^2 + bt + c$;
- (9) $(t - a)^2 + (x - b)^2 = c^2$;
- (10) $x = a \cos t, y = a \sin t$;
- (11) $t^2 + x^2 + y^2 = a^2, t + x + y = b$.

>

- (8) $x = at^2 + a^2$;
- (9) $x = at^2 + bt + c$;
- (10) $(t - a)^2 + (x - b)^2 = c^2$;
- (11) $x = a \cos t, y = a \sin t$;
- (12) $t^2 + x^2 + y^2 = a^2, t + x + y = b$.

- 469/−4 :

<

homogén egyenlet $y = x/t$ helyettesítéssel szeparábilisra vezethető vissza.

>

homogén egyenlet $y = x/t$ helyettesítéssel szeparábilisra vezethető vissza. (Néha érdemes az általánosabb $y = x^\xi t^\tau$ helyettesítéssel próbálkozni, hátha szeparábilis egyenletet kapunk.)

- 470/−13 :

<

(10) $(a^2 + y^2) dx + 2x\sqrt{ax - x^2} dy = 0, y(a) = 0$.

>

- (10) $(a^2 + y^2) dx + 2x\sqrt{ax - x^2} dy = 0, y(a) = 0$;
- (11) $2x \ln y + x^2 y'/y = 0$;
- (13) $y' = \sin y$;
- (14) $y' = 10^y$;
- (15) $y' = 10^{x+y}$;
- (16) $xy' + y = \sin x$;
- (17) $xy^2(xy' + y) = a^2$.

- 470/−10 :

<

- (3) $(t^2 + x^2)x' = tx$;
- (4) $(x + y) dx - (x - y) dy = 0$;
- (5) $(3x^2 + 6xy + 3y^2) dx + (2x^2 + 3xy) dy = 0$.

>

- (3) $x' = (x^2 + t^2)/(2tx)$;
 (4) $(t^2 + x^2)x' = tx$;
 (5) $(x + y) dx - (x - y) dy = 0$;
 (6) $(x + y) dx + (x - y) dy = 0$;
 (7) $(x + y) dx + (x + y) dy = 0$;
 (8) $(3x^2 + 6xy + 3y^2) dx + (2x^2 + 3xy) dy = 0$;
 (9) $x^2 + xy + y^2 = x^2y'$;
 (10) $(3x^2 - y^2)y' = 2xy$;
 (11) $2xyy' = 3x^2 - y^2$;
 (12) $y^2 dx + (x^2 - xy) dy = 0$;
 (13) $y^3 dx + 2(x^2 - xy^2) dy = 0$;
 (14) $(x^2 - y^4)y' = xy$;
 (15) $2y' + y^2 + 1/x^2 = 0$;
 (16) $x^2(y' + y^2) = a(xy - 1)$;
 (17) $(y + y\sqrt{x^2y^4 - 1}) dx + 2x dy = 0$.

- 470/-1 :

<

(5) $(t + x)^2 x' = a^2$.

>

- (5) $(t + x)^2 x' = a^2$;
 (6) $x' = (at + bx + c)^2$.

- 471/2 :

<

- (1) $(x + y + 1) dx + (2x + 2y + 1) dy = 0$;
 (2) $(x + y - 2) dx + (x - y + 4) dy = 0$;
 (3) $(2x - y + 1) dx + (2y - x - 1) dy = 0$.

>

- (1) $y' = 2(y + 2)^2/(x + y - 1)^2$;
 (2) $(x + y + 1) dx + (2x + 2y + 1) dy = 0$;
 (3) $(x + y - 2) dx + (x - y + 4) dy = 0$;
 (4) $(2x - y + 1) dx + (2y - x - 1) dy = 0$.

- 471/12 :

<

is bebizonyítjuk később.) Lineárisra visszavezethető az

>

is bebizonyítjuk később.) Néha az egyenlet t -ben, mint x függvényében lineáris. Lineárisra visszavezethető az

- 471/-7 :

<

$$(6) \quad y' + x^2 y = x^2, \quad y(0) = 1.$$

>

$$(6) \quad y' + x^2 y = x^2, \quad y(0) = 1;$$

$$(8) \quad (y^2 - 6x)y' + 2y = 0;$$

$$(9) \quad y' - 1 = e^{x+2y};$$

$$(10) \quad xy' + 1 = e^y.$$

- 471/-1 :

<

$$(5) \quad y^{n-1}(ay' + y) = x.$$

>

$$(5) \quad y^{n-1}(ay' + y) = x;$$

$$(6) \quad y' - 3y/(2x) = 3x\sqrt{y}/2;$$

$$(7) \quad 3y^2 y' - ay^3 = x + 1.$$

- 472/5 :

<

$$(4) \quad y' = e^x y^2 - y + e^{-x}.$$

>

$$(4) \quad y' = e^x y^2 - y + e^{-x};$$

$$(5) \quad x^2 y' + (xy - 2)^2 = 0;$$

$$(6) \quad y' + Ay^2 = Bx^m;$$

$$(7) \quad xy' + 3y + y^2 = x^2.$$

- 472/-12 :

<

$$(1) \quad t dt + x dx + (t^2 + x^2)t^2 dt = 0;$$

$$(2) \quad \operatorname{tg} x dt - \operatorname{ctg} t dx = 0;$$

$$(3) \quad x(1 + tx) dt - t dx = 0;$$

$$(4) \quad (x^2 + y^2 + 2x) dx - 2y dy = 0;$$

- (5) $(x^2y + y + 1) dx + (x + x^3) dy = 0;$
 (6) $xy^3 dx + (1 + 2x^2y^2) dy = 0;$
 (7) $(y + xy^2) dx + (x - x^2y) dy = 0;$
 (8) $(3y^2/x - y/x^2 + 2y) dx + (8y^2/x + 1/x + 3y) dy = 0;$
 (9) $(xy + y^2) dx + (xy - x^2) dy = 0;$
 (10) $(y^3 - 2x^2y) dx + (2xy^2 - x^3) dy = 0.$

>

- (1) $(2x + y + 1) dx + (x + 3y + 2) dy = 0;$
 (2) $y dx + (2x^2y - x) dy = 0;$
 (3) $(x^3 - 3xy^2) dx + (y^2 - 3x^2y) dy = 0;$
 (4) $t dt + x dx + (t^2 + x^2)t^2 dt = 0;$
 (5) $\operatorname{tg} x dt - \operatorname{ctg} t dx = 0;$
 (6) $x(1 + tx) dt - t dx = 0;$
 (7) $(x^2 + y^2 + 2x) dx - 2y dy = 0;$
 (8) $(x^2 + y^2 + 2x) dx + 2y dy = 0;$
 (9) $(x^2y + y + 1) dx + (x + x^3) dy = 0;$
 (10) $xy^3 dx + (1 + 2x^2y^2) dy = 0;$
 (11) $(y + xy^2) dx + (x - x^2y) dy = 0;$
 (12) $(3y^2/x - y/x^2 + 2y) dx + (8y^2/x + 1/x + 3y) dy = 0;$
 (13) $(xy + y^2) dx + (xy - x^2) dy = 0;$
 (14) $(y^3 - 2x^2y) dx + (2xy^2 - x^3) dy = 0;$
 (15) $(xy + y^2) dx + (x - x^2y) dy = 0;$
 (16) $x(1 - y) dx + (y + x^2) dy = 0;$
 (17) $(y + x^2y^3) dx + (x^3y^2 - 2x^2y + x) dy = 0;$
 (18) $\cos x + e^x \sin y + e^{-x} y' \cos y = 0;$
 (19) $3x^2 + 6xy^2 + (6x^2y + 4y^3)y' = 0.$

- 474/6 :

<

(5) $(tx' - x)^2 - x'^2 - 1 = 0.$

>

- (5) $(tx' - x)^2 - x'^2 - 1 = 0;$
 (6) $xy' = \sqrt{1 + y'^2};$
 (7) $y'^3 - 3y' + 1 = 0;$
 (8) $x(1 + y'^2) = 1;$
 (9) $y = y' \ln y';$
 (10) $y = xy' + y'^2.$

- 474/−1 :
<

(11) $x''' = 2xx'$, $x(0) = -2$, $x'(0) = 0$, $x''(0) = 4.5$.

>

(11) $x''' = 2xx'$, $x(0) = -2$, $x'(0) = 0$, $x''(0) = 4,5$;

(12) $yy''^2 = 1$;

(13) $y'' = ae^y$;

(14) $x = y'' + e^{y''}$;

(15) $x = y''e^{y''}$;

(16) $y'^2 + y''^2 = 1$.

- 475/8 :
<

(7) $2xx'' - x'^2 = (x' - tx'')^2/3$.

>

(7) $y'' - 2y/x^2 = 0$;

(8) $xy'' = y' + x \sin(y'/x)$.

- 475/−2 :
<

(4) $x' = t^2 - x^2$, $x(0) = 1$;

(5) $x' = x^2 - t$, $x(0) = 1$.

>

(4) $2xx'' - x'^2 = (x' - tx'')^2/3$;

(5) $x(x-1)y'' - xy' + y = 0$;

(6) $x^2y'' \ln x - xy' + y = 0$;

(7) $x' = t^2 - x^2$, $x(0) = 1$;

(8) $x' = x^2 - t$, $x(0) = 1$.

- 485/−4 :
<

22.7. Grönwall-lemma. Legyenek u és v a $[0, c]$ intervallumon adott

>

22.6.5. Feladat [7]. Mutassuk meg, hogy a Peano-tétel feltételei mellett minden megoldás folytatható teljes megoldássá.

22.7. Grönwall-lemma. Legyenek u és v a $[0, c]$ intervallumon adott

- 486/−1 :

<

amiből $\omega(t) \leq u(t) + y(t)$ miatt adódik az állítás.

>

amiből $\omega(t) \leq u(t) + y(t)$ miatt adódik az állítás.

22.7.5. Feladat [8]. Oldjuk meg az alábbi differenciálegyenlőtlenségeket:

- (1) $y' \leq 0$;
- (2) $xy' \leq y$;
- (3) $yy' \leq -x$;
- (4) $0 \leq (x^2 - x0y' + y = x^2$;
- (5) $\cos(x - y) \leq y'(1 + \cos(x - y))$.

- 495/−4 :

<

* **23.7. Megjegyzés.** Az eddig tárgyalt fogalmak és általános tételek

>

* **23.7. Megjegyzés: differenciálegyenletek Banach-térbeli értékű függvényekre.** Az eddig tárgyalt fogalmak és általános tételek

- 497/8 :

<

Jelölje $[x_1, x_2, \dots, x_n]$ az x_1, x_2, \dots, x_n sorvektorokból álló négyzetes mátrix determinánsát. Ha $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ jelölik $\Phi(t)$ mátrixának sorvektorait (sic!), akkor

$$\psi(t) = [\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)]$$

és

$$A(t) = (a_{i,j}(t))_{i,j=1}^n$$

jelöléssel

$$\begin{aligned} \psi'(t) &= [\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)]' \\ &= \sum_{i=1}^n [\varphi_1(t), \dots, \varphi_{i-1}(t), \varphi_i'(t), \varphi_{i+1}(t), \dots, \varphi_n(t)] \\ &= \sum_{i=1}^n \left[\varphi_1(t), \dots, \varphi_{i-1}(t), \sum_{j=1}^n a_{i,j}(t) \varphi_j(t), \varphi_{i+1}(t), \dots, \varphi_n(t) \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{i,j}(t) [\varphi_1(t), \dots, \varphi_{i-1}(t), \varphi_j(t), \varphi_{i+1}(t), \dots, \varphi_n(t)] \\ &= \sum_{i=1}^n a_{i,i}(t) [\varphi_1(t), \dots, \varphi_{i-1}(t), \varphi_i(t), \varphi_{i+1}(t), \dots, \varphi_n(t)] \end{aligned}$$

>
Jelölje $|x_1, x_2, \dots, x_n|$ az x_1, x_2, \dots, x_n sorvektorokból álló négyzetes mátrix determinánsát. Ha $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ jelölik $\Phi(t)$ mátrixának sorvektorait (sic!), akkor

$$\psi(t) = |\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)|$$

és

$$A(t) = (a_{i,j}(t))_{i,j=1}^n$$

jelöléssel

$$\begin{aligned} \psi'(t) &= |\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)|' \\ &= \sum_{i=1}^n |\varphi_1(t), \dots, \varphi_{i-1}(t), \varphi_i'(t), \varphi_{i+1}(t), \dots, \varphi_n(t)| \\ &= \sum_{i=1}^n \left| \varphi_1(t), \dots, \varphi_{i-1}(t), \sum_{j=1}^n a_{i,j}(t) \varphi_j(t), \varphi_{i+1}(t), \dots, \varphi_n(t) \right| \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{i,j}(t) |\varphi_1(t), \dots, \varphi_{i-1}(t), \varphi_j(t), \varphi_{i+1}(t), \dots, \varphi_n(t)| \\ &= \sum_{i=1}^n a_{i,i}(t) |\varphi_1(t), \dots, \varphi_{i-1}(t), \varphi_i(t), \varphi_{i+1}(t), \dots, \varphi_n(t)| \end{aligned}$$

- 499/-2 :

<

$$(2) \quad \begin{aligned} x_1' &= 5x_1 + 2x_2, & x_1(0) &= -3, \\ x_2' &= -8x_1 - 3x_2, & x_2(0) &= 2. \end{aligned}$$

>

$$(2) \quad \begin{aligned} x_1' &= 5x_1 + 2x_2, & x_1(0) &= -3, \\ x_2' &= -8x_1 - 3x_2, & x_2(0) &= 2; \end{aligned}$$

$$(3) \quad \begin{aligned} x_1' &= 4x_1 + x_2, & x_1(0) &= -4, \\ x_2' &= -9x_1 - 4x_2, & x_2(0) &= 1. \end{aligned}$$

- 502/-1 :

<

$$(6) \quad (e^x + 1)y'' - 2y' - e^x y = 0.$$

>

$$(6) \quad (e^x + 1)y'' - 2y' - e^x y = 0;$$

$$(7) \quad x^2 \ln xy'' - xy' + y = 0;$$

$$(8) \quad xy'' - (x+1)y' - 2(x-1)y = 0;$$

$$(9) \quad (x^2 + 1)y'' - 2y = 0.$$

- 503/8 :

<

(3) $y'' + 6y' + 9y = 0.$

>

(3) $y'' + 6y' + 9y = 0;$

(4) $y'' + \omega^2 y = 0;$

(5) $y'' + 2y' + y = 0;$

(6) $y'' + y' - 2y = 0;$

(7) $y'' - 6y' = 0;$

(8) $y'' + 4y = 0;$

(9) $y'' + 4y' + 3y = 0;$

(10) $y^{(3)} - 3y' - 2y = 0;$

(11) $y^{(4)} - y = 0;$

(12) $y^{(4)} + y = 0;$

(13) $y'' + y = x^2;$

(14) $y'' - y = e^x;$

(15) $y'' - 2y' - 3y = e^{4x};$

(16) $y'' - y = 2e^x - x^2;$

(17) $y'' - 3y' + 2y = \sin x;$

(18) $y'' - 5y' + 4y = 4x^2 e^{2x};$

(19) $y'' + 3y' - 4y = e^{-4x} + xe^{-x};$

(20) $y'' - 4y' + 8y = e^{2x} + \sin x;$

(21) $y'' - 3y' + 2y = x \cos x;$

(22) $y'' + y = \hat{g}x;$

(23) $y'' + y = 1/\cos x;$

(24) $y'' + y' + y = x;$

(25) $y^{(3)} - 3y' - 2y = -8x^3.$

- 503/10 :

<

(1) $y'' - 2y/x^2 = 0;$

(2) $y'' - 3y'/x + 5y/x^2 = 0;$

(3) $y'' + 7y'/x + 9y/x^2 = 0.$

>

(1) $x^2 y'' + 3xy' + y = 0;$

(2) $x^2 y'' + xy' - y = 0;$

- (3) $x^2y'' - 4xy' + 6y = 0$;
 (4) $y'' - 2y/x^2 = 0$;
 (5) $y'' - 3y'/x + 5y/x^2 = 0$;
 (6) $y'' + 7y'/x + 9y/x^2 = 0$;
 (7) $xy'' + y' - y/x = 0$;
 (8) $2x^2y'' - xy' + y = x^2$;
 (9) $4x^2y'' + y = \sqrt{x}$;
 (10) $x^2y'' + xy' - y = x^2$.

23.26.3. Feladat [10]. Oldjuk meg az alábbi kezdetiérték- és peremérték-problémákat:

- (1) $y'' + y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$;
 (2) $y'' + y' - 3y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$;
 (3) $y'' - 2y' = 2e^x$, $y(1) = 1$, $y'(1) = 0$;
 (4) $y'' + y = 1$, $y(0) = 0$, $y(\pi/2) = 0$;
 (5) $y'' + y = 1$, $y(0) = 0$, $y(\pi) = 0$;
 (6) $y'' + y = 2x - \pi$, $y(0) = 0$, $y(\pi) = 0$;
 (7) $y'' - y' - 6y = 0$, $y(0) = 1$, $y(1) = 0$.

23.26.7. Feladat [11]. Határozzuk meg a harmónikus rezgőmozgás, a csillapított harmónikus rezgőmozgás, a kényszerrezgés és a csillapított kényszerrezgés kitérés-idő függvényét.

- 530/10 :

<

megoldását adja. Ez a *különbség trükk*.

>

megoldását adja. Ez a *különbség trükk*. Fordítva is alkalmazható: ha inhomogén egyenletet homogén peremfeltétel mellett akarunk megoldani, és ismert az inhomogén egyenlet egy megoldása, akkor a különbség trükkel az inhomogén egyenletet homogén egyenletre vezethetjük vissza inhomogén peremfeltétellel.

- 531/-9 :

<

natkozó egyenletekre szorítkoztunk, azért, hogy a fellépő differenciáloperátorok szimmetrikusak legyenek. Anizotróp esetre a tárgyalás technikailag

>

natkozó egyenletekre szorítkoztunk. Anizotróp esetre a tárgyalás technikailag

- 541/16 :

<
 más C -vel), akkor a disztribúciót m -edrendűnek nevezzük. Ha nincs ilyen m ,

>
 más C -vel), akkor a disztribúciót legfeljebb m -edrendűnek nevezzük. Ha nincs ilyen m ,

- 552/-3 :

<
 probléma megoldására felhasználható egy olyan $G \times \overline{G}$ -n értelmezett $(x, y) \mapsto$

>
 probléma megoldására felhasználható egy olyan $\overline{G} \times G$ -n értelmezett $(x, y) \mapsto$

- 554/5 :

<

$$E(x) = \frac{e^{ik|x|}}{2ki} \quad \text{és} \quad \overline{E}(x) = \frac{-e^{-ik|x|}}{2ki}$$

>

$$E(x) = \frac{-e^{ik|x|}}{2ki} \quad \text{és} \quad \overline{E}(x) = \frac{e^{-ik|x|}}{2ki}$$

- 554/5 :

<

$$E(x) = \frac{e^{-k|x|}}{2k} \quad \text{illetve} \quad \overline{E}(x) = \frac{e^{-ik|x|}}{2ki}$$

>

$$E(x) = \frac{e^{-k|x|}}{2k} \quad \text{illetve} \quad E(x) = \frac{e^{-ik|x|}}{2ki}$$

- 557/2 :

<
 $\mathcal{D}'(\mathbb{R}^{n+1})$ függvényre

>
 $\mathcal{D}(\mathbb{R}^{n+1})$ függvényre

- 561/-13 :

<

(2) $\partial_k \delta \times \delta$;

(3) $\tau_{x_0} \delta \times \tau_{t_0} \delta$, $t_0 \geq 0$;

(4) $\delta \times \delta'$;

- (5) $\partial_k^2 \delta \times \tau_{t_0} \delta$;
 (6) $\partial_k \delta \times \delta'$;
 (7) $\delta \times \Theta$;
 (8) $\tau_{x_0} \delta \times \tau_{t_0} \Theta, t_0 \geq 0$;
 (9) $\tau_{x_0} \delta \times \delta' + \partial_k \tau_{x_0} \delta \times \delta$;
 >
 (2) $\delta' \times \delta$;
 (3) $\tau_{x_0} \delta \times \tau_{t_0} \delta, t_0 \geq 0$;
 (4) $\delta \times \delta'$;
 (5) $\delta'' \times \tau_{t_0} \delta$;
 (6) $\delta' \times \delta'$;
 (7) $\delta \times \Theta$;
 (8) $\tau_{x_0} \delta \times \tau_{t_0} \Theta, t_0 \geq 0$;
 (9) $\tau_{x_0} \delta \times \delta' + (\tau_{x_0} \delta)' \times \delta$;

- 567/–12 :

<

észre, hogy az $n = 1$ eset is hasonlóan kezelhető. A lokálisan Lipschitz határú

>

észre, hogy az $n = 1$ eset is hasonlóan kezelhető. A lokálisan Lipschitz határú

- 572/–15 :

<

$$(T_E u)(v) = \langle u, v \rangle$$

>

$$(T_E u)(v) = \langle u, v \rangle_E$$

- 574/–14 :

<

$$\langle T_F u, v \rangle = \langle u, T_F v \rangle = \langle u, T v \rangle \quad \text{minden } u \in \text{dmn}(T)\text{-re.}$$

>

$$\langle T_F u, v \rangle = \langle u, T_F v \rangle = \langle u, T v \rangle \quad \text{minden } v \in \text{dmn}(T)\text{-re.}$$

- 574/−1 :

<

Bizonyítás. Alkalmazzuk a tételt f helyett a $\lambda u + f$ függvényre.

>

Bizonyítás. Alkalmazzuk a tétel bizonyítását f helyett a $\lambda u + f$ függvényre.

- 578/10 :

<

$$(1) \quad \int_G |u|^2 \leq c \int_G |\nabla u|^2, \quad \text{ha } u \in \mathcal{H}_0^1(G).$$

>

$$(1) \quad \int_G u^2 \leq c \int_G |\nabla u|^2, \quad \text{ha } u \in \mathcal{H}_0^1(G; \mathbb{R}).$$

- 578/13 :

<

$$(2) \quad \varepsilon \int_{\partial G} u^2 \leq c \int_G (u^2 + \varepsilon^2 |\nabla u|^2), \quad \text{ha } u \in \mathcal{H}^1(G).$$

>

$$(2) \quad \varepsilon \int_{\partial G} u^2 \leq c \int_G (u^2 + \varepsilon^2 |\nabla u|^2), \quad \text{ha } u \in \mathcal{H}^1(G; \mathbb{R}).$$

- 578/16 :

<

$$(3) \quad \int_G (u^2 + |\nabla u|^2) \leq c \left(\int_G |\nabla u|^2 + \int_{\partial G} u^2 \right), \quad \text{ha } u \in \mathcal{H}^1(G).$$

>

$$(3) \quad \int_G (u^2 + |\nabla u|^2) \leq c \left(\int_G |\nabla u|^2 + \int_{\partial G} u^2 \right), \quad \text{ha } u \in \mathcal{H}^1(G; \mathbb{R}).$$

- 578/10 :

<

$$(1) \quad \int_G |u|^2 \leq c \int_G |\nabla u|^2, \quad \text{ha } u \in \mathcal{H}_0^1(G).$$

>

$$(1) \quad \int_G u^2 \leq c \int_G |\nabla u|^2, \quad \text{ha } u \in \mathcal{H}_0^1(G; \mathbb{R}).$$

- 579/4 :

<

Másrészt hasonló számolással, ha $p_1 \geq p - \varepsilon c_0 c$, $q_1 \geq q - c_0 c / \varepsilon$, akkor

>

Másrészt hasonló számolással, ha $p_1 \geq p + \varepsilon c_0 c$, $q_1 \geq q + c_0 c / \varepsilon$, akkor

- 579/15 :

<

eredeti normájával ekvivalens. Az első peremérték-feladatra ez nyilvánvaló, a második és harmadik peremérték-probléma esetén pedig következik az előző

>

eredeti normájával ekvivalens. Az első és második peremérték-feladatra ez nyilvánvaló, a harmadik peremérték-probléma esetén pedig következik az előző

- 580/2 :

<

$$-u''(x) = \lambda u(x), \quad -1 < x < 1, \quad u(-1) = u(1)$$

>

$$-u''(x) = \lambda u(x), \quad -1 < x < 1, \quad u(-1) = u(1) = 0$$

- 584/3 :

<

$(m+1)(m+2)/2$ egybevágó kis háromszögre osztva, válasszuk csomópontnak a kis háromszögek csúcsait. Ha minden csomóponthoz a függvényérték

>

$(m+1)^2$ egybevágó kis háromszögre osztva, válasszuk csomópontnak a kis háromszögek $(m+1)(m+2)/2$ csúcsát. Ha minden csomóponthoz a függvényérték

- 592/16 :

<

sajátérték-probléma sajátértékeit és sajátfüggvényeit a $G = \{x : |x| < 1, x \in \mathbb{R}^2\}$ egységkörön. Polárkoordinátákra átvéve az $(r, \varphi) \mapsto \tilde{u}(r, \varphi)$ függvényre

>

sajátérték-probléma sajátértékeit és sajátfüggvényeit a $G = \{x \in \mathbb{R}^2 : |x| < 1\}$ egységkörön. Polárkoordinátákra átvéve az $(r, \varphi) \mapsto \tilde{u}(r, \varphi)$ függvényre

- 592/19 :

<

$$G : -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \tilde{u}}{\partial r} \right) - \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial \varphi^2} = \lambda \tilde{u}, \quad \partial G : k \tilde{u} + h \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \varphi} = 0;$$

>

$$G : -\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \tilde{u}}{\partial r} \right) - \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \tilde{u}}{\partial \varphi^2} = \lambda \tilde{u}, \quad \partial G : \tilde{k} \tilde{u} + \tilde{h} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial \varphi} = 0;$$

- 592/-6 :

<

$$r(rR')' + (\lambda r^2 - \kappa)R = 0, \quad kR(1) + hR'(1) = 0.$$

>

$$r(rR')' + (\lambda r^2 - \kappa)R = 0, \quad kR(1) + hR'(1) = 0, \quad \text{ha } k, h \text{ konstans.}$$

- 593/1 :

<

Mivel $\lambda > 0$, $\mu = \sqrt{\lambda}$ jelöléssel, bevezethetjük a $\mu r = x$

>

Ha $\lambda > 0$, akkor $\mu = \sqrt{\lambda}$ jelöléssel bevezethetjük a $\mu r = x$

- 594/9 :

<

$$\langle u, v \rangle = \int_0^1 r^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin \vartheta \int_0^{2\pi} \tilde{u}(r, \vartheta, \varphi) \overline{\tilde{v}(r, \vartheta, \varphi)} d\varphi d\vartheta dr.$$

>

$$\langle u, v \rangle = \int_0^1 r^2 \int_0^\pi \sin \vartheta \int_0^{2\pi} \tilde{u}(r, \vartheta, \varphi) \overline{\tilde{v}(r, \vartheta, \varphi)} d\varphi d\vartheta dr.$$

- 595/3 :

<

egyenlet megoldásai $\kappa = l(l+1)$, $l \in \mathbb{N}$, $l \geq |m|$ esetén a

$$P_l^m(z) = (1-z^2)^{|m|/2} P_l^{(|m|)}(z)$$

asszociált Legendre-függvények. A mellékletben található összefüggések szerint ezek szoros kapcsolatban vannak az ultraszférikus polinomokkal:

$$(2) \quad {}^{(|m|)}P_{l-|m|}(z) = \frac{2^{|m|}l!}{(l+|m|)!} (1-z^2)^{-|m|/2} P_l^m(z).$$

Ezt az összefüggést az ultraszférikus polinomok differenciálegyenletébe helyettesítve, kapjuk, hogy P_l^m kielégíti (1)-et $\kappa = l(l+1)$ esetén. Mivel az ultraszférikus polinomok teljes ortonormált rendszert alkotnak a $\varrho(z) = (1-z^2)^{|m|}$ súlyfüggvényre nézve, a P_l^m , $l \geq |m|$ függvények, mint a ${}^{(|m|)}P_{l-|m|}\sqrt{\varrho}$ függvények konstansszorosai, teljes ortogonális rendszert alkotnak $\mathbb{L}^2[-1, 1]$ -ben.

>

egyenlet megoldásai $\kappa = l(l+1)$, $l \in \mathbb{N}$, $0 \leq m \leq l$ esetén a

$$P_l^m(z) = (1-z^2)^{m/2} P_l^{(m)}(z)$$

asszociált Legendre-függvények. Az ortogonális polinomokra vonatkozó összefüggések szerint ezek szoros kapcsolatban vannak az ultraszférikus polinomokkal:

$$(2) \quad {}^{(m)}P_{l-m}(z) = \frac{2^m l!}{(l+m)!} (1-z^2)^{-m/2} P_l^m(z).$$

Ezt az összefüggést az ultraszférikus polinomok differenciálegyenletébe helyettesítve, kapjuk, hogy P_l^m kielégíti (1)-et $\kappa = l(l+1)$ esetén. Mivel az ultraszférikus polinomok teljes ortonormált rendszert alkotnak a $\varrho(z) = (1-z^2)^m$ súlyfüggvényre nézve, a P_l^m , $0 \leq m \leq l$ függvények, mint a ${}^{(m)}P_{l-m}\sqrt{\varrho}$ függvények konstansszorosai, teljes ortogonális rendszert alkotnak $\mathbb{L}^2[-1, 1]$ -ben.

- 595/−13 :

<

vehetjük. Felhasználva a Legendre-polinomokra a mellékletben található

$$P_l(z) = 2^k \sum_{k=0}^{\lfloor l/2 \rfloor} (-1)^k \binom{2l-2k}{l} \binom{l}{k} z^{l-2k}$$

>

vehetjük. Megmutatható, hogy Y_l^m normanégyzete

$$\frac{4\pi}{2l+1} \frac{(l+|m|)!}{(l-|m|)!}.$$

Mivel Y_l^0 valós, a valós részének normanégyzete ugyanennyi, míg egyébként a valós és a képzetes rész normanégyzete is ennek a fele. Felhasználva a Legendre-polinomokra vonatkozó

$$P_l(z) = 2^k \sum_{k=0}^{\lfloor l/2 \rfloor} (-1)^k \binom{2l-2k}{l} \binom{l}{k} z^{l-2k} = \sum_{k=0}^{\lfloor l/2 \rfloor} c_k z^{l-2k}$$

- 596/13 :
<

$$H\psi = -\frac{\hbar^2}{2m_r}\Delta\psi - \frac{Q_e^2}{|x|}\psi, \quad \text{dmn}(H) = \mathcal{D}(R^3)$$

Hamilton-operátora (lásd a 7.110 pontot) lényegében önadjungált és alulról korlátos. Továbbá

$$\sigma_c(\overline{H}) = [0, \infty[, \quad \sigma_p(\overline{H}) = \left\{ -\frac{m_r Q_e^2}{2\hbar^2 n^2} : n = 1, 2, \dots \right\}, \quad \sigma_r(\overline{H}) = \emptyset.$$

A $-m_r Q_e^4 / (2\hbar^2 n^2)$ sajátértékhez tartozó sajátaltér n^2 dimenziós, és a (gömbi koordinátákban felírt)

$${}^{(2l+1)}L_{n-l-1}\left(\frac{2m_r Q_e^2}{\hbar^2 n} r\right) \cdot r^l \cdot e^{-\frac{2m_r Q_e^2}{\hbar^2 n} r} \cdot Y_l^m(\vartheta, \varphi), \quad 0 \leq l \leq n-1, \quad |m| \leq l$$

sajátfüggvények feszítik ki, ahol az L függvények általánosított Laguerre-polinomok, az Y függvények pedig gömbfüggvények. Az \overline{H} operátor értelmezési tartománya a \mathcal{H}^2 Szoboljev-tér.

>

$$(H\psi)(x) = -\frac{\hbar^2}{2m_r}\Delta\psi - \frac{Q_e^2}{4\pi\epsilon_0|x|}\psi, \quad \text{dmn}(H) = \mathcal{D}(R^3)$$

Hamilton-operátora (lásd a 7.110 pontot) lényegében önadjungált és alulról korlátos. Továbbá

$$\sigma_c(\overline{H}) = [0, \infty[, \quad \sigma_p(\overline{H}) = \left\{ -\frac{m_e Q_e^4}{8\hbar^2 \epsilon_0^2 n^2} : n = 1, 2, \dots \right\}, \quad \sigma_r(\overline{H}) = \emptyset;$$

a $-m_e Q_e^4 / (8\hbar^2 \epsilon_0^2 n^2)$ sajátértékhez tartozó sajátaltér n^2 dimenziós, és a (gömbi koordinátákban felírt)

$${}^{(2l+1)}L_{n-l-1}\left(\frac{2r}{nr_0}\right) \cdot r^l \cdot e^{-r/(nr_0)} \cdot Y_l^m(\vartheta, \varphi), \quad 0 \leq l \leq n-1, \quad |m| \leq l$$

sajátfüggvények feszítik ki, ahol $r_0 = 4\pi\epsilon_0\hbar^2 / (m_e Q_e^2)$ a Bohr-féle atomsugár, az L függvények általánosított Laguerre-polinomok, az Y függvények pedig gömbfüggvények. Az \overline{H} operátor értelmezési tartománya a \mathcal{H}^2 Szoboljev-tér.

Ha a redukált sugárral számolunk, m_e helyére m_r kerül, és ha a mag töltése Z , akkor Q_e^2 helyére ZQ_e^2 .

- 597/1 :
<

$q_3 = r \cos \vartheta$, $0 \leq r < \infty$, $-\pi/2 \leq \vartheta \leq \pi/2$, $-\pi \leq \varphi \leq \pi$. A ψ függvény r, ϑ, φ

>

$q_3 = r \cos \vartheta$, $0 \leq r < \infty$, $0 \leq \vartheta \leq \pi$, $-\pi \leq \varphi \leq \pi$. A ψ függvény r, ϑ, φ

- 597/–15 :
<

$$R'' + \frac{2}{r}R' + \frac{2m_r}{\hbar^2} \left(E + \frac{Q_e^2}{r} - \frac{l(l+1)}{r^2} \right) R = 0.$$

Az $r_0^2 = -\hbar^2/(2m_r E)$ jelölést bevezetve, az r változó helyett áttérünk a dimenzió nélküli $\varrho = 2r/r_0$ független változóra. Az $\bar{R}(\varrho) = R(r)$, $n = m_r Q_e^2 r_0 / \hbar^2$ jelölésekkel azt kapjuk, hogy

$$(2) \quad \bar{R}'' + \frac{2}{\varrho}\bar{R}' + \left(-\frac{1}{4} + \frac{n}{\varrho} - \frac{l(l+1)}{\varrho^2} \right) \bar{R} = 0.$$

Kis ϱ esetén hatványsor alakban keressük a megoldást: $\bar{R}(\varrho) = c_0 \varrho^s + c_1 \varrho^{s+1} + \dots$. Csak a főtagokat tartva meg, és elhanyagolva a magasabb fokú tagokat, az $s(s+1) = l(l+1)$ összefüggés adódik, ebből pedig $s = l$ vagy $s = -(l+1)$, de csak az első esethez tartozik sima megoldás, így azt sejtjük, hogy kis ϱ -ra $\bar{R}(\varrho) \sim \varrho^l$.

Nagy ϱ esetén a (2) egyenletben elhanyagolva az $1/\varrho$ -t és $1/\varrho^2$ -et tartalmazó tagokat, az $\bar{R}'' \sim \bar{R}/4$ összefüggést kapjuk, ahonnan azt sejtjük, hogy $\bar{R}(\varrho) \sim e^{\pm \varrho/2}$, de csak $e^{-\varrho/2}$ négyzetesen integrálható. Ezek a heurisztikus megfontolások azt sugallják, hogy $\bar{R}(\varrho) = \varrho^l e^{-\varrho/2} w(\varrho)$ alakban érdemes keresni a megoldást. Visszahelyettesítve (2)-be, azt kapjuk, hogy

$$\varrho w'' + (2l+2-\varrho)w' + (n-l-1)w = 0.$$

Ebből látjuk, hogy ha $n-l-1 \geq 0$, azaz ha $n \geq l-1$, akkor ${}^{(2l+1)}L_{n-l-1}(\varrho)$ megoldás, nyilván erre

$$\bar{R}(\varrho) = {}^{(2l+1)}L_{n-l-1}(\varrho) \varrho^l e^{-\varrho/2},$$

azaz

$$r_0^2 = \frac{\hbar^4}{m_r Q_e^4} n^2 = -\frac{\hbar^2}{2m_r E}$$

miatt $E = -m_r Q_e^4 / (2\hbar^2 n^2)$ és kapjuk az állítást.

>

$$R'' + \frac{2}{r}R' + \frac{2m_e}{\hbar^2} \left(E + \frac{Q_e^2}{4\pi\epsilon_0 r} - \frac{l(l+1)}{r^2} \right) R = 0.$$

Az $\tilde{r}_0^2 = -\hbar^2/(2m_e E)$ jelölést bevezetve, az r változó helyett áttérünk a dimenzió nélküli $\varrho = 2r/\tilde{r}_0$ független változóra. Az $\tilde{R}(\varrho) = R(r)$, $n = m_e Q_e^2 \tilde{r}_0 / (4\pi\epsilon_0 \hbar^2)$ jelölésekkel azt kapjuk, hogy

$$(2) \quad \tilde{R}'' + \frac{2}{\varrho}\tilde{R}' + \left(-\frac{1}{4} + \frac{n}{\varrho} - \frac{l(l+1)}{\varrho^2} \right) \tilde{R} = 0.$$

Kis ϱ esetén hatványsor alakban keressük a megoldást: $\tilde{R}(\varrho) = c_0\varrho^s + c_1\varrho^{s+1} + \dots$. Csak a főtagokat tartva meg, és elhanyagolva a magasabb fokú tagokat, az $s(s+1) = l(l+1)$ összefüggés adódik, ebből pedig $s = l$ vagy $s = -(l+1)$, de csak az első esethez tartozik sima megoldás, így azt sejtjük, hogy kis ϱ -ra $\tilde{R}(\varrho) \sim \varrho^l$.

Nagy ϱ esetén a (2) egyenletben elhanyagolva az $1/\varrho$ -t és $1/\varrho^2$ -et tartalmazó tagokat, az $\tilde{R}'' \sim \tilde{R}/4$ összefüggést kapjuk, ahonnan azt sejtjük, hogy $\tilde{R}(\varrho) \sim e^{\pm\varrho/2}$, de csak $e^{-\varrho/2}$ négyzetesen integrálható. Ezek a heurisztikus meggondolások azt sugallják, hogy $\tilde{R}(\varrho) = \varrho^l e^{-\varrho/2} w(\varrho)$ alakban érdemes keresni a megoldást. Visszahelyettesítve (2)-be, azt kapjuk, hogy

$$\varrho w'' + (2l + 2 - \varrho)w' + (n - l - 1)w = 0.$$

Ebből látjuk, hogy ha $n - l - 1 \geq 0$, azaz ha $n > l$, akkor ${}^{(2l+1)}L_{n-l-1}(\varrho)$ megoldás, nyilván erre

$$\tilde{R}(\varrho) = {}^{(2l+1)}L_{n-l-1}(\varrho)\varrho^l e^{-\varrho/2},$$

azaz

$$\tilde{r}_0^2 = \frac{16\pi^2 \varepsilon_0^2 \hbar^4}{m_e^2 Q_e^4} n^2 = -\frac{\hbar^2}{2m_e E}$$

miatt $E = -m_e Q_e^4 / (8\varepsilon_0^2 \hbar^2 n^2)$ és kapjuk az állítást.

- 599/−11 :

<
Ax-el.
>
Ax-szel.

- 599/−3 :

<
Ax-el.

Az első esetben *egyparaméteres operátor félcsoporthól*, a második esetben *egyparaméteres operátor csoportról* beszélünk, A a generátor.

>
Ax-szel.

Az első esetben *egyparaméteres lineáris operátor félcsoporthól*, a második esetben *egyparaméteres lineáris operátor csoportról* beszélünk, A a generátor.

- 603/5 :

<
valóság, akkor a $Tx = \sum_{j=1}^{\infty} \langle x, x_j \rangle x_j$ összefüggés H egy önadjungált ope-

>
valóság, akkor a $Tx = \sum_{j=1}^{\infty} \lambda_j \langle x, x_j \rangle x_j$ összefüggés H egy önadjungált ope-

- 603/–12 :

<

véges, és $u \in \mathcal{C}(\overline{H_T}) \cap \mathcal{C}^2(H_T)$ teljesíti a diffúziós egyenletet H_T -n. Ha $f \leq 0$ a H_T hengeren, akkor vagy $u \leq 0$ a $\overline{H_T}$ -on, vagy az u felveszi $\overline{H_T}$ -beli

>

véges, és $u \in \mathcal{C}(\overline{H_{T'}}) \cap \mathcal{C}^2(H_{T'})$ teljesíti a diffúziós egyenletet $H_{T'}$ -n valamely $T' > T$ -re. Ha $q \geq 0$, $f \leq 0$ a H_T hengeren, akkor $u \leq 0$ a $\overline{H_T}$ -on, vagy az u felveszi $\overline{H_T}$ -beli

- 604/9 :

<

Következmény. 29.5 feltételei mellett, első peremfeltétel esetén

>

Következmény. 29.5 feltételei mellett, $q \geq 0$ és első peremfeltétel esetén

- 604/–13 :

<

$\tilde{g} = g - \varepsilon t / \varrho_0$ peremfeltétellel. Mivel $\tilde{f} \leq 0$ és $\tilde{g} \leq \delta$, a maximumelvet alkal-

>

$\tilde{g} = g - \varepsilon t / \varrho_0$ peremfeltétellel. Mivel $\tilde{f} \leq 0$ és $\tilde{g} \leq \delta_0$, a maximumelvet alkal-

- 605/–4 :

<

$$\begin{aligned} v'(s) &= -AS(t-s)u(s) + S(t-s)u'(s) \\ &= -AS(t-s) + S(t-s)(Au(s) + b(s)) = S(t-s)b(s). \end{aligned}$$

>

$$\begin{aligned} v'(s) &= -AS(t-s)u(s) + S(t-s)u'(s) \\ &= -AS(t-s)u(s) + S(t-s)(Au(s) + b(s)) = S(t-s)b(s). \end{aligned}$$

- 618/–1 :

<

megoldással.

>

megoldással.

30. Nemlineáris parciális differenciálegyenletek

* **30.1. Definíció:** Legyen H valós Hilbert-tér. Az $A \in H \rightarrow H$ operátor

- (1) *nemexpanzív*, ha $\|Ax - Ay\| \leq \|x - y\|$ minden $x, y \in \text{dmn}(A)$ -ra;
- (2) *monoton*, ha $\langle Ax - Ay, x - y \rangle \geq 0$ minden $x, y \in \text{dmn}(A)$ -ra;

- (3) *maximális monoton*, ha monoton és $\langle b - Ay, x - y \rangle \geq 0$ minden $y \in \text{dmn}(A)$ esetén $Ax = b$, azaz nincs valódi monoton kiterjesztése;
- (4) *bővülő*, ha $\mathbb{I} + \mu A$ injektív, és az inverze nemexpanzív minden $\mu > 0$ -ra;
- (5) *maximális bővülő*, ha bővülő és $(\mathbb{I} + \mu A)^{-1}$ az egész H -n van értelmezve.

Vegyük észre, hogy ha A nemexpanzív, akkor $\mathbb{I} - A$ monoton, hiszen $x, y \in \text{dmn}(A)$ esetén

$$\begin{aligned} \langle (x - Ax) - (y - Ay), x - y \rangle &= \langle x - y, x - y \rangle - \langle Ax - Ay, x - y \rangle \\ &\geq \|x - y\|^2 - \|Ax - Ay\| \|x - y\| \geq 0. \end{aligned}$$

* **30.2. Állítás:** Legyen H valós Hilbert-tér. Az $A \in H \rightarrow H$ operátor pontosan akkor monoton, ha bővülő.

Bizonyítás. Nyilván

$$\|(x + \mu Ax) - (y + \mu Ay)\| = \|x - y\|^2 + 2\mu \langle Ax - Ay, x - y \rangle + \mu^2 \|Ax - Ay\|^2.$$

Innen

$$\|(x + \mu Ax) - (y + \mu Ay)\| \geq \|x - y\|^2$$

minden $\mu > 0$ -ra pontosan akkor teljesül, ha $\langle Ax - Ay, x - y \rangle \geq 0$.

* **30.3. Állítás:** Legyen H valós Hilbert-tér. Az $A \in H \rightarrow H$ operátorra ekvivalensek:

- (1) A monoton és $\text{rng}(\mathbb{I} + A) = H$;
- (2) A maximális bővülő;
- (3) A maximális monoton.

Az, hogy (3)-ból következik (1), Minty tétele, és később bizonyítjuk.

Bizonyítás. Tegyük fel, hogy (1) teljesül. A Banach-féle fixponttételt fogjuk használni. Az $R_\lambda = (\mathbb{I} + \mu A)^{-1}$ operátor nemexpanzív, így elég megmutatni, hogy $\text{rng}(\mathbb{I} + \mu A) = H$ minden $\mu > 0$ -ra. Az $x + \mu Ax = z$, $x \in H$ egyenlet ekvivalens az $x = L_z x$, $x \in H$ egyenlettel, ahol $L_z x = R_\lambda((1 - \lambda/\mu)x + (\lambda/\mu)z)$. Ha $\mu > \lambda/2$, akkor $|1 - \lambda/\mu| < 1$ és $\|L_z x - L_z y\| \leq |1 - \lambda/\mu| \|x - y\|$ minden $x, y \in H$ -ra, így pontosan egy fixpont van. Kezdve $\lambda = 1$ -gyel és indukcióval folytatva $\mu > \lambda/2^n$ -re kapjuk az állítást.

Most tegyük fel, hogy A maximális bővülő. Ekkor A monoton. Tegyük fel, hogy $\langle b - Ay, x - y \rangle \geq 0$ minden $y \in \text{dmn}(A)$ -ra. Legyen $y = y_t = (\mathbb{I} + A)^{-1}(u + b + tz)$, ha $t > 0$ és $z \in H$. Az $\langle x - y_t, x - y_t \rangle \geq 0$ egyenlőtlenséget hozzáadva a fentihez $\langle b - x - Ay_t - y_t, x - y_t \rangle \geq 0$, ahonnan $\langle zx - y_t \rangle \leq 0$. Ha $t \downarrow 0$, akkor innen $\langle z, x - (\mathbb{I} + A)^{-1}(b + x) \rangle \leq 0$ minden $z \in H$ -ra, azaz $x = (\mathbb{I} + A)^{-1}(b + x)$.

* **30.4. Konvergenciatriűkk maximális monotonitással:** Legyen H valós Hilbert-tér, $A \in H \rightarrow H$ maximális monoton operátor. Ekkor ha $Ax_n \rightarrow b$ és $x_n \rightarrow x$ vagy $Ax_n \rightarrow b$ és $x_n \rightharpoonup x$, akkor $Ax = b$.

Bizonyítás. Mivel $\langle Ax_n - Ay, x_n - y \rangle \geq 0$, kapjuk, hogy $\langle b - Ay, x - y \rangle \geq 0$ minden $y \in \text{dmn}(A)$ esetén.

* **30.5. Komura tétele:** Legyen H valós Hilbert-tér, és tegyük fel, hogy $A \in H \rightarrow H$ monoton és $\text{rng}(\mathbb{I} + A) = H$. Ekkor minden $u_0 \in \text{dmn}(A)$ -ra létezik pontosan egy $u : [0, +\infty[\rightarrow H$ folytonos függvény, amelyre $u(0) = u_0$ és $u'(t) + Au(t) = 0$, ha $0 < t < +\infty$, a deriváltat gyenge értelemben értve. Továbbá erre az egyértelmű megoldásra

- (1) $u(t) \in \text{dmn}(A)$, ha $t > 0$;
- (2) u Lipschitz-függvény $[0, +\infty[$ -en;
- (3) majdnem minden $t > 0$ -ra a derivált a szokásos értelemben is létezik, és teljesül a differenciálegyenlet, valamint $\|u'(t)\| \leq \|Au_0\|$;
- (4) a $t \mapsto u'(t)$ függvény általánosított deriváltja a $t \mapsto u(t)$ függvénynek, és $u' : [0, +\infty[\rightarrow H$ gyengén folytonos;
- (5) minden $t \geq 0$ -ra létezik az $u'_+(t)$ jobb oldali derivált és $u'_+(t) + Au(t) = 0$.

A bizonyításhoz megjegyezzük, hogy az átviteli elv metrikus teret topologikus térbe képező függvény határértékére is érvényes marad.

Bizonyítás. Vegyük észre, hogy az A -ra kirótt feltételek azzal ekvivalensek, hogy maximális monoton, illetve maximális bővülő.

Az unicitás bizonyítása nem nehéz: Legyen $u : [0, +\infty[\rightarrow H$ egy megoldás, amelyre u folytonos és u' létezik a gyenge értelemben. Ekkor

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \|u(t)\|^2 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\langle u(t+h), u(t+h) \rangle - \langle u(t), u(t) \rangle}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left\langle \frac{u(t+h) - u(t)}{h}, u(t) + u(t+h) \right\rangle = 2\langle u'(t), u(t) \rangle. \end{aligned}$$

Legyen v egy másik megoldás. Ekkor

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \|u(t) - v(t)\|^2 &= 2\langle u'(t) - v'(t), u(t) - v(t) \rangle \\ &= 2\langle Au(t) - Av(t), u(t) - v(t) \rangle \leq 0, \end{aligned}$$

így $u(t) = v(t)$ minden $t \geq 0$ -ra.

A létezés bizonyításának a kulcsa az $R_\mu = (\mathbb{I} + \mu A)^{-1}$, $\mu > 0$ nemlineáris rezolvens használata, amely a feltételek szerint egy $H \rightarrow \text{dmn}(A)$ bijektív és nemexpanzív leképezés minden $\mu > 0$ -ra. Ennek segítségével képezzük a nemlineáris

$$A_\mu = \frac{1}{\mu}(\mathbb{I} - R_\mu), \quad \mu > 0$$

Yosida-közelítést. A bizonyítás számos lépésből áll.

I. Megmutatjuk, hogy minden $\mu > 0$ -ra és $u, v \in H$ -ra $A_\mu u = AR_\mu u$, $\|A_\mu u - A_\mu v\| \leq 2\|u - v\|/\mu$, és $\langle A_\mu u - A_\mu v \rangle \geq 0$, azaz A_μ monoton és Lipschitz-függvény, továbbá minden $\mu > 0$ -ra és $u \in \text{dmn}(A)$ -ra $R_\mu Au = A_\mu u$ és $\|A_\mu u\| \leq \|Au\|$. Valóban, $A_\mu R_\mu^{-1}[(R_\mu^{-1} - \mathbb{I})/\mu] = A$ és hasonlóan $R_\mu^{-1}A_\mu = A$. Mivel R_μ nemexpanzív,

$$\|A_\mu u - A_\mu v\| = \frac{1}{\mu} \|(u - v) - (R_\mu u - R_\mu v)\| \leq \frac{2}{\mu} \|u - v\|,$$

$$\|A_\mu u\| = \frac{1}{\mu} \|u - R_\mu u\| = \frac{1}{\mu} \|R_\mu(\mathbb{I} - \mu A)u - R_\mu u\| \leq \|Au\|.$$

Mivel R_μ nemexpanzív, $\mathbb{I} - R_\mu$ monoton, és így A_μ is monoton.

II. Rögzített $T > 0$ -ra az A operátorból elkészítjük az $X = \mathbb{L}^2[0, T]; H$ tér \tilde{A} operátorát az $(\tilde{A}u)(t) = Au(t)$ definícióval; az \tilde{A} operátor azon u függvényekre van értelmezve, amelyekre $u(t) \in \text{dmn}(A)$ majdnem minden t -re és $t \mapsto Au(t)$ az X -ben van. Megmutatjuk, hogy az \tilde{A} operátor maximális bővülő. Az A monotonitásából

$$\langle \tilde{A}u - \tilde{A}v, u - v \rangle_X = \int_0^T \langle Au(t) - Av(t), u(t) - v(t) \rangle dt \geq 0.$$

Megmutatjuk, hogy $\text{rng}(\mathbb{I} + \tilde{A}) = X$. Legyen $w \in X$ és $u(t) = (\mathbb{I} + A)^{-1}w(t)$, $v = (\mathbb{I} + A)^{-1}(0)$. Mivel $(\mathbb{I} + A)^{-1}$ nemexpanzív, $\|u(t) - v\|^2 \leq \|w(t)\|^2$. Integrálva t szerint $u - v \in X$, azaz $u \in X$.