

Diszkrét matematika 2.C szakirány

3. előadás

Nagy Gábor

nagygabr@gmail.com


nagy@compalg.inf.elte.hu

compalg.inf.elte.hu/~nagy


Komputeralgebra Tanszék

2017. tavasz

Euler-vonal



G:



Definíció

Egy gráfban az olyan vonalat, amelyben a gráf minden éle szerepel, **Euler-vonalnak** nevezzük.

Megjegyzés

Mivel vonalban nincs éliszámítás, ezért egy Euler-vonal a gráf minden élet pontosan egyszer tartalmazza.

Euler-vonal

Állítás

Egy összefüggő véges gráfban pontosan akkor van zárt Euler-vonal, ha minden csúcs foka páros.

Bizonyítás

\Rightarrow : Legyen a zárt Euler-vonal a következő:

$v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, v_{n-1}, e_n, v_0$.

A vonal kezdő- és végpontját leszámítva egy csúcs minden előfordulása esetén a mellette lévő két különböző él 2-vel járul hozzá a fokszámahoz. A kezdő- és végpont ugyanaz, ezért ennek is páros lesz a foka.

Euler-vonal

Bizonyítás

⇐: a bizonyítás konstruktív. Induljunk ki egy élt nem tartalmazó zárt vonalból (v). Ha az eddig kapott zárt vonalban nem minden él szerepel, akkor az összefüggőség miatt van olyan csúcs (v'), amelyre illeszkedő élek közül nem szerepel mindegyik. Induljunk el ebből a csúcsból egy fel nem használt élen, és haladjunk tovább mindig fel nem használt éleken. Mivel minden csúcstra páros sok fel nem használt él illeszkedik, a továbbhaladás csak akkor nem lehetséges, ha visszaértünk v' -be. Ha most az eredeti vonalon elmegyünk v -ből v' -be, az új vonalon körbemegyünk, majd az eredeti vonalon haladunk tovább, akkor az eredeti vonalnál hosszabb zárt vonalat kapunk, így ezt az eljárást ismételve véges sok lépésben megkapunk egy Euler-vonalat.

Hamilton-út/kör

Definíció

Egy gráfban az olyan utat, amelyben a gráf minden csúcsa szerepel, **Hamilton-útnak** nevezzük.

Egy gráfban az olyan kört, amelyben a gráf minden csúcsa szerepel, **Hamilton-körnek** nevezzük.

Megjegyzés

Mivel útban nincs csúcsismétlődés, ezért egy Hamilton-út a gráf minden csúcsát pontosan egyszer tartalmazza.

Tétel (Dirac)

Ha a $G = (\varphi, E, V)$ gráfra $|V| > 2$, és minden csúcsának a foka legalább $|V|/2$, akkor van Hamilton-köre.

Bizonyítás

NB.

Címkézett gráfok

Definíció

Legyen $G = (\varphi, E, V)$ egy gráf, C_e és C_v halmazok az **élcímkék**, illetve **csúcscímkék** halmaza, továbbá $c_e: E \rightarrow C_e$ és $c_v: V \rightarrow C_v$ leképezések az **élcímkézés**, illetve **csúcscímkézés**. Ekkor a $(\varphi, E, V, c_e, C_e, c_v, C_v)$ hetest **címkézett gráfnak** nevezzük.

Definíció

Élcímkézett, illetve **csúcscímkézett** gráfról beszélünk, ha csak élcímkék és élcímkézés, illetve csak csúcscímkék és csúcscímkézés adott.

Megjegyzés

Címkézett gráf helyett a **színezett gráf** elnevezés is használatos.

Címkezett gráfok

Definíció

$C_e = \mathbb{R}$, illetve $C_v = \mathbb{R}$ esetén **élsúlyozásról** és **élsúlyozott gráfról**, illetve **csúcssúlyozásról** és **csúcssúlyozott gráfról** beszélünk, és a jelölésből C_e -t, illetve C_v -t elhagyjuk.

Definíció


Egy $G = (\varphi, E, V, w)$ élsúlyozott gráfban az $E' \subset E$ élhalmaz **súlya** $\sum_{e \in E'} w(e)$.

Algoritmus(Kruskal)


Egy élsúlyozott gráf esetén az összes csúcst tartalmazó üres részgráfból kiindulva minden lépésben vegyük hozzá a minimális súlyú olyan élt, amivel nem keletkezik kör.

Példa


①




②





③



④



⑤



Címkezett gráfok

Tétel

A Kruskal-algoritmus egy minimális súlyú feszítőerdőt határoz meg. Összefüggő gráf esetén minimális súlyú feszítőfát kapunk.

Bizonyítás

Később...

Definíció

Egy algoritmust **mohó algoritmusnak** nevezünk, ha minden lépésben az adódó lehetőségek közül az adott lépésben legkedvezőbbek egyikét választja.

Megjegyzés

A Kruskal-algoritmus egy mohó algoritmus.


Címkezett gráfok

Megjegyzés

A mohó algoritmus nem mindig optimális.

Példa

Keressünk minimális összsúlyú Hamilton-kört a következő gráfban.



Irányított gráfok

Definíció

A $G = (\psi, E, V)$ hármast **irányított gráfnak** nevezzük, ha E, V halmazok, $V \neq \emptyset$, $V \cap E = \emptyset$ és $\psi: E \rightarrow V \times V$.

E -t az **élek halmazának**, V -t a **csúcsok (pontok) halmazának** és ψ -t az **illeszkedési leképezésnek** nevezzük. A ψ leképezés E minden egyes eleméhez egy V -beli rendezett párt rendel.

Elnevezés

$\psi(e) = (v, v')$ esetén azt mondjuk, hogy v **kezdőpontja**, v' pedig **végpontja** e -nek.

Definíció

Bármely $G = (\psi, E, V)$ irányított gráfból kapható egy $G' = (\varphi, E, V)$ irányítatlan gráf úgy, hogy $\psi(e) = (v, v')$ esetén $\varphi(e)$ -t $\{v, v'\}$ -nek definiáljuk.

Ekkor azt mondjuk, hogy G a G' egy **irányítása**.

Írányított gráfok

Megjegyzés

Az irányítatlan gráfokra definiált fogalmakat használni fogjuk irányított gráfok esetén is, mégpedig a megfelelő irányítatlan gráfra értve.

Definíció

Ha $e \neq e'$ esetén $\psi(e) = \psi(e')$, akkor e és e' szigorúan párhuzamos élek.

Definíció

Azon élek számát, amiknek a v csúcs kezdőpontja, v kifokának nevezzük, és $\text{deg}^+(v)$ -vel vagy $d^+(v)$ -vel jelöljük.

Azon élek számát, amiknek a v csúcs végpontja, v befokának nevezzük, és $\text{deg}^-(v)$ -vel vagy $d^-(v)$ -vel jelöljük.

Ha egy csúcs kifoka 0, akkor nyelőnek, ha a befoka 0, akkor forrásnak nevezzük.

Írányított gráfok

Állítás

A $G = (\psi, E, V)$ irányított gráfra

$$\sum_{v \in V} d^+(v) = \sum_{v \in V} d^-(v) = |E|.$$

Definíció

A $G = (\psi, E, V)$ és $G' = (\psi', E', V')$ irányított gráfok **izomorfak**, ha léteznek $f: E \rightarrow E'$ és $g: V \rightarrow V'$ bijektív leképezések, hogy minden $e \in E$ -re és $v \in V$ -re v pontosan akkor kezdőpontja e -nek, ha $g(v)$ kezdőpontja $f(e)$ -nek, és v pontosan akkor végpontja e -nek, ha $g(v)$ végpontja $f(e)$ -nek.

Írányított gráfok

Definíció

A $G' = (\psi', E', V')$ irányított gráfot a $G = (\psi, E, V)$ irányított gráf **irányított részgráfjának** nevezzük, ha $E' \subset E$, $V' \subset V$ és $\psi' \subset \psi$. Ekkor G -t a G' **irányított supergráfjának** hívjuk.

Ha a G' irányított részgráf mindazokat az éleket tartalmazza, melyek kezdőpontjai és végpontjai V' -ben vannak, akkor G' -t a V' által meghatározott **feszített irányított** (vagy **telített irányított**) **részgráfnak** nevezzük.

Definíció

Ha $G' = (\psi', E', V')$ irányított részgráfja a $G = (\psi, E, V)$ irányított gráfnak, akkor a G' -nek a G -re vonatkozó **komplementerén** a $(\psi|_{E \setminus E'}, E \setminus E', V)$ gráfot értjük.

Írányított gráfok

Definíció

Ha $G = (\psi, E, V)$ egy irányított gráf, és $E' \subset E$, akkor a G -ből az E' **élhalmaz törlésével** kapott irányított gráfon a $G' = (\psi|_{E \setminus E'}, E \setminus E', V)$ irányított részgráfot értjük.

Definíció

Ha $G = (\psi, E, V)$ egy irányított gráf, és $V' \subset V$, akkor legyen E' az összes olyan él halmaza, amelyeknek kezdőpontja vagy végpontja valamely V' -beli csúc. A G -ből a V' **csúcshalmaz törlésével** kapott irányított gráfon a $G' = (\psi|_{E \setminus E'}, E \setminus E', V \setminus V')$ irányított részgráfot értjük.

Írányított gráfok

Definíció





A \vec{C}_n **irányított ciklus** a C_n ciklus olyan irányítása, melyben az élek irányítása azonos (minden csúcs befoka és kifoka is 1).

A \vec{P}_n **irányított ösvény** \vec{C}_{n+1} -ből valamely él törlésével adódik.

Az \vec{S}_n **irányított csillag** az S_n csillag olyan irányítása, melyben a középső csúcs nyelő, az összes többi pedig forrás.

Adott csúcshalmaznál az **irányított teljes gráfban** tetszőleges v és v' különböző csúcsokhoz található pontosan egy olyan él, aminek v a kezdőpontja és v' a végpontja. \vec{K}_n nem K_n irányítása, sőt nem is egyszerű gráf, ha $n > 1$.

Példák



Irányított gráfok

Definíció

Legyen $G = (\psi, E, V)$ egy irányított gráf. A

$$v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, v_{n-1}, e_n, v_n$$

sorozatot **irányított sétának** nevezzük v_0 -ból v_n -be, ha

- $v_j \in V \quad 0 \leq j \leq n,$
- $e_k \in E \quad 1 \leq k \leq n,$
- $\psi(e_m) = (v_{m-1}, v_m) \quad 1 \leq m \leq n.$

Ha $v_0 = v_n$, akkor **zárt irányított sétáról** beszélünk, különben **nyílt irányított sétáról**.

Definíció

Ha az irányított sétában szereplő élek mind különbözőek, akkor **irányított vonalnak** nevezzük.

Az előzőeknek megfelelően beszélhetünk zárt vagy nyílt irányított vonalról.

Irányított gráfok

Definíció

Ha az irányított sétában szereplő csúcsok mind különbözőek, akkor **irányított útnak** nevezzük.

Definíció

Egy legalább egy hosszú zárt irányított vonalat **irányított körnek** nevezünk, ha a kezdő- és végpont megegyeznek, de egyébként az irányított vonal pontjai különböznek.

Definíció

Egy irányított gráfot **erősen összefüggőnek** nevezünk, ha bármely csúcsából bármely csúcsába vezet irányított út.

Írányított gráfok


A $G = (\psi, E, V)$ irányított gráf esetén V elemeire vezessük be a \sim relációt: $v \sim v'$ pontosan akkor, ha G -ben vezet irányított út v -ből v' -be, és v' -ből is vezet irányított út v -be.

A \sim ekvivalenciareláció (Miért?), így meghatároz egy osztályozást V -n.

A csúcsok egy adott ilyen osztálya által meghatározott feszített irányított részgráf az irányított gráf egy **erős komponense**.

Megjegyzés

Az irányítatlan gráfokkal ellentétben nem feltétlenül tartozik az irányított gráf minden éle valamely erős komponenshez.



Megjegyzés

Nyilván egy irányított gráf akkor és csak akkor erősen összefüggő, ha minden csúcs ugyanabba az osztályba tartozik, azaz ha csak egyetlen erős komponense van.

Irányított gráfok

Definíció

Az **irányított fa** olyan irányított gráf, amely fa, és van egy csúcsa, amelynek befoka 0, továbbá az összes többi csúcs befoka 1.

Azt a csúcst, amelynek befoka 0 **gyökérnek** nevezzük. Az olyan csúcs, aminek a kifoka 0 a **levél**.

Állítás

A gyökérből bármely adott csúcsba vezető egyetlen út egyben irányított út is.

Bizonyítás

Az út hossza szerinti TI: ha az út hossza $n = 1$, akkor azért lesz irányított út, mert a gyökér befoka 0. Tfh. $n = k$ -ra teljesül az állítás. Vegyünk egy olyan v csúcst, amibe vezető út hossza $k + 1$. Az útból elhagyva v -t és a rá illeszkedő e élt egy k hosszú utat kapunk, amiről az indukciós feltevés értelmében tudjuk, hogy ir. út. v nem lehet e kezdőpontja, mert akkor az e -re illeszkedő másik csúcs befoka legalább 2 lenne.

Irányított gráfok

Definíció

A gyökérből egy adott csúcsba vezető út hosszát a csúcs **szintjének** hívjuk.

A csúcsok szintjeinek maximumát az irányított fa **magasságának** nevezzük.

Definíció

$\psi(e) = (v, v')$ esetén azt mondjuk, hogy v' a v **gyereke**, illetve v a v' **szülője**.

Ha két csúcsnak ugyanaz a szülője, akkor **testvéreknek** hívjuk őket.

Definíció

Bármely v csúcsra tekinthetjük azon csúcsok halmazát, amelyekhez vezet irányított út v -ből. Ezen csúcsok által meghatározott feszített irányított részgráfot (amely irányított fa, és v a gyökere) v -ben gyökerező **irányított részfának** nevezzük.

Irányított gráfok

Algoritmus (Dijkstra)

A $G = (\psi, E, V, w)$ élsúlyozott irányított gráfról tegyük fel, hogy az élsúlyok pozitívak, $s \in V$ és $T \subset V$.



- (1) Legyen $S = \emptyset$, $H = \{s\}$ és $f(s) = 0$; minden más v csúcsra legyen $f(v) = \infty$.
- (2) Ha $T \subset S$ vagy $H = \emptyset$, akkor az algoritmus véget ér.
- (3) Legyen $t \in H$ egy olyan csúcs, amelyre $f(t)$ minimális. Tegyük át t -t S -be, és minden e élre, aminek kezdőpontja t , végpontja pedig $v \in V \setminus S$ vizsgáljuk meg, hogy teljesül-e $f(t) + w(e) < f(v)$. Ha igen, akkor legyen $f(v) := f(t) + w(e)$, és ha $v \notin H$, tegyük át v -t H -ba. Menjünk (2)-re.

Tétel


A Dijkstra-algoritmus a csúcshalmazon értelmez egy $f: V \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ függvényt, amely $t \in T$ esetén az adott s csúcsból a t csúcsba vezető irányított séták súlyainak a minimuma (∞ , ha nincs ilyen séta).

Irányított gráfok

Példa




$$S = \emptyset, H = \{s\}$$



$$S = \{s\}, H = \{v_1, v_3\}$$


Írányított gráfok

Példa




$$S = \{s, v_3\}$$

$$H = \{v_1, v_2, v_4\}$$



$$S = \{s, v_3, v_4\}$$

$$H = \{v_1, v_2\}$$



$$S = \{s, v_3, v_4, v_1\}$$

$$H = \{v_2\}$$

Irányított gráfok

Bizonyítás

NB.